

सम्पूर्णानन्द-ग्रन्थमाला

(४)

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

श्रीमान्नायसहायेन विरचितम्



नारायणसह-संस्कृत-विश्वविद्यालयः

R ज्यो. १२३

SAMPŪRNĀNANDA GRANTHAMĀLĀ

Vol. 4

GENERAL EDITOR :—

Kshetresachandra Chattopadhyaya

Director, Research Institute,
Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya,
Varanasi.

ज्यो. १५३



ARVĀCĪNĀM JYOTIRVIJÑĀNM

by


Ramānātha Sahāya

V A R A N A S I

1964

Published by :—

**Director, Research Institute,
Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya,
Varanasi.**



११०६६

Printed by—

**Baladeva Das
Sansar Press (Private) Ltd.
Kashipura, Varanasi.**

सम्पूर्णानन्द-ग्रन्थमाला

(४)

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

श्रीरमानाथसहायेन विरचितम्

प्रकाशितं

वाराणस्याम्

१८८६ तमे शकाब्दे

प्राप्तिस्थानम्—
प्रकाशनविभागः
वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयः
वाराणसी—२

मूल्यम्—त्रयोदश रूप्यकाणि

विज्ञप्तिः

ज्योतिषां परमं ज्योति-
ध्यात्वैव ब्रह्म शास्वतम् ।
पाश्चात्यज्योतिषग्रन्थं
प्रकाशयाम्यहं मुदा ॥
रमानाथसहायस्तु
संस्कृताध्यापको बुधः ।
गणितज्ञोऽस्य कर्तास्ति
सच्श्रीवास्तववंशजः ॥
पुस्तकं बहुचित्राढ्यं
सुष्ठु स्वार्थप्रबोधकम् ।
अर्वाचीनं समाख्यानं
ज्योतिर्विज्ञानम् अस्य वै ॥
लिखितं पुस्तकमेतत्
प्रदेशशासनाज्ञया ।
ज्योतिःशास्त्रमधीयानां-
दृष्टान्त्रान् संबोधयिष्यति ॥
इत्याशाप्रैरितेनैव
क्षेत्रेशचन्द्रशर्मणा ।
सम्पूर्णानन्दमालायां
चतुर्थं सुमनो हितम् ॥

भूमिका

सुविदितमेव विदुषामेतत् तथ्यं यदमरभारतीकोषोऽस्माकं विविधविषय-
रचनासम्भृतः । ज्योतिषं शास्त्रं नूनं पूर्वेषामेकः प्रमुखविषयोऽभवदिति वेदेषु लब्धै-
र्योतिर्विज्ञानसंकेतैः स्पष्टं प्रतीयते । वेदाङ्गेष्वपि तस्योपलब्धिः प्रख्यापयति पुरातन-
महत्तामस्य शास्त्रस्य । कृतज्ञाश्च वयं पूर्वेषामृगीणाममीषां ये नस्तद् व्याचक्षिरे
ज्ञानम् । अध्ययनपरम्परा चास्योत्तरोत्तरविकासोन्मुखी नवनवगवेषणार्थं प्राणुद-
द्विदुषो ये प्रयत्नसङ्घैर्यद्वन् विषय-परिष्कारं शास्त्रस्यास्य । परं दूयते हृदयं नितरां
मध्ययुगीनानामालोक्यौदासीन्यमस्मिन्निषये पण्डितमन्यानां यैः 'पारङ्गता वयं
ज्योतिःशास्त्रस्य, न किञ्चिदध्यन्यज्ज्ञातव्यमिति' विचार्य वेधनादिकार्यमुपेक्षितं
सर्वथा । एवञ्च वैदिककालाद्विच्छिन्नं प्रसवन्तीयं ज्ञानस्रवन्ती मरुभूमावकर्मण्य-
ताया अशुष्यत । पाश्चात्यविद्वांसस्तु प्राचीनयवनज्योतिर्विद्यायाः संवर्धने रता उत्कृष्टो-
त्कृष्टतरनूतनयन्त्राणां परिष्कृतगणितादिविज्ञानसिद्धान्तानाञ्च साहाय्येन मध्य-
युगादारभ्याद्यपर्यन्तम् । प्रशंसनीयास्ते यशोभाजोऽमरपुत्राः सरस्वत्याः ।

हीनामवलोक्य दशं संस्कृतज्ञानं ज्योतिषशास्त्रविद्यार्थिनां साम्प्रतं वेधशाला-
यन्त्रादिकाभावे राज्याधिकारिण उत्तरप्रदेशस्य नैनीतालनगरे वेधशालामेकामिदानी-
न्तनयन्त्रादिसुसज्जितां कारयामासुः । तेषामेव चादेशेनामरवाण्यामियं रचना कृता
संस्कृतविद्यार्थिनां सुखबोधाय दुरुहाणां ज्योतिर्विज्ञानप्रयुक्तयन्त्रसिद्धान्तादीनां शास्त्र-
विषयस्य च । विषयप्रतिपादनञ्चैवं पृथक् पृथक् कृतम्—खगोलः, पृथिवी, चन्द्रः,
ग्रहणानि, सूर्यः, ग्रहविषयकसिद्धान्ताः, ग्रहाः, बुधादयः, धूमकेतवः । पुनश्चैवम्—वेध-
शाला, नक्षत्रमण्डलम्, नक्षत्रम्, द्विकादयः, विकारिनक्षत्राणि, नक्षत्रतथकाः,
नीहारिकाः, आकाशगङ्गा, अत्याकाशगङ्गासंस्थानानि, सृष्टिसिद्धान्ताश्च ।

ग्रन्थरचनायामस्माकं प्रथमं लक्ष्यं विषयस्य सुस्पष्टतया प्रतिपादनं द्वितीयञ्चा-
ध्ययनाभिलाषिणामायासापनयनम् । विषय एष गणितादिशास्त्रसिद्धान्तानां भौतिका-
दिशास्त्रपरीक्षणविधीनां सूक्ष्मवेधनचित्रगमापनाद्युपयुक्तजटिलयन्त्राणाञ्च किञ्चि-
ज्ज्ञानमपेक्षते । तथा चेदानीं हिन्दीभाषाया एतावान् प्रचारो यत्तस्या एवानुरूपोऽ-
संश्लिष्टपदा समासविरला रीतिर्व्यवहार्या संस्कृतभाषायाम् । अतोऽस्माभिरल्पवृत्तिरेव
रीतिः समाहृता; नास्माकमभिमतानुप्रासयमकादीनां चमत्कृतिर्न च श्रुतिमधुर-
सुललितपदावल्या विच्छित्तिर्नापि च प्रभूतपर्यायप्रयोगाणां भङ्गी । सौकर्यार्थञ्च
विद्यार्थिनां सन्धयोऽपि नातिमात्रं प्रयुक्ताः । विभक्तिवचनपुरुषादीनां झटिति बोधः
स्यादित्यस्मिन्नेवास्माकं प्रयत्नः । तदेतज्ज्ञात्वा बुधाः प्रमाणम् ।

—रमानाथसहायः

विषय-सूची

भूमिका	क
विषयसूची	ग
विस्तृता विषयसूची	ङ
चित्रसूची	ट
सारिणीसूची	ठ
१. खगोलः	१
२. पृथिवी	१३
३. चन्द्रः	५१
४. ग्रहणमाच्छादनं संक्रमणञ्च	७७
५. सूर्यः	९५
६. ग्रहाः—ग्रहगतिविषयकसिद्धान्ताः	११५
७. ग्रहाः—बुधादयः	१३०
८. धूमकेतुः, उल्कादयः	१६२
९. वेधशाला, यन्त्राणि च	१७३
१०. नक्षत्रमण्डलानि	१९५
११. नक्षत्राणि	२१२
१२. द्विकानि, विकारिनक्षत्राणि च	२३९
१३. नक्षत्रस्तवकाः, नीहारिकाश्च	२५६
१४. आकाशगङ्गासंस्थानम्	२६६
१५. अत्याकाशगङ्गासंस्थानानि	२७४
१६. सृष्टिः	२८५
उपसंहारः	२९२
परिशिष्टानि [अ] शब्दसूची—१. पारिभाषिकशब्दानाम् आंग्लसंस्कृतपर्यायसूचिका	२९५
संस्कृतांग्लपर्यायसूचिका	३०५
२. ज्योतिर्विदां नाम्नां सूची	३१६
३. ग्रहाणां नाम्नां प्रमुखनक्षत्राणां च सूची	३१८
[आ] ग्रीकवर्णमाला	३२०
[इ] प्रमुखज्यौतिषस्थिराङ्काः	३२१

॥ ॐ ॥

विस्तृता विषयसूची

प्रथमोऽध्यायः । खगोलः ।

१-१२

१.१ खगोलः । १.२ खगोलीयक्षितिजं; स्वस्तिकश्च । १.२१ दर्शकस्थित्यनुसारं खगोलीयक्षितिजं परिवर्तते । १.३ खगोलीयनियामकाः (१) दिगंशोन्नतांशपद्धतिः । १.३१ दिगंशकोटि-उन्नतांशाः । १.४ खगोलीयनियामकाः (२)—विषुवांशक्रान्त्यंश-पद्धतिः । १.४१ नियामकपद्धतिः । १.५ खगोलीयनियामकाः (३)—होराकोण-क्रान्त्यंश-पद्धतिः । १.५१ अहोरात्रवृत्तानि । १.६ खगोलीयनियामकाः (४)—खगोलीयाक्षांश-रेखांशपद्धतिः । १.६१ नियामकपद्धतिः । १.७ विभिन्ननियामकानां प्रयोगस्थलानि ॥

द्वितीयोऽध्यायः । पृथिवी कालविभागश्च ।

१३-५०

२.१ पृथिव्या आकारः । २.११ पृथिव्या ध्रुवनिम्नता । २.१२ ध्रुवनिम्नताया मानम्, पृथिव्या व्यासश्च । २.२ पृथिव्या अक्षभ्रमणम् । २.२१ अक्षभ्रमणस्य प्रमाणानि । २.२२ अक्षभ्रमणवेगः अक्षभ्रमणकालश्च । २.२३ अक्षभ्रमणवेगे अक्षभ्रमणकाले वा परिवर्तनानि । २.२४ परिवर्तनकारणानि । २.२५ पार्थिवध्रुवयोः (सुमेरुकुमेवोः) प्रतीयमान-विचलनम् । २.३ पृथिव्याः परिक्रमणम् । २.३१ प्रमाणानि । २.३२ परिक्रमणमार्गः (भूक्ष्मा) । २.४ ऋतवः । २.४१ ऋतूनां कालावधयः । २.४२ ऋतुकारणम् । २.४३ कथं ऋतुश्चिरायते ? २.५ वायुमण्डलम् । २.५१ वायुमण्डलस्य त्रयः स्तराः । २.५२ प्रकाशकिरणानां वर्तनक्रिया । २.५३ वेधेषु वर्तनजनितसंस्काराः । २.५४ वायुमण्डले किरण-वर्तनस्य प्रभावाः । २.६ अयनगतिः । २.६१ पृथिव्या अयनगतिः । २.६२ अयनगतेः कारणम् । २.६३ अयनगतेः परिणामाः । २.६४ अक्षविचलनम् । २.६५ मार्गच्युतिः । २.७ पृथिव्या आयुः । २.८ कालविभागः । २.८१ नाक्षत्रकालः । २.८२ स्पष्टसौरकालः । २.८३ मध्यमसौरकालः । २.८३१ पूर्वाह्नकालावधिरपराह्नकालावधिश्च । २.८३२ कालसमी-करणफलम् । २.८४ स्थानीयकालः । २.८५ प्रामाणिककालः । २.८६ आन्ताराष्ट्रिय-दिनाङ्करेखा ॥

तृतीयोऽध्यायः । चन्द्रः ।

५१-७६

३.१ चन्द्रस्य दूरत्वम् । ३.११ दूरत्वनिर्धारणम् । ३.१२ चन्द्रदूरत्वनिर्धारणम् । ३.१३ लम्बनम् । ३.१४ लम्बनदूरत्वसम्बन्धः । ३.१५ चन्द्रस्य लम्बननिर्धारणम् । ३.१६ चन्द्रदूरत्वमानम् । ३.२ चन्द्रस्य व्यासादयः । ३.२१ चन्द्रव्यासमानम् । ३.२२ चन्द्रस्य पिण्डमात्रा । ३.२३ चन्द्रस्य घनत्वम् । ३.३ चन्द्रस्य परिक्रमणम् । ३.३१ चन्द्रस्य सूर्य-परितो भ्रमणम् । ३.३२ चन्द्रकलाः । ३.३३ चन्द्रालोकः । ३.३४ भुव आलोकश्चन्द्रपृष्ठे । ३.४ चन्द्रस्य अक्षभ्रमणम् । ३.४१ दृश्यताभेदाः । ३.५ चन्द्रतले भौतिकस्थितयः । ३.५१

(च)

वायुमण्डलम् । ३.५२ जलाभावः । ३.५३ तापक्रमः । ३.६ चन्द्रपृष्ठचिह्नानि । ३.६१ चान्द्रसमुद्राः । ३.६२ चान्द्रज्वालागिरिमुखानि । ३.६३ चान्द्रपर्वताः । ३.६४ गर्ता घृणयश्च । ३.७ खगोले चन्द्रस्य मार्गः । ३.७१ राहुकेतू । ३.७२ चन्द्रगतिस्थिराङ्कानां चलत्वम् । ३.७३ चन्द्रस्य स्थितिनिर्णयः । ३.८ आच्छावाः । ३.९ चन्द्रस्य उत्पत्तिः ॥

चतुर्थोऽध्यायः । ग्रहणम् आच्छादनं संक्रमणञ्च ।

७७-६४

४.१ ग्रहणाध्ययने प्रयुक्ताः प्रकाशनियमाः । ४.२ चन्द्रग्रहणम् । ४.२१ कारणम् । ४.२२ चन्द्रग्रहणभेदाः । ४.२३ भूभायामतिक्रमणम् । ४.२४ चन्द्रकक्षायां भूभावासानयनम् । ४.२५ भूमादैर्घ्यम् । ४.२६ ग्रहणस्थितिकालः । ४.३ सूर्यग्रहणम् । ४.३१ कारणम् । ४.३२ सूर्यग्रहणभेदाः । ४.३३ चन्द्रभाया अतिक्रमणम् । ४.३४ चन्द्रभाव्यासस्य चन्द्रमादैर्घ्यस्य चानयनम् । ४.४ सूर्यचन्द्रग्रहणानि । ४.४१ सूर्यग्रहणचन्द्रग्रहणयोस्तुलना । ४.४२ ग्रहण-सम्भावना । ४.४३ एकस्मिन् वर्षे ग्रहणानां संख्या । ४.४४ ग्रहणावृत्तिचक्रम् (सैरोस) । ४.६ आच्छादनं संक्रमणञ्च । ४.५१ आच्छादनम् । ४.५२ बुधशुक्रयोः संक्रमणानि ॥

पञ्चमोऽध्यायः । सूर्यः ।

६५-११४

५.१ सूर्यस्य भुवो दूरत्वम् । ५.११ दूरत्वनिर्धारणम् । ४.१२ शुक्रसंक्रमणविधिः । ५.१३ भौमदूरत्वविधिः । ५.१४ एरोसदूरत्वविधिः । ५.१५ भूचलनसिद्धान्तेन (मार्गच्युति-सिद्धान्तेन) ५.१६ डालरसिद्धान्तेन । ५.२ परिमाणादयः । ५.२१ सूर्यस्य परिमाणम् । ५.२२ सूर्यस्य पिण्डमात्रा, घनत्वम्, गुरुत्वाकर्षणञ्च । ५.२३ अक्षभ्रमणम् । ५.३ सूर्य-विधानम् । ५.३१ प्रकाशमण्डलम् । ५.३११ कणचिह्नानि । ५.३१२ सूर्यलाञ्छनानि । ५.३१३ सूर्यलाञ्छनचक्रम् । ५.३१४ सूर्यलाञ्छनस्य वर्णच्छत्रम् । ५.३१५ सूर्यलाञ्छनानां चुम्बकीयक्षेत्रत्वम् । ५.३२ वर्णमण्डलम् । ५.३२१ वर्णच्छत्रं सूर्यस्य । ५.३२२ सूर्यस्य रासायनिकतत्त्वानि । ५.३२३ सूर्यरश्मिविश्लेषकयन्त्रम् । ५.३२४ सौरलोलज्वालाः । ५.२५ सूर्यो-न्नतज्वालाशिखराणि । ५.३३ प्रभामण्डलम् । ५.४ सूर्यस्य प्रकाशस्तापश्च । ५.४१ प्रकाश-विकिरणम् । ४.४२ तापविकिरणम् । ५.४२१ सौर-स्थिराङ्कः । ५.४२२ सूर्ये तापविकिरण-मात्रा । ५.४३ सूर्यस्य तापक्रमः । ५.४४ तापविकिरणस्य समस्या ॥

षष्ठोऽध्यायः । ग्रहविषयकसिद्धान्ताः ।

११५-१२६

६.१ ग्रहनक्षत्रयोर्भेदः । ६.२ ग्रहाणां संख्या । ६.२१ ग्रहाणां संक्षिप्तसामान्यवर्णनम् । ६.३ ग्रहाणां वर्गीकरणम् । ६.४ ग्रहाणां सूर्याद् दूरत्वम् । ६.५१ भ्रमणकालः (परिक्रमणकालः) । ६.५२ युतिकालः । ६.६१ लघुग्रहाणां दृष्टिः कलाश्च । ६.६२ प्रधानग्रहाणां दृष्टिः कलाश्च । ६.७ ग्रहाणां गतिः । ६.७१ ऋज्वी गतिः । ६.७२१ लघुग्रहस्य वक्रगतेर्व्याख्या । ६.७२२ प्रधानग्रहस्य वक्रगतेर्व्याख्या । ६.७२३ स्थिरचिह्नद्वयः । ६.८ ग्रहगतिविषयकसिद्धान्ताः । ६.८१ 'यलेमी' सिद्धान्तः । ६.८२ केप्लरनियमाः । ६.८३ ग्रहकक्षावृत्तस्य तत्त्वानि । ६.८४ ग्रहकक्षावृत्ततत्त्वानां सारिणी ॥

(छ)

सप्तमोऽध्यायः । ग्रहाः—बुधादयः ।

१३०-१६१

७.१ बुधः । ७.११ दर्शनम् । ७.१२ परिक्रमणम् । ७.१३ दृष्टिः कलाश्च । ७.१४ अक्षभ्रमणम् । ७.१५ तापक्रमः । ७.१६ वायुमण्डलम् । ७.१७ बुधचन्द्रयोः समानता । ७.१८ बुधनीचस्य च्युतिः । ७.१९ बुधस्य संक्रमणानि । ७.२ शुक्रः । ७.२१ सूर्य परितः परिक्रमणम् । ७.२२ दृष्टिः कलाश्च । ७.२३ अक्षभ्रमणम् । ७.२४ शुक्रवृष्टं वायुमण्डलम् । ७.२५ तापक्रमः । ७.२६ शुक्रस्य संक्रमणानि । ७.३ भौमः । ७.३१ सर्वानुकूलप्रेक्षणीयता । ७.३२ परिक्रमणम् । ७.३३ अक्षभ्रमणम् । ७.३४ भौमे ऋतवः । ७.३५ वायुमण्डलम् । ७.३६ तापक्रमः । ७.३७ पृष्ठचिह्नानि । ७.३८ उपग्रहे । सारिणी । ७.४ अवान्तरग्रहाः । ७.४१ विवृतीतिहासः । ७.४२ विस्तार आकारश्च । ७.४३ परिक्रमणानि । ७.५ गुरुः । ७.५१ परिक्रमणम् । ७.५२ अक्षभ्रमणम् । ७.५३ वायुमण्डलं तापक्रमश्च । ७.५४ गुरो रचना । ७.५५ पृष्ठचिह्नानि । ७.५६ उपग्रहाः । ७.५७ उपग्रहाणां ग्रहणं संक्रमणं छायासंक्रमणम् आच्छादनम् । ७.५८ उपग्रहग्रहणानां महत्त्वम् । ७.५९ उपग्रहाणां सारिणी । ७.६ शनिः । ७.६१ परिक्रमणम् । ७.६२ अक्षभ्रमणकालः । ७.६३ वायुमण्डलं तापक्रमश्च । ७.६४ रचना । ७.६५ पृष्ठचिह्नानि । ७.६६ शनिवलयानि । ७.६७ वलयानां कलाः । ७.६८ वलयानां निर्मितिः । ७.६९ शनरुपग्रहाः । ७.७१ वरुणः (यूरेनस) । ७.७२ इन्द्रः (नेपच्यून) । ७.७३ कुबेरः । ७.८ ग्रहाणां सारिणी ।

अष्टमोऽध्यायः । धूमकेतुः, उल्काश्च ।

१६२-१७२

८.१ धूमकेतवः । ८.११ परिक्रमणमार्गः । ८.१२ धूमकेतोः स्वरूपम् । ८.१३ पुच्छम्-उत्पत्तिर्गतयश्च । ८.१४ वर्णच्छत्रम् । ८.१५ पिण्डमात्रा, रचना च । ८.१६ धूमकेतूनां परिवाराः । ८.१७ धूमकेतूनां वर्गः । ८.१८ प्रसिद्धा धूमकेतवः । ८.२ उल्काः । ८.२१ संख्या । ८.२२ संपातविन्दुः । ८.३ उल्कापिण्डाः । ८.४ राशिचक्रप्रकाशः ॥

नवमोऽध्यायः । वेधशाला यन्त्राणि च ।

१७३-१९४

९.१ वेधशाला । ९.२ दूरदर्शकयन्त्राणि । ९.२१ प्रकाशकिरणानां नियमाः । ९.२२ वर्तनात्मकदूरदर्शकानि । ९.२३ परावर्तनात्मकदूरदर्शकम् । ९.२४ दूरदर्शकयन्त्रस्य शक्तयः । ९.३ याम्योत्तरवृत्तम् । ९.४ कालाङ्कयन्त्रम् । ९.५ विषुवदीयदूरदर्शकम् । ९.६ घटिका-यन्त्राणि । ९.७ विविधानि यन्त्राणि । ९.७१ फिलरसूक्ष्ममापकम् । ९.७२ नतांशदूरदर्शक-यन्त्रम् (नतांशनलिका) । ९.७३ अट्टालिकादूरदर्शकयन्त्रम् । ९.७४ रश्मिविश्लेषकयन्त्रम् । ९.७५ फोटोकैमरायन्त्रम् ॥

दशमोऽध्यायः । नक्षत्रमण्डलानि ।

१९५-२११

१०.१ नक्षत्रमण्डलानि । १०.२ नक्षत्रमण्डलानां सारिणी । १०.३ नक्षत्रस्थानगणना । १०.४ नक्षत्राणां मानचित्राणि । १०.५ राशिचक्रम् । १०.६ कृत्रिमतारामण्डलगृहम् ॥

(ज)

एकादशोऽध्यायः । नक्षत्राणि ।

२१२-२३८

११.१ नक्षत्राणां भास्वरत्वकोटिः । ११.११ शून्यकोटिः ऋगकोट्यश्च । ११.१२ षड्राधिका कोटिः । ११.१३ सूर्यचन्द्रद्युकाणां कोटिः । ११.१४ सापेक्षिकभास्वरत्वनिश्चयः । ११.२ कोटिभेदाः तेषां निश्चयविषयश्च । ११.२१ (क) चाक्षुषकोटिः । ११.२२ (ख) फोटोविषयकोटिः । ११.२३ (ग) फोटोचाक्षुषकोटिः । ११.२३१ वर्णसूचकम् । ११.२४ (घ) फोटोवियुकोटिः । ११.२५ (ङ) यथार्थकोटिः । ११.२६ नक्षत्राणां सम्मिलितौज्ज्वल्यम् । ११.२७ नक्षत्राणामौज्ज्वल्यम् । ११.२८ उज्ज्वलतमानि नक्षत्राणि । ११.३ नक्षत्राणां दूरत्वम् । ११.३१ दूरत्वनिर्धारणविधिः । ११.३२ नक्षत्रलम्बननिर्धारणरोतयः । ११.३३ वार्षिकलम्बनस्य प्रभावः । ११.३४ दूरत्वप्रमापकाणि । ११.४ नक्षत्राणां गतिः । ११.४१ प्रकृता गतिः, केन्द्रीय गतिश्च । ११.४११ प्रकृता गतिः । ११.४१२ केन्द्रीय गतिः । ११.४२ खगतिः । ११.४३ सूर्यस्य खगतिः । ११.५ परिमाणम् । ११.५१ परिमाणविषयकश्रेणीक्रमः । ११.६१ घनत्वम् । ११.६२ तापक्रमः । ११.७१ नक्षत्राणां वर्णच्छत्रम् । ११.७२ वनस्पतिवर्गः ॥

द्वादशोऽध्यायः । द्विकनक्षत्राणि विकारिनक्षत्राणि च ।

२३९-२५५

१२.१ द्विकनक्षत्राणि । १२.११ द्विकनक्षत्राणां भेदौ । १२.१२ द्विकभावनिर्धारणम् । १२.१३ द्विकानां परस्परपरिक्लपणम् । १२.१४ द्विकानां परस्परसम्बन्धस्य द्वे तत्त्वे । १२.१५ माइक्रोमीटरयन्त्रम् । १२.१६ परिक्लपणगार्गनिर्णयः । १२.१७ द्विकानां कक्षातत्त्वानि । १२.१८ द्विकानां पिण्डमात्रा । १२.१९ उदाहरणानि । १२.२ वर्णच्छत्रीयद्विकानि । १२.२१ वेगरेखाचित्रम् । १२.२२ उदाहरणानि । १२.२३ द्विकानामुत्पत्तिः । १२.३ त्रिकाणि । १२.४ बहुकानि । १२.५ विकारिनक्षत्राणि । १२.५१ विकारिनक्षत्राणां भेदाः । १२.५२ प्रकाशरेखाचित्रम् । १२.५३ स्फुरणशीलविकारिनक्षत्राणि । १२.५३१ भेदाः । १२.५३२ वार्षिकविकारिनक्षत्राणि । १२.५३३ अर्धनियमितविकारिनक्षत्राणि । १२.५३४ दीर्घकालिकविकारिनक्षत्राणि । १२.५३५ अनियतकालिकविकारिनक्षत्राणि । १२.५३६ स्फुरणस्य कारणम् । १२.५४ विस्फोटशीलविकारिनक्षत्राणि । १२.५४१ नामकरणम् । १२.५४२ ऐतिहासिकनव्यनक्षत्राणि । १२.५४३ प्रकाशपरिवर्तनम् । १२.५४४ विस्फोटकारणम् । १२.५४५ वर्णच्छत्रम् । १२.५४६ नव्याभासनक्षत्राणि प्रत्यावर्तिनव्यानि च । १२.५५ ग्रहणशीलविकारिनक्षत्राणि । १२.५५१ उदाहरणम् । १२.५५२ प्रकाशपरिवर्तनानि । १२.५५३ प्रकाशमानग्रहणशीलद्विकानि ॥

त्रयोदशोऽध्यायः । नक्षत्रस्तवका नीहारिकाश्च ।

२५६-२६५

१३.१ नक्षत्रस्तवकाः । १३.११ नक्षत्रस्तवकभेदाः । १३.१२१ उदाहरणम् । १३.१२२ दूरत्वनिर्धारणम् । १३.१३ अवद्वनक्षत्रस्तवकाः । १३.१३१ दूरत्वनिर्णयः । १३.१३२ स्थितिविभागः । १३.१३३ जीवनकालः । १३.१४ गोलीयनक्षत्रस्तवकाः ।

(क)

१३.१४१ उदाहरणानि । १३.१४२ दूरत्वनिर्धारणं स्थितिभिभागश्च । १३.१४३ तेषाम्
अस्मत्तारासंस्थानस्य अङ्गत्वम् । १३.२ नीहारिका । १३.२१ भेदाः । १३.२२ प्रसृता
नीहारिका । १३.२३ ग्रहीयनीहारिका । १२.२४ श्यामा नीहारिका ॥

चतुर्दशोऽध्यायः । आकाशगङ्गासंस्थानम् ।

२६६-२७३

१४.१ आकाशगङ्गाया भगोले स्थितिः । १४.२ आकाशगङ्गीयनियामकाः । १४.३
आकाशगङ्गासंस्थानस्य आकारः । १४.४ आकाशगङ्गासंस्थानस्य अक्षभ्रमणम् ॥

पञ्चदशोऽध्यायः । अत्याकाशगङ्गासंस्थानानि ।

२७४-२८४

१५.१ अत्याकाशगङ्गासंस्थानानां भेदाः । १५.२१ नियतरूपदीर्घवृत्ताकारसंस्थानानि ।
१५.२२ नियतरूपप्रकृतसर्पिलानि संस्थानानि । १५.२३ प्रकृतसर्पिलानां वर्गाः । १५.२४
नियतरूपावरुद्धसर्पिलानि संस्थानानि । १५.२५ नियतरूपसंस्थानानां क्रयः । १५.२६
अनियतरूपाणि आकाशगङ्गेतरसंस्थानानि । १५.३१ आकाशगङ्गेतरसंस्थानेषु दृश्यमान-
नक्षत्राणि । १५.३२ आकाशगङ्गेतरसंस्थानानां परिमाणानि । १५.३३ खगोले संस्थानानां
स्थितिभिभागः । १५.३३ खगोले संस्थानानां स्थितिभिभागः । १५.४ स्थानीयसंस्थानसमूहः ।
१५.५ संस्थानस्तत्रकाः । १५.६ अत्याकाशगङ्गासंस्थानानां केन्द्रीय गतिः । १५.७
विसृत्वरं जगत् ॥

षोडशोऽध्यायः । उत्पत्तिः ।

२८५-२९३

१६.१ सौरमण्डलस्योत्पत्तिः । १६.११ नीहारिकासिद्धान्तः । १६.१२ 'सूर्यादेव सर्वे
ग्रहा जाता' इति वादिनां सिद्धान्तः । १६.१३ 'जीन्स'-महोदयस्य आप्लावसिद्धान्तः ।
१६.१४ ग्रहलवसिद्धान्तः 'चेम्बरलेन'-'मूल्यनयोः' । १६.१५ जेफरीजमहोदयस्य संघात-
सिद्धान्तः । १६.१६ नाक्षत्रजोमेघ-सिद्धान्तः (१) १६.१७ नाक्षत्रजोमेघ-सिद्धान्तः (२) ।
१६.२ विश्वस्य उत्पत्तिः । १६.२१ नीहारिकाणाम् (सर्पिलसंस्थानानां) उत्पत्तिः । १६.२२
नक्षत्रस्तत्रकानामुत्पत्तिः । १६.२३ नक्षत्राणामुत्पत्तिः । द्विकानामुत्पत्तिः ॥

* * * * *

चित्रसूची

खगोलः	१	सघनमाध्यमाद् विरलमाध्यमं प्रवेशः	२९
खगोलः	२	वेधे वर्तनसंस्कारस्य आवश्यकता	२९
क्षितिजं खस्वस्तिकं पूर्वापरदिवृत्तानि	२	सूर्यस्य उदयास्तकालयोर्दीर्घवृत्तत्वम्	३१
खस्वस्तिकं दर्शनस्थानापेक्षि	३	"	३१
समकोणाक्षनियामकाः	४	पृथिव्या अयनगतिः	३२
भूगोले नियामकाः	४	पृथिवी भ्रमरकवद् भ्रमति	३३
दिगंशोन्नतांशपद्धतिः	५	उत्तरध्रुवस्थानस्यायनवृत्ते चलनम्	३३
सदोदितनक्षत्राणि	६	अयनचलनस्य कारणं सूर्याकर्षणम्	३४
नाडीवृत्तम्, ध्रुवौ	७	अयनगतिपरिवर्तनानि	३६
विषुवांशक्रान्त्यंशपद्धतिः	७	अक्षविचलनम्	३६
पार्थिवध्रुवे अहोरात्रवृत्तानि	८	मार्गच्युतिसिद्धान्तः	३७
ध्रुवस्योन्नतांशा दर्शकस्थानापेक्षिणः	८	कालघटिका	३९
विषुवप्रदेशे अहोरात्रवृत्तानि	८	नाक्षत्रदिनम्	४१
अन्यत्र अहोरात्रवृत्तानि	९	कक्षायां भूपरिभ्रमणम्	४२
क्रान्तिवृत्तं कदम्बस्थाने	९	प्राणकलान्तरम्	४३
भोगांशशरांशपद्धतिः	१०	कालसमीकरणम्	४३
पृथिव्या गोलकारत्वम्	१४	अगम्यवस्तुनो दूरत्वनिर्णयः	५१
गोलत्वमानानयनम्	१५	"	५१
पृथिव्या गोलत्वम्	१६	चन्द्रदूरत्वनिर्धारणम्	५२
कूको-महोदयस्य प्रयोगः	१८	भूमध्योयलम्बनम्	५३
सुमेरोः प्रतीयमानविचलनम्	२०	क्षैतिजलम्बनम्	५३
दीर्घवृत्तरचना	२२	लम्बननिर्धारणम्	५४
भूकक्षाव्यासः	२२	चन्द्रव्यासमानानयनम्	५६
चत्वार ऋतवः	२३	चन्द्रस्य सूर्ये परितो भ्रमणम्	५८
विभिन्नतरेषु सूर्यस्य दृष्टमण्डलानि	२५	चन्द्रकलाः	५९
औण्यशैत्ये किरणानामार्जवकौटि- ल्यापेक्षिणी	२५	चन्द्रालोकमात्रा	६०
वर्तनस्य द्वे उदाहरणे	२८	सुव आलोकश्चन्द्रोपरि	६१
वर्तनम्	२८	अक्षभ्रमणव्याख्या	६२
विरलमाध्यमात् सघनमाध्यमं प्रवेशः	२९	अक्षांशविषयकदृश्यताभेदः	६२
		रेखांशविषयकदृश्यताभेदः	६३

(४)

दैनिकदृश्यताभेदः	६३	जीमनरेखादनुरत्नम्	१०३
चन्द्रस्य छायाचित्रम्	६५	ध्रुवप्रकाशचित्रे	१०४
चन्द्रस्य मानचित्रम्	६६	फाडनहौफर रेखाः	१०४
चन्द्रः	६७	सूर्यस्य वर्णच्छत्रम्	१०५
चन्द्रस्य दक्षिणभागः	६८	सूर्यरश्मिविश्लेषगृहीतचित्राणि	१०६
चन्द्रे कोपर्निकसज्वालागिरिमुखम्	६९	"	१०६
चन्द्रे श्पनाइसपर्वतः	७०	सूर्योन्नतज्वालाशिखरे	१०७
राहुकेतू	७१	"	१०७
पाक्षिकसंस्कारः	७४	सूर्योन्नतज्वालाशिखराणि	१०८
आप्लावानां हेतुश्चन्द्रार्कषणमेव	७४	प्रभामण्डलम्	१०९
उच्चाप्लावा अत्युच्चाप्लावाश्च	७५	"	११०
चन्द्रोत्पत्तिः	७६	सूर्यतापविकिरणमात्रानिर्णयः	११२
सूचोच्छिद्रकैमरा	७७	सौरमण्डलम्	११८
अपसृतकिरणपुञ्जः, संसृतकिरणपुञ्जश्च	७८	लघुग्रहस्य दृष्टिः	१२०
छाया	७८	प्रधानग्रहस्य दृष्टिः कलाश्च	१२०
प्रच्छाया उपच्छाया च	७९	ऋज्वी गतिः	१२१
चन्द्रग्रहणभेदाः	८०	लघुग्रहस्य वक्रगतेर्व्याख्या	१२२
भूमायामतिक्रमणम्	८१	प्रधानग्रहस्य वक्रगतेर्व्याख्या	१२२
चन्द्रकक्षायां भूमाव्यासानयनम्	८२	ग्रहकक्षासु स्थिरबिन्दवः	१२३
पूर्णग्रहणं वलयाकारग्रहणं च	८४	टालेमीसमतसौरमण्डलम्	१२४
सूर्यग्रहणभेदाः	८५	टालेमीकृतवक्रगतिव्याख्या	१२५
चन्द्रभाया अतिक्रमणम्	८६	ग्रहकक्षातत्त्वानि	१२६
चन्द्रभादैर्व्यानयनम्	८६	ग्रहाणां परिमाणानि	१२७
चन्द्रभाव्यासमानानयनम्	८७	पूर्वपरमेणान्तरे बुधः	१३१
ग्रहणसम्भावना	८९	बुधनीचस्य च्युतिः	१३३
"	८९	बुधस्य सूर्यबिम्बे संक्रमणम्	१३३
गुरोस्तदुपग्रहाणामाच्छादनम्	९३	शुक्रस्य विभिन्नाः कलाः	१३५
शुक्रसंक्रमणविधिः	९६	शुक्रपृष्ठचिह्नानि	१३६
सूर्यस्य विशालत्वम्	९७	भौमस्य प्रतियोगाः	१३८
सूर्याश्रमणम्	९८	भौमे ऋतुजनितपरिवर्तनानि	१३९
विभिन्नतुल्य विभिन्नदर्शनानि सूर्यस्य	९९	भौमस्य उपरक्त-नीललोहितोत्तरवर्णयोश्चित्रे	१४०
प्रकाशमण्डले कणाः	१००	भौमस्य फोटोचित्रं कलाचित्रं च	१४१
सूर्यलाञ्छनानि	१०१	भौमस्य कलाचिह्नानि	१४२
सूर्यलाञ्छनचक्रम्	१०२	भौमस्योपग्रहौ	१४३

(४)

अवान्तरग्रहाणां क्रमणचिह्नानि	१४४	चक्षुस्तालम्	१७७
एरोस ग्रहः	१४५	वर्तनात्मकदूरदर्शकम्	१७८
गुरोरुपरक्ते नीललोहितोत्तरे चित्रे	१४६	नतोदरदर्पणजनितबिम्बम्	१७८
गुरोः संरचना	१४७	न्यूटोनियन-कैसेग्रेनियनविधी	१७९
गुरौ मेघचिह्नानि	१४८	याम्योत्तरवृत्तम्	१८१
गुरोश्चत्वारो भासुरा उपग्रहाः	१४९	याम्योत्तरवृत्तम्	१८२
गुरोश्चत्वारो भासुरा उपग्रहाः	१४९	याम्योत्तरवृत्तदृश्यक्षेत्रम्	१८२
गुरोरुपरग्रहाणां संक्रमणादयः	१५०	कालाङ्कयन्त्रम्	१८३
उपग्रहसंक्रमणात् प्रकाशगतिनिर्णयः	१५१	कालाङ्ककपत्रे चिह्नानि	१८३
शनेः संरचना	१५३	विषुवदीयदूरदर्शकम्	१८४
शनेश्छायाचित्रम्	१५३	" "	१८५
शनेर्वलयत्रयम्	१५४	" "	१८६
त्रलयानां कलाः	१५४, १५५	स्फटिकघटिकायन्त्रम्	१८७
वरुणस्य पञ्च उपग्रहाः	१५७	अटालिकादूरदर्शकयन्त्रम्	१८८
इन्द्रः, तदुपग्रहः 'टूटिनः'	१५८	रश्मिविश्लेषकयन्त्रम्	१८९
विवृतिकाले कुबेरः	१५९	सरश्मिविश्लेषकदूरदर्शकम्	१८९
कुबेरस्य कक्षावृत्तम्	१६०	सकैमरा-दूरदर्शकम्	१९०
भूमकेतुः १९१० अ	१६३	विभिन्नोद्घाटनकालैर्नक्षत्राणां दर्शनानि	१९१
धूमकेतुः १९४८	१६३	शत-इञ्चीयदूरदर्शकम्	१९२
पुच्छनिर्माणम्	१६४	द्विशत-इञ्चीयदूरदर्शकम्	१९३
गुरुपरिवारः	१६५	नक्षत्रमण्डलानि	१९५
हालिधूमकेतुः	१६६	उत्तरार्द्धे सदोदितनक्षत्राणि	२०४
हालिधूमकेतोर्मार्गः	१६६	शिशिरकालिकनक्षत्राणि	२०५
धूमकेतु-१९२५-द्वितीयस्योज्ज्वल्ये विकासः	१६७	ग्रीष्मकालिकनक्षत्राणि	२०६
रजण्या उत्तरार्द्धे उल्कापतनम्	१६८	शरत्कालिकनक्षत्राणि	२०७
उल्कासंपातबिन्दुः	१६९	वसन्तकालिकनक्षत्राणि	२०८
'एरिजोना' स्थाने उल्कापिण्डजनित-		दक्षिणार्धे सदोदितनक्षत्राणि	२०९
गिरिमुखम्	१७०	कृत्रिमतारामण्डलगृहम्	२१०
राशिचक्रप्रकाशः	१७०	षड्विधुद्दीपानि	२१२
द्विशत-इञ्चीयदूरदर्शकशिखरगोलार्धः	१७४	भासुरतरस्य नक्षत्रस्याधिको व्यासः	२१५
विभिन्नतालेभ्यः प्रकाशवर्तनम्	१७५	फोटोफ्लक्स्य वर्णविशेषस्य ग्राहिता	२१५
बिम्बनिर्माणम्	१७६	फोटोमीटरयन्त्रम्	२१७
बिम्बनिर्माणे प्रयुक्ता नियमाः	१७६	वार्षिकलम्बनम्	२२१
अभिदृश्यतालम्	१७७	रेडियनमानम्—दूरत्वनिर्धारणम्	२२२

(६)

नाक्षत्रलम्बननिर्धारणम्	२२४	शौरिनक्षत्रमण्डले गोलीयनक्षत्रस्तवकः	२५९
वार्षिकलम्बनस्य प्रभावः	२२५	किन्नरनक्षत्रमण्डले गोलीयनक्षत्रस्तवकः	२६०
प्रौक्सिमा-किन्नरनक्षत्रस्य प्रकृता गतिः	२२७	मृगनक्षत्रमण्डले प्रसृता नीहारिका	२६२
प्रकृता-केन्द्रीया खगतिः	२२८	बहुलायां नीहारिकात्वम्	२६२
वर्णच्छत्रतुलना	२३०	द्वे ग्रहीय-नीहारिके	२६३
वर्गीयनक्षत्रस्य वर्णच्छत्रम्	२३०	वीणानक्षत्रमण्डले वलयाकारनीहारीका	२६३
वार्षिकपरिवर्तनम्	२३१	किन्नरस्वस्तिकामध्ये आकाशगङ्गा	२६४
सूर्यस्य खगतिव्याख्या	२३२	आकाशगङ्गायां महाविवरम्	२६५
सूर्यस्य गतिः	२३३	धनुर्नक्षत्रमण्डल आकाशगङ्गा	२६७
भुवोऽनन्ताकाशे स्थितिः	२३३	चर्मवृश्चिकमध्य आकाशगङ्गा	२६८
पिण्डमात्रा-यथार्थकोटिः	२३५	हंसनक्षत्रमण्डल आकाशगङ्गा	२६९
द्विकद्वितययोर्भेदः	२३९	वृश्चिकनक्षत्रमण्डले श्यामानीहारिका	२७०
द्विकस्य परस्परसंबन्धः	२४०	नक्षत्राणां स्थितिविभागः	२७१
माइक्रोमीटरम्	२४१	आकाशगङ्गासंस्थानस्य रूपम्	२७२
माइक्रोमीटरस्य वृत्ताकारपटलम्	२४१	आकाशगङ्गासंस्थानस्याक्षभ्रमणम्	२७३
क्रूर-६० द्विकनक्षत्रस्य भास्वरत्वम्	२४२	द्वे दीर्घवृत्ताकारसंस्थाने	२७४
द्विकपरिक्रमणम्	२४२	मेसिये-३३-सर्पिलसंस्थानम्	२७५
वसिष्ठस्य वर्णच्छत्रम्	२४३	मेसिये-३१-सर्पिलसंस्थानम्	२७६
वेगरेखाचित्राणि	२४४	सर्पिलसंस्थानम्	२७७
चित्रानक्षत्रस्य वेगरेखाचित्रम्	२४५	केशनक्षत्रमण्डलेऽवरुद्धसर्पिलसंस्थानम्	२७७
गरुडस्य प्रकाशरेखाचित्रम्	२४७	नियतरूपसंस्थानानां क्रमः	२७८
गोलस्तवकीयवार्षपर्यस्य प्रकाशरेखाचित्रम्	२४८	बृहद्मैगलानिकमेघः	२७९
आवृत्तिकालयथार्थभास्वरत्वरेखाचित्रम्	२४९	उत्तर-आकाशगङ्गीयार्धे संस्थानानां	
वृषनक्षत्रस्य प्रकाशरेखाचित्रम्	२४९	स्थितिविभागः	२८०
हंसनक्षत्रस्य प्रकाशरेखाचित्रम्	२५०	उत्तरकिरीटमण्डले संस्थानस्तवकः	२८२
नव्यगरुडनक्षत्रस्य भास्वरत्वम्	२५१	नीहारिकासिद्धान्तः	२८५
नव्यनक्षत्रत्रयस्य प्रकाशरेखाचित्रम्	२५२	ग्रहाणामुत्पत्तिः	२८६
नवगरुड १९१८-स्य परिवेष्टनम्	२५२		२८७
ऽऽहंसनक्षत्रस्य प्रकाशरेखाचित्रम्	२५३	नाक्षत्ररजोमेघसिद्धान्तः	२८९
ऽऽर्थिनक्षत्रस्य ग्रहणशीलविकारित्वम्	२५४	नीहारिकाणामुत्पत्तिः	२९०
अलगूनक्षत्रस्य प्रकाशरेखापरिक्रमणमार्गश्च	२५५	देवयानी-संस्थाने नक्षत्राणामुपस्थितिः	२९१
वृषराशौ चलनक्षत्रकुलम्	२५७	द्विकस्योत्पत्तिः	२९२
ययातिनक्षत्रमण्डले द्वाववद्वनक्षत्रस्तवकौ	२५८		

सारिणीसूची

उन्नतांश-वर्तनान्तर-सारिणी	...			३०
ग्रहणानां सारिणी				९१
ग्रहकक्षातत्त्वानां सारिणी	...	...	...	१२७
गुरोरूपग्रहाणां सारिणी				१५२
शनेरूपग्रहाणां सारिणी	...	...	...	१५६
ग्रहाणां सारिणी			...	१६०
नक्षत्रमण्डलानां सारिणी	...	...	...	१९७
याम्योत्तरोल्लङ्घनकालस्य ज्ञानार्थं सारिणी	...	...	...	२००
नक्षत्राणां दिनार्धमानस्य सारिणी	...	...	...	२०१
याम्योत्तरोल्लङ्घनकालिकनतांशानां सारिणी	...	...		२०२
उज्ज्वलतमानां नक्षत्राणां सारिणी	...	...	...	२२०
प्रमुखशीघ्ररातिकनक्षत्राणां सारिणी	...	...	...	२२९
वर्णच्छत्रतापक्रमसम्बन्धसूचकसारिणी	...	...	...	२३७
मुख्यनक्षत्राणां तापक्रमव्यासादयः	...	...		२३८
प्रमुखद्विकानां कक्षातत्त्वानि	...	...		२४३
प्रकाशमानग्रहणशीलनक्षत्राणि	...		...	२५५
स्थानीयसंस्थानसमूहः	...	...	...	२८१, २८३



अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्


प्रथमोऽध्यायः

[ज्योतिर्विज्ञानाध्ययनविषयाणि सकलान्येव पृथिव्यादीनि खगोलसम्बन्धेनैव मनुष्येण निरीक्ष्यन्ते, तस्मिन्नेव च तेषां स्थितयः प्रतीयन्ते; अस्मादेव खलु तस्य विवेचनं प्रथमं करिष्यामः]

खगोलः

१.१ खगोलः

नगराद् बहिर्गत्वा यदि कोऽपि जनश्चन्द्रविहीनशर्वर्यां निरभ्राकाशमवलोकयेत्तर्हि नूनं पश्येत् स नीलाम्बरे रत्नानीव देदीप्यमानान् प्रकाशविन्दून् नक्षत्राख्यान । तदा नक्षत्रपूर्ण-नीलाम्बरमेवं प्रतीयते यत् क्षितिजस्य उपरि कोऽपि गोलार्धः स्थापितोऽस्ति, तस्मिन् नक्षत्राणि संलग्नानि सन्ति । परन्तु होरैककालावधिक-निरीक्षणं विभिन्ननक्षत्रमण्डलानां दर्शनैर्गोलार्धस्याचलत्वं निराकरोति । गोलार्धोऽयं पूर्वतः पश्चिमदिशं प्रति गच्छन् दृश्यते । अत एव खं गोलार्धो नास्ति, इदं गोल एव । अस्य केवलमर्धभागः कालविशेषे जनैर्दृश्यते, अर्थादाकाशस्य दृश्यगोलार्ध उपरि, अदृश्यगोलार्धो दर्शकानामधो वर्तते । आकाशविषयकगोलोऽयं खगोलः कथ्यते ।



खगोलः


खगोलोऽयं यद्यपि काल्पनिको गोलो यस्य मध्यकेन्द्रे दर्शकस्तिष्ठति, तथापि ज्योतिर्विद्यायां खगोलस्य कल्पनातिमहत्त्वपूर्णा । खगोले प्रत्येकस्य नक्षत्रस्य प्रतीयमाना स्थितिरेव

माप्यते । खगोलीयपिण्डानां परस्परदूरत्वादीनां मानं रैखिकप्रमाणकेऽसम्भवमस्ति, अत एव तत् कोणीयप्रमाणके माप्यते । कोणीयान्तराणि गोले एव मापनीयानि, अत एव खगोलकल्पनया इदं सर्वं सम्भवं भवति । एवं नक्षत्राणां ग्रहाणाञ्च स्थितयः परस्परदूरत्वानि च खगोले कोणीयप्रमाणके व्यक्तौ-क्रियन्ते । (इदमग्रे स्पष्टतरं भविष्यति—द्रष्टव्यम् §§१-३—१-६) ।


१.२ खगोलीयक्षितिजं ख-स्वस्तिकञ्च

खस्वस्तिकम्—खगोले ऊर्ध्वाधरदिशायां दर्शकस्य शीर्षस्य यथार्थत उपरि वर्तमानो बिन्दुः खस्वस्तिकं कथ्यते ।

पातालस्वस्तिकम् — खगोले ऊर्ध्वाधरदिशायां दर्शकस्य चरणयोर्यथार्थतोऽधो वर्तमानो बिन्दुः पातालस्वस्तिकमुच्यते ।



खगोलः



क्षितिजम्, खस्वस्तिकम्, पूर्वापरदिष्टानि

खगोलीयक्षितिजम्—खस्वस्तिकात् पातालस्वस्तिकाद्वा नवत्यंशमितत्रिज्यया खगोले कल्पितं महद् वृत्तं खगोलीयक्षितिजं प्रोच्यते । इदं प्रायेण दर्शकस्य भूपृष्ठीय-क्षितिजादभिन्नमेव ।

ऊर्ध्वाधरमहद्वृत्तानि — खस्वस्तिक-पातालस्वस्तिक-प्रोतानि महद्वृत्तानि 'ऊर्ध्वाधरमहद्वृत्तानि' कथ्यन्ते । एतानि सर्वाणि खगोलीयक्षितिजं नवत्यंशकोणैरुल्लङ्घयन्ति ।

दिशाः—खगोलीय-क्षितिजस्य चतसृषु दिशासु

प्रथमोऽध्यायः

३


चत्वारि समस्थानानि वर्तन्ते—पूर्वसमस्थानम्, दक्षिणसमस्थानम्, पश्चिमसमस्थानम्, उत्तर-समस्थानञ्च । क्रमिकसमस्थानद्वयमध्ये नवत्यंशमितचापो वर्तते ।

याम्योत्तरवृत्तम्—दक्षिणसमस्थान-उत्तरसमस्थान-प्रोतम् ऊर्ध्वाधरमहद्वृत्तं याम्योत्तर-मुच्यते ।

पूर्वापरवृत्तम्—पूर्वसमस्थान-पश्चिमसमस्थान-प्रोतम् ऊर्ध्वाधरमहद्वृत्तं पूर्वापरवृत्तं सम-मण्डलं वा प्रोच्यते ।

१.२१ दर्शकस्थित्यनुसारं खगोलीयक्षितिजं परिवर्तते

खगोलीयक्षितिजं खस्वस्तिकं वा दर्शकस्थित्यनुसारं परिवर्तते । निम्नचित्रेणेदं स्पष्टी-भविष्यति । चित्रे त-स्थानस्य ख-स्वस्तिकं थ-स्थानस्य पाताल-स्वस्तिकं भवति ।



१.३ खगोलीयनियामकाः— (१) दिगंशोन्नतांशपद्धतिः

नियामकाः—लोकव्य-
वहारेऽपि कस्यचित् स्थानस्य
निर्देशनार्थं नियामकाः प्रयु-
ज्यन्ते । यदि कस्मिंश्चिन्नगरे
समकोणकाः पन्थानः सन्ति, अ-
स्थाने कोऽपि नवागतो जनः
क-स्थानगमनाय मार्गं पृच्छति
तर्हि तन्नगरवासी तमेवं वदति,
“भवान् पूर्वदिशायामितो हस्ता-
नां शतद्वयं गच्छतु, तत उत्तर-
दिशायां हस्तशतमितमध्वानं
गच्छतु, तदा तत्र क-स्थानं

लप्स्यते” इति । अत्र समकोणाक्षनियामकपद्धतिरवलम्बितास्ति । पूर्वापरदिशा याम्योत्तरदिशा, अत्र
द्वौ नियामकाक्षौ; द्विशतहस्तमितदूरत्वं शतहस्तमितदूरत्वञ्चात्र नियामकौ—एतौ नियामकाक्षम्
अनुनिर्दिश्येते । अ-स्थानञ्चात्र मूलबिन्दुः । एवं समकोणाक्षनियामकपद्धत्यां सन्ति ।

(१) एको मूलबिन्दुः (यथा अ-स्थानम्) ।

(२) एकः प्रधानोऽक्षः (यथा पूर्वापरदिशा) ।


(३) एको गौणोऽक्षः (मूलबिन्दुगामी प्रधानाक्षसमकोणकः) यथा याम्योत्तरदिशा ।

(४) प्रथमो नियामकः (भुजः—यथा द्विशतहस्तमितदूरत्वम्) ।

(५) द्वितीयो नियामकः (कोटिः—यथा शतहस्तमितदूरत्वम्) ।

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

गोलीयनियामकाः—एवमेव भूगोले अक्षांशा देशान्तररेखांशाश्च नियामकरूपेण प्रयुज्यन्ते । कस्यचित् स्थानस्य निर्देशनं भूगोलविद् नियामककथनेन करोति । यथा काशीनगरस्य



समकोणाक्षनियामकाः

निर्देशनमेवं क्रियते—अक्षांशाः $25^{\circ}12'$ देशान्तररेखांशाः 83° । अत्र गोलीयनियामक-पद्धतिरवलम्बितास्ति । तत्र सन्ति—


(१) एकं प्रधानमहद्वृत्तम् (यथा भूगोले विषुवरेखा) ।

(२) गौणानि महद्वृत्तानि—एतानि सर्वाणि प्रधानमहद्वृत्तस्य ध्रुवयोर्लङ्घनानि, प्रधानमहद्वृत्तं समकोणैरुल्लङ्घयन्ति । (यथा भूगोले देशान्तररेखांशाः)

(३) एकं प्रमुख-गौणमहद्वृत्तम्—गौणेषु महद्वृत्तेषु एकं प्रमुखरूपेण निर्धार्यते यतो रेखांशानां प्रवृत्तिर्भवति । (यथा 'ग्रिनिच' रेखा)

(४) प्रथमो नियामकः—प्रधानवृत्तमनु मापितं प्रमुखगौणवृत्तात् स्थानविशेषस्य कोणी-यान्तरम् । (यथा रेखांशाः)

(५) द्वितीयो नियामकः—गौणवृत्तमनु मापितं प्रधानवृत्तात् स्थानविशेषस्य कोणीया-न्तरम् । (यथा अक्षांशाः) ।



भूगोले नियामकाः

प्रथमोऽध्यायः


५

१.३१ दिगंशकोटि-उन्नतांशाः (दिगंशोन्नतांशपद्धतिः)

अस्यां पद्धत्या प्रधानं महद्वृत्तं क्षितिजमस्ति । गौणानि महद्वृत्तानि नैकानि खस्वस्तिक-प्रोतोर्ध्वाधरवृत्तानि । प्रमुखगौणमहद्वृत्तं प्रायेण दक्षिणसमस्थानप्रोतोर्ध्वाधरवृत्तं (याम्योत्तर-वृत्तम्) अस्ति । [भारतीयपद्धत्या पूर्वसमस्थानप्रोतोर्ध्वाधरवृत्तम्, अर्थात् पूर्वापरवृत्तं प्रमुख-गौण-महद्वृत्तमस्ति] । प्रथमो नियामको दिगंशाः, द्वितीयो नियामक उन्नतांशाः कथ्यन्ते । नक्षत्रप्रोतम् ऊर्ध्वाधरवृत्तं नक्षत्रस्य दृङ्मण्डलं कथ्यते ।

दिगंशाः—क्षितिजमनु मापितं दक्षिणसमस्थानाद् नक्षत्रविशेषस्य कोणीयान्तरं दिगंशाः । अर्थात् क्षितिजस्य दृङ्मण्डल-याम्यसमस्थान-मध्यवर्तिनो वृत्तांशा दिगंशाः ।

उन्नतांशाः—दृङ्मण्डलमनु मापितं क्षितिजाद् नक्षत्रस्य ऊर्ध्वत्वं निम्नत्वं कोणीयप्रमापके



अत्र नक्षत्रस्य दिगंशाः ११०° उन्नतांशा ५०°

नक्षत्रस्य स्थाननिर्धारणम्


उन्नतांशाः । अर्थाद् दृङ्मण्डलस्य नक्षत्र-क्षितिजदृङ्मण्डलसंपात-मध्यवर्तिनो वृत्तांशा उन्नतांशाः ।

पद्धतेर्गुणावगुणाः—पद्धतिरियमतिसरला । यदि कोऽपि जनो जानाति यद् नक्षत्र-विशेषो दक्षिणसमस्थानत इयन्मात्रकं पूर्वम्, क्षितिजादियन्मात्रकमूर्ध्वं वर्तते (अर्थाद् दिगंशा उन्नतांशाश्च विदिताः) तर्हि स प्रथमं दक्षिणाभिमुखो भवति, तत आत्मानं भ्रामयित्वा इष्ट-दिशाया आभिमुख्यं भजते, ततः शिरो विदितांशैरुन्नमति, नक्षत्रञ्च पश्यति ।

परन्तु प्रत्येकं स्थानस्य विभिन्नानि क्षितिजानि खस्वस्तिकस्थानानि च भवन्ति । अत एव स्थानविशेषे प्राप्ता नियामकाः स्थानान्तराय अनुपयुक्ताः । नक्षत्राणि काले काले परिवर्तनं भजन्ते । अत एव स्थानविशेषे विदिता अपि नियामकाः काले भिन्ना भवन्ति । अत एव देशकाल-भेदादियं पद्धतिर्नाधिकमुपयुक्ता ।

१.४ खगोलीयनियामकाः—(२) विषुवांशक्रान्त्यंशपद्धतिः

ध्रुवस्थानम्—प्रायेण नक्षत्राणि खे पूर्वतः पश्चिमदिशां प्रति गच्छन्ति दृश्यन्ते, तथाप्याकाशमवलोकयद्भिर्ज्योतिर्विद्भिर्दृष्टं यत् खगोले स्थानविशेषे स्थितमेकं नक्षत्रं परिभ्रमणं न भजते (द्रष्टव्यं फोटो-चित्रम्) । अत एव तैर्निश्चितं यद् यदि नक्षत्राणां दूरत्वं ध्रुवस्थानाद् मापितं भवेत् तर्हि तल्लब्धा नियामकपद्धतिः स्थानकालपरिवर्तनैरप्रभावितत्वादत्यन्तमुपयुक्ता भवेत् । पद्धतिरियं विषुवांशक्रान्त्यंशपद्धतिरुच्यते ।



ध्रुवस्थानम्—खगोलस्य यो बिन्दुरचलो दृश्यते ध्रुवस्थानं कथ्यते । खगोले द्वे ध्रुवस्थाने उत्तरध्रुवस्थानं दक्षिणध्रुवस्थानम् । उत्तरध्रुवस्थानात् समीपवर्ति नक्षत्रं 'ध्रुवः' कथ्यते । ध्रुवनक्षत्रं परिवर्तनशीलमस्ति (द्रष्टव्यम् § १२.६१) ।

सदोदितनक्षत्राणि [यरकजवेधशाला] ।
ध्रुवसमीपवर्तिनक्षत्राणां छायाचित्रं प्रकाशोद्घाटनं होरैकमितम् ।
मध्ये ध्रुवो ध्रुवस्थानञ्च ।

नाडीवृत्तम्—ध्रुवस्थानाद् नवत्यंशमितत्रिज्यया खगोले कल्पितं वृत्तं नाडीवृत्तं विषुववृत्तं कालवृत्तं वा कथ्यते ।


१.४१ नियामकपद्धतिः

अस्यां पद्धत्यां प्रधानं महद्वृत्तं नाडीवृत्तमस्ति । गौणानि महद्वृत्तानि ध्रुवयोर्लङ्गानि महद्वृत्तानि । प्रमुखगौणमहद्वृत्तं मेघसम्पातप्रोतं ध्रुवयोर्लङ्गं महद्वृत्तमस्ति । प्रथमो

प्रथमोऽध्यायः

७

नियामको विषुवांशाः, द्वितीयो नियामकः क्रान्त्यंशाः कथ्यन्ते । नक्षत्रप्रोतं ध्रुवयोर्ऋग्नं गौणमहद्वृत्तं होरावृत्तनाम्ना प्रसिद्धम् ।



विषुवांशाः— नाडीवृत्तमनु मापितं मेषसंपातान्नक्षत्रविशेषस्य कोणीयान्तरं विषुवांशाः । अर्थाद् नाडीवृत्तस्य होरावृत्तसंपात-मेषसंपात-मध्यवर्तिनो वृत्तांशा विषुवांशाः । विषुवांशानां गणना मेषसंपातात् पूर्वदिशायां भवति । विषुवांशाः कोणप्रमापके ०° अंशात्प्रारभ्य ३६० अंशपर्यन्तम्, होराप्रमापके ० होरातः प्रारभ्य २४ होरापर्यन्तं गण्यन्ते ।

क्रान्त्यंशाः—होरावृत्तमनु नाडीवृत्ताद् नक्षत्रविशेषस्य कोणीयान्तरं क्रान्त्यंशाः कथ्यन्ते ।

नाडीवृत्तम्, ध्रुवौ


अर्थाद् होरावृत्तस्य नक्षत्र-होरावृत्तनाडीवृत्तसम्पात-मध्यवर्तिनो वृत्तांशाः क्रान्त्यंशाः ।

१.५ खगोलीयनियमाकाः—(३)

होराकोणक्रान्त्यंशपद्धतिः

पद्धतिरियं पूर्ववत् । केवलं प्रमुखगौणवृत्तमत्र दर्शकस्य याम्योत्तरवृत्तमस्ति । अत एव नाडीवृत्तमनु मापितं याम्योत्तरवृत्त-नाडीवृत्त-सम्पाताद् नक्षत्रविशेषस्य कोणीयान्तरं होराकोणः । याम्योत्तरवृत्तस्य द्वे शाखे—प्रथमायां शाखायां खखस्तिकयुक्त-याम्योत्तरवृत्तार्धः, द्वितीयायाञ्च पातालखस्तिकयुक्त-याम्योत्तरवृत्तार्धः ।

होराकोणा याम्योत्तरवृत्तापेक्षित्वात् स्थानपरिवर्तनात् परिवर्तन्ते । भूगोलविषयकरेखांशवर्षां गणना 'प्रिनिचस्थहोराकोणेन' क्रियते ।




नक्षत्रस्य स्थाननिर्धारणं (विषुवांश-क्रान्त्यंशपद्धत्याम्) .

इष्टनक्षत्रस्य विषुवांशा २०° क्रान्त्यंशाः २०°

१.५१ अहोरात्रवृत्तानि

नक्षत्राणि प्रतिदिनं पूर्वतः पश्चिमदिशायां गच्छन्ति । गतिरियं तेषां दैनन्दिनी गतिः कथ्यते । तेषां मार्गाश्च अहोरात्रवृत्तानि कथ्यन्ते ध्रुवसमीपवर्तिनक्षत्राणि मन्दगत्या अहोरात्रवृत्तेषु भ्रमन्ति । नाडीवृत्तसमीपवर्तिनक्षत्राणि तीव्रगत्या निजेष्वहोरात्रवृत्तेषु भ्रमन्ति ।



सुमेरु (पार्थिवोत्तरध्रुव) स्थाने ध्रुवस्थानं
खखस्तिफ्रे वर्तते, क्षितिजञ्च नाडीवृत्तादभिन्नं
भवति । अत एव नाडीवृत्तसमानान्तराण्यहो-
रात्रवृत्तानि क्षितिजसमानान्तराणि भवन्ति (द्रष्टव्य-
मेतच्चित्रम्) । अत एव उत्तरार्धवर्तिनक्षत्राणि


वर्षिज्युते अहोरात्रवृत्तानि

सदोदितनक्षत्राणि भवन्ति ।

ध्रुवस्य उन्नतांशाः स्थानापेक्षिणः
सन्ति । चित्रे इदं स्पष्टीभविष्यति ।


अत्र ध्रुवसुमेरौ ध्रुवस्य उन्नतांशः
शून्यमितः । निरक्षप्रदेशे 90°
मितः । अन्यस्थाने (90° -अक्षांश)
मितः ।

पाथिवविषुवरेखावर्तिप्रदेशेषु ध्रुव-
स्थानं क्षितिजकण्ठं दृश्यते । नाडीवृत्तश्च
खस्वस्तिककण्ठं भवति । अत एव
नाडीवृत्तचमानान्तराणि अहोरात्रवृ-
त्तानि ऊर्ध्वाधराणि भवन्ति । अत एव
प्रत्येकं नक्षत्रं (उत्तरार्धवर्ति दक्षिणा-
र्धवर्ति वा) तत्र दृश्यते ।



ध्रुवस्योन्नतांशा दर्शकस्थानापेक्षिणः

सुमेरु-विपुत्ररेखामध्यवर्तिस्थानेषु
ध्रुवस्थानं खस्सस्तिक्कात् क्षितिजाच्च
काञ्चित् प्रवणतां भजते । अत एव
अहोरात्रवृत्तानि तिर्यग् भवन्ति ।
खगोलस्य कश्चिद् भागः क्षितिजस्य
सदैव अधः, कश्चिद् भागः सदैव उपरि
वर्तते । खगोलस्य यो भागः सदैव
क्षितिजस्य अधो वर्तते, तद्वर्तानि



पार्थिवविषुवरेखायामहोरात्रवृत्तानि


प्रथमोऽध्यायः

६

नक्षत्राणि कदापि न दृश्यन्ते । यो भागः सदैव उपरि वर्तते तद्वर्तीनि नक्षत्राणि सदैव दृश्यन्ते ।
मध्यवर्तिभागस्य नक्षत्राणि वर्षे कदाचिद् दृश्यन्ते, कदाचिन्न दृश्यन्ते ।

सदोदितानि नक्षत्राणि—उपर्युक्तं
यत् खस्य यो भागः सदैव उपरि वर्तते
तद्वर्तीनि नक्षत्राणि सदैव दृश्यन्ते ।
एतानि नक्षत्राणि सदोदितानि नक्ष-
त्राणि कथ्यन्ते ।


यदि नक्षत्रस्य क्रान्त्यंशः स्थान-
विशेषाक्षांशहीननवत्यंशेभ्योऽल्पा न
(यदि क्रान्त्यंशः $> 90^\circ$ —अक्षांशः)
तर्हि स्थानविशेषे तन्नक्षत्रं सर्वदा
दृश्यते ।



उदाहरणम् — देहरादूनस्य
अक्षांशः $+ 30''$, अत एवात्र तानि
नक्षत्राणि सदोदितानि । येषां क्रान्त्यंशः $(90 - 30 =) 60^\circ$ अंशतुल्याः 60° अंशेभ्योऽधिकाः ।

सुमेरु, विषुवरेखा, चन्द्रादि स्थाने अक्षरान्वृत्तानि

१.६ खगोलीयनियामकाः—(४) खगोलीयानां शरेखांशपद्धतिः



क्रान्तिवृत्तं कदम्बस्थाने

क्रान्तिवृत्तम्—सूर्यस्य प्रतीयमानो वार्षिकमार्गः क्रान्तिवृत्तं कथ्यते । अस्य नाडीवृत्ताद् $२३\frac{1}{2}^{\circ}$ मित्ता प्रवणता विद्यते ।

उत्तरायणम्, दक्षिणायनम्, मेषसंपातः, तुलासंपातः—क्रान्तिवृत्तं ययोः स्थानयोर्नाडी-वृत्तमुल्लङ्घयति, तत्र संपातौ विद्येते । प्रतीयमानः सूर्य उत्तरं गच्छन् यत्र नाडीवृत्तमुल्लङ्घयति तत्र मेषसंपातः, यत्र च दक्षिणं गच्छन् नाडीवृत्तमुल्लङ्घयति तत्र तुलासंपातः ।


उत्तरायणं दक्षिणायनं च क्रान्तिवृत्ते नाडीवृत्ताद् दूरतमस्थाने । उत्तरायणं उत्तरार्धे, दक्षिणायनं दक्षिणखगोलार्धे वर्तते ।

कदम्बस्थानम्—क्रान्तिवृत्तस्य ध्रुवस्थाने उत्तरकदम्बस्थानं दक्षिणकदम्बस्थानं कथ्येते ।

१.६१ नियामकपद्धतिः

यतः प्राचीनज्योतिर्विद्भिः प्रायेण सूर्यचन्द्रयोर्ग्रहाणां वा स्थितिर्मणिता, एते सर्वे च क्रान्तिवृत्तेऽथवा क्रान्तिवृत्तस्य सामीप्ये वर्तन्ते, अत एव तैः खगोलीयाक्षांशाः खगोलीयरेखांशाः प्रायुज्यन्ते ।

अस्यां पद्धत्यां प्रधानं महद्वृत्तं क्रान्तिवृत्तमस्ति । नैकानि कदम्बयोर्लङ्गानि महद्वृत्तानि



भोगांशशरपद्धतिः

गौण-महद्वृत्तानि । प्रमुखगौणवृत्तं मेषसंपातप्रोतं कदम्बयोर्लङ्गनं गौणमहद्वृत्तम् । प्रथमो नियामक-खगोलीयरेखांशाः (भारतीयपद्धत्यां भोगांशाः क्षेत्रांशा वा), द्वितीयो नियामकश्च खगोलीया-

क्षांशाः (भारतीयपद्धत्यां शराः) सन्ति । नक्षत्रप्रोतं कदम्बयोलङ्गं गौणमहद्वृत्तं नक्षत्र-कदम्ब-
प्रोतमण्डलं कथ्यते ।

खगोलीयरेखांशाः—क्रान्तिवृत्तमनु मापितं मेषसंपाताद् नक्षत्रविशेषस्य कोणीयान्तरं
खगोलीयरेखांशाः ।

खगोलीयाक्षांशाः—नक्षत्रकदम्बप्रोतमण्डलमनु मापितं क्रान्तिवृत्ताद् ऊर्ध्वत्वं निम्नत्वं
कोणप्रमापके खगोलीयाक्षांशाः ।

१.७ विभिन्ननियामकानां प्रयोगस्थलानि

दिगंशान्तांशपद्धतिः प्रायेण नौचालने प्रयुज्यते । विषुवांशक्रान्त्यंशपद्धत्यां नक्षत्राणां
सूची निर्मायते । नाटिकलपञ्चाङ्गेषु ग्रहाणां नियामका होराकोण-क्रान्त्यंशपद्धत्यापि दीयन्ते ।
सूर्यचन्द्रयोः खगोलीयरेखांशा खगोलीयाक्षांशा यदा कदा प्रयुज्यन्ते ।

विशेषद्रष्टव्यानि

खगोलस्य खगोलज्ञानस्य च भारतीयज्यौतिषग्रन्थेष्वतिमहत्त्वमिति प्रमुखग्रन्थान्तर्गत-
'गोलाध्याय'विरचनेनैव प्रत्यक्षम् । गोलाध्याया ग्रन्थस्य प्रमुखभागा आसन्, गोलज्ञानं विना
ज्योतिर्विद् इन्दुरहितशर्वरीतुल्यो ज्यौतिषग्रन्थश्च सारहीन एव—

शशधरकिरणैर्विना प्रदोषः कुचरहितं ललनाजनस्य वक्षः ।

मधुररसविवर्जितं च भोज्यं न किमपि गोलविवर्जितं च तन्त्रम् ॥

खगोलस्य वास्तविकी सत्ता न काऽपि, तस्य कल्पना ग्रहाणां स्थानमानप्राप्तये कृता
(§ १.१) इति भास्कराचार्यस्याप्यभिमता ।

दृष्टान्त एवावनिभग्रहाणां संस्थानमानप्रतिपादनार्थम् ।

गोलः स्मृतः क्षेत्रविशेष एष प्राज्ञैरतः स्याद् गणितेन गम्यः ॥

अस्मिन्नध्याये व्यवहृतानां खस्वस्तिक-क्षितिज-ध्रुव-कदम्बादीनां सुज्ञा आसन् भारतीय-
ज्यौतिषाचार्याः । प्रत्येकं प्रमुखग्रन्थे 'त्रिप्रश्नाधिकारः' अवश्यं वर्तते । तत्र तत्सम्बन्धिगोलाध्याये
च प्रायः सर्वेषाम् अत्र प्रयुक्तानां पारिभाषिकशब्दानां परिभाषा दत्ताः सन्ति । अत्र निदर्शनार्थं
भास्कराचार्यपठिताः कतिपयाः परिभाषा दीयन्ते—

याम्योत्तरवृत्तं ध्रुवस्थानं सममण्डलञ्च

पूर्वापरं विरचयेत् सममण्डलख्यं याम्योत्तरञ्च विदिशोर्वलयद्वयञ्च ।

ऊर्ध्वाध्र एवमिह वृत्तचतुष्कमेतदावेष्ट्य तिर्यगपरं क्षितिजं तदर्धे ॥

एकं पूर्वापरमन्यद् याम्योत्तरं तथा कोणवृत्तद्वयमेवं वृत्तचतुष्टयमूर्ध्वाधोरूपमावेष्ट्य तदर्धे
वृत्तं क्षितिजाख्यं निवेशयेत् । अत्र याम्योत्तरवृत्त उत्तरक्षितिजादुपरि पलांशान्तर एकं ध्रुवचिह्नं
कार्यम् । दक्षिणक्षितिजादधोऽन्यत् । (द्रष्टव्या चित्रसंख्या ३)

विषुवन्मण्डलम्—तयोरेव पूर्वापरसंपातयोर्विज्ञानं तथा याम्योत्तरवृत्ते खस्वस्तिकाद् दक्षिणतोऽधःस्वस्तिकादुत्तरतोऽक्षांशान्तरे यद् वृत्तं निबध्येत तद् विषुववृत्तम् ।

वेधकार्येषु नियामकानां प्रथमा पद्धतिः स्वीकृतासीत् । कालादिज्ञानाय (उदयास्तज्ञानाय) द्वितीया पद्धतिः प्रचलितासीत् । ग्रहाणां स्थानज्ञानाय चतुर्थी पद्धतिः प्रसिद्धासीत् । पद्धतय एताः सर्वेषां सुविदिता एव, अत एव विस्तरेण न दीयन्ते ।

§. १.५१—तमे यथा वर्णितं तथैव श्रीपतिनोक्तम्—

याम्योत्तरस्थौ क्षितिजाश्रितौ ध्रुवौ सदैव पश्यन्ति निरक्षदेशजाः ।
स्वमूर्धगं मेरुगतास्तमुत्तरं तथेतरं वाडववासिनो जनाः ॥
भूमस्तकाद् भूमितलं नरा ये निरक्षदेशाभिमुखं प्रयान्ति ।
तैरीक्ष्यतेऽभ्युन्नतमृक्षचक्रमिदं ध्रुवश्चापि नतः क्रमेण ॥

द्वितीयोऽध्यायः

“द्यौर्मे पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्मे माता पृथिवी महीयम्”

(ऋ० सं० १-१६४-३३)

[पृथिवी सर्वेषामस्माकं धारयित्री पालयित्री सहजपरिचिता च । अत्र तस्या आकार-
क्षेत्रमणादीनि वर्ण्यन्ते । तदक्षेत्रमणपरिक्रमणापेक्षित्वात् कालविभागोऽप्यत्रैव दीयते ।]

पृथिवी

२.१ पृथिव्या आकारः

पृथिवी गोलकारेति सिद्धान्तोऽतिप्राचीनः । भारतवर्षे ग्रीसादिदेशेषु वा सर्वत्र ज्योतिर्विद्भिर्गोलकारत्वस्य प्रमाणानि प्रस्तुतान्यनेकधा । मध्ययुगादागतानि प्रमाणान्येतान्येव—

(अ) यदा कश्चित्पोतः समुद्रतटमुपसरति तदा प्रथमं समुद्रतटवर्तिजनैस्तस्य कृपाग्रमेव दृश्यते, तदनन्तरं तस्य मध्यभागो दृष्टिगोचरतां याति, अन्ततः पूर्णः पोतो नेत्रपथे आपतति । घटनाक्रमोऽयं तदैव सम्भवो यदा पृथिवी समतला न भवेत् । चेत् पृथिवी समतलाऽभविष्यत्तर्हि पोतः सम्पूर्णत्वेनैव प्रथमतो द्रष्टव्योऽभविष्यत् ।

इत्थमेव यदा पोतः पर्वतीयसमुद्रतटमुपगच्छति तदा पोतस्थजनः प्रथमं पर्वतशिखरमात्रं पश्यति, पुनश्च पर्वतमध्यभागं पश्यति, अन्तत एव पर्वतमूलवर्तिप्रदेशानीक्षते । अयमपि घटनाक्रमः पृथिव्याः समतलत्वं निराकरोति ।

(आ) सूर्योदयः सर्वत्र एकस्मिन्नेव समये न भवति; पूर्ववर्तिदेशेषु सूर्योदयः पूर्वं भवति, पश्चिमवर्तिदेशेषु च पश्चात् । अत एव पृथिवी समतला न, अन्यथा सर्वत्र समकालमेव सूर्योदयो भवेत् ।

(इ) चन्द्रग्रहणे चन्द्रस्य तिरोहितभागो गोलकारः । चन्द्रग्रहणं तदैव सम्भवं यदा चन्द्रसूर्ययोर्मध्ये पृथिवी आगच्छति । चन्द्रे पतिता भूमा एव ग्रासकारणम् । यदि पृथिव्या आकारो गोलेतरो (यथा त्रिकोणाकारः) भवेत्तस्याः प्रतिबिम्बमपि गोलेतरं (यथा त्रिकोणाकारं) भवेत् । गोलवस्तुन एव प्रतिबिम्बं सर्वदा गोलम्, नान्याकारवस्तुनः ।

(ई) कश्चिज्जो यथा यथा स्वस्थानाद् उत्तरदिशि दक्षिणदिशि वा गच्छति तथा तथा स रात्रौ नवीनं नक्षत्रमण्डलमवलोकते । नूतननक्षत्रमण्डलानामालोकनं क्षितिजानां भिन्नत्वादेव सम्भवम् । क्षितिजानां भिन्नत्वं गोलकारे एव सम्भवम् (द्रष्टव्यः § १.५१) (क्षितिजं वस्तुतो भूगोलस्य भूपृष्ठवर्तिनी स्पर्शरेखा, स्पर्शरेखायां भिन्नत्वं गोलकारवस्तुन एव, समतलवस्तुन एकैव स्पर्शरेखा) । अत एव पृथिवी यदि समतलचक्राकाराऽभविष्यत् स्थानपरिवर्तनेन न नूतननक्षत्रचयनं नयनपथमागमिष्यत् । एवमपरिचितनक्षत्रमण्डलस्य दर्शनं समर्थयति पृथिव्या गोलकारत्वम् ।

(उ) यथा यथा नरो निरक्षदेशाद् उत्तरदिशि गच्छति तथा तथा ध्रुवस्योन्नतांशा अधिका भवन्ति । निरक्षदेशे तु ध्रुवः क्षितिजलग्नः, अर्थाद् उन्नतांशास्तस्य शून्यमिताः । यथा यथा नर उत्तरदिशि चलति, ध्रुवस्योन्नतांशा उत्तरोत्तरां वृद्धिं प्राप्नुवन्ति । अन्ततो ध्रुवप्रदेशे ध्रुवः स्वस्वस्तिके वर्तते, अर्थात्तस्योन्नतांशा नवतिमिता भवन्ति । पृथिवी यदि गोलाकारा नाभविष्यद् ध्रुवस्योन्नतांशाः सर्वत्र सममिता अभविष्यन् ।

(ऊ) यूरोपीयदेशेषु मध्ययुगात् प्रारभ्य नाविका विशालजलपोतमारुह्य सुदूरदेशानपि अगच्छन्, तेषामनुभवोऽप्येष यत् पृथिवी समतला न । एकस्मात् स्थानात् प्रस्थितास्ते-



पृथिव्या गोलाकारत्वं स्पष्टमत्र दृश्यते ।

द्वितीयोऽध्यायः

१५

ऽकस्मादधोगतिम् ऊर्ध्वारोहणञ्चान्वभवन् । सर्वत्र समतले एव गच्छन्तः पुनः प्रस्थानस्थलमा-
गच्छन् । अतः पृथिवी गोलाकारैव ।


आधुनिककाले उपर्युक्तान्येव प्रमाणानि वेधोपलब्धसूक्ष्मगणनया नवीनतमयन्त्रोपलब्ध-
निरीक्षणैर्वैज्ञानिकपद्धत्या च परिपुष्टतां लभन्ते । नवीनतमं प्रमाणमग्निवाण द्वारा भुवः फोटो-
चित्रम् । नातिपूर्वखिस्तीये १९४७-तमे वत्सरे मार्चमासस्य ७-तमे दिनाङ्के 'न्यूमेक्सगो'
स्थान एकोऽग्निवाण आकाशे प्रक्षितः । १०१-क्रोशार्धोच्छ्रय आकाशवाणस्थ-कैमरा-यन्त्रेण
पृथिव्या यद् फोटोचित्रं गृहीतं तदत्र दत्तम् । १४ पृष्ठस्थेन चित्रेण पृथिव्या गोलाकारत्वं
सुस्पष्टमेव दृश्यते ।

पृथिव्या गोलाकारत्वमेव न केवलमाधुनिकज्योतिर्विद्भिः सुप्रमाणितम्, गोलत्वपरिमाणमपि
सुनिरूपितम् । गोलत्वमानं (वक्रतामानम्) एवं क्रियते । एकः सुदृढः क्रोशमितदीर्घो लौहदण्डः
पोतात् समुद्रमध्ये सुदृढयन्त्रेण मध्यभागाद् लम्ब्यते । यतः पृथिवी गोलाकारा, अतः समुद्रपृष्ठं
शनैः शनैर्निम्नतामाधिगच्छति, लौहदण्डस्य च उभे कोटी समुद्रपृष्ठात् किञ्चिदूर्ध्वं तिष्ठतः ।
सूक्ष्मनिरीक्षणेनेदम् ऊर्ध्वत्वम् अष्ट-इञ्च-मितम्, अर्थात् पृथिवी क्रोशार्धे अष्ट-इञ्च-मितं निम्नत्वं
भजते । निम्नत्वमिदमन्तरवर्गेण च भिद्यते, अर्थात्

$$२ \text{ क्रोशार्धान्तरेण } २^२ \times ८ = ३२ \text{ इञ्चतुल्यम् ।}$$

$$३ \text{ क्रोशार्धान्तरेण } ३^२ \times ८ = ७२ \text{ इञ्चतुल्यं भवति ।}$$

निम्नचित्रमिदं प्रदर्शयति—




गोलत्वमाननयनम्

२.११ पृथिव्या ध्रुवनिम्नता

पूर्वानुच्छेदे पृथिव्या गोलाकारत्वं प्रमाणपुरस्सरं व्याख्यातम् । परन्तु पृथिवी सर्वथा
गोलाकारा न, तस्या ध्रुवप्रदेशौ किञ्चिद् निम्नावेव । यदि पृथिवी साकल्येन गोलाकाराऽभविष्यत्

तर्हि देशान्तरवृत्तानि सर्वथा वृत्ताकाराणि, देशान्तरवर्तिनः कस्यचिदक्षांशस्य दीर्घत्वं सर्वत्र सममितमेवाभविष्यत् । परन्तु देशान्तरवृत्तानि दीर्घवृत्ताकाराणि, अक्षांशस्य दीर्घत्वञ्चासमम् । निम्नलिखितसारिण्यामक्षांशस्य दीर्घत्वं सूक्ष्मतया परिमाप्य लिखितम्—

निरक्षप्रदेशे	एकस्याक्षांशस्य	दीर्घत्वम्—६८.७०४	क्रोशार्धमितम् ।
२०° अक्षांशप्रदेशे	„ „	६८.७८६	„ „ ।
४०° „ „	„ „	६८.९९३	„ „ ।
६०° „ „	„ „	६९.२३०	„ „ ।
८०° „ „	„ „	६९.३८६	„ „ ।



उपरिलिखितसारिण्या सुस्पष्टं यद् ध्रुवप्रदेशे एकस्याक्षांशस्य दीर्घत्वमधिकम्, अर्थाद् देशान्तरवृत्तानि ध्रुवप्रदेशे किञ्चिन्न्यूनमात्रया वक्रत्वं लभन्ते, अर्थात्तानि किञ्चिन्मात्रदीर्घवृत्ताकाराणि । पार्श्वलिखितचित्रेण कथं देशान्तरवृत्तस्य दीर्घवृत्तत्वाद् अक्षांशदीर्घत्वेऽन्तरमापततीति प्रदर्श्यते ।

२.१२ ध्रुवनिम्नताया मानम् ,

पृथिव्या व्यासश्च

पृथिव्या गोलत्वम्—विषुवरेखायां सुमेरौ च ।

निरक्षप्रदेशे पृथिव्या व्यासस्य परिमाणं ७९२६.६८ क्रोशार्धमितम्, परन्तु ध्रुवप्रोतव्यासः (ध्रुवयोः लूनं सूत्रं वा) ७८९९.८८ क्रोशार्धमितः । विशोधनाद् द्विलब्धात् १३.३५ क्रोशार्धमिता प्रत्येकस्य ध्रुवस्य निम्नता ।

$$\begin{aligned} \text{ध्रुवनिम्नताया मानम्} &= \frac{\text{महत्तमो व्यासः—अल्पतमो व्यासः}}{\text{महत्तमो व्यासः}} \\ &= \frac{२६.७}{७९२६.६८} = \frac{१}{२९७} \end{aligned}$$

पृथिव्या ध्रुवनिम्नतामानम् इहैव अत्यल्पमेव, अर्थाद् व्यावहारिकदृष्ट्या पृथिवी गोलाकारैव । महाप्रयत्नेन रचितं सर्वथा गोलं कन्दुकमपि पृथिव्या अधिकं ध्रुवनिम्नत्वं भजते । पुनश्च यदि पृथिवी हस्तमितव्यासार्धस्य कन्दुकेन निरूप्यते तर्हि ध्रुवप्रदेशयोः इह इञ्चमितं निम्नत्वम् । उच्चतमस्य पर्वतशिखरस्याप्यस्मिन् कन्दुके $\frac{१}{१०}$ इञ्चमित उच्छ्रयो भविष्यति, अयमुच्छ्रयश्च नेत्राभ्यां न बुध्यते ।

ध्रुवनिम्नताया हेतुरक्षभ्रमणमस्ति । § तमे सुस्पष्टतया स दास्यते, द्रष्टव्यस्तत्रैव ।

२.२ पृथिव्या अक्षभ्रमणम्

सर्वे ग्रहाः (पृथिवी एको ग्रह एव) सूर्यं परितो भ्रमन्ति, भ्रमणमिदं परिक्रमणमिति

द्वितीयोऽध्यायः

१७

निगद्यते । परन्वेते ग्रहाः स्वाक्षं (याम्योद्गन्धुवप्रोतयष्टिं वा) परितोऽपि भ्रमन्ति, भ्रमणमिद-
मक्षभ्रमणं कथ्यते । अक्षोऽयं तेषां पिण्डानामन्तर्विद्यते । परिक्रमणे पिण्डो यस्मिन् कक्षावृत्ते
परिभ्रमति तस्य वास्तविकी सत्ता, परन्त्वक्षः केवलं काल्पनिकं ध्रुवयोर्लग्नं सूत्रम् ।

२.२१ अक्षभ्रमणस्य प्रमाणानि

प्राचीनकाले ग्रीसनिवासिनां मतेन पृथिवी अचलासीत् । 'कापर्निकस'-महोदयस्य पूर्व-
मिदमेव मतं सर्वैरररीकृतमासीत् । दिनरात्रिविभागस्य विद्येते द्वौ विकल्पौ—(क) पृथिवी
पश्चिमदिशः पूर्वदिशं भ्रमति, (ख) खगोल एव सूर्यः प्रतिदिनं पूर्वस्मात् पश्चिमदिशं भ्रमति ।
प्राचीनानां विचारे प्रथमो विकल्पो न सम्भवः, परन्तु 'कापर्निकस'-महोदयस्य मतेन प्रथम-
विकल्प एव सम्भवः । अधुना तु कापर्निकसमहोदयस्यैव मतं सर्वैः स्वीक्रियते । अर्थात्
पृथिव्यैव प्रतिदिनं पश्चिमदिशः पूर्वदिशं भ्रमति, अथवा अक्षभ्रमणं करोति ।

अधो दीयन्ते मुख्यानि प्रमाणानि । एषां 'कूको' महोदयस्य दोलनप्रयोग एव सर्व-
प्रथममप्रत्याख्येयभौतिकप्रमाणम् ।

(१) दिनरात्रिविभागस्य व्याख्यायामेकाकिन्याः पृथिव्याः पश्चिमदिशः पूर्वदिशि
भ्रमणं सकलखगोलस्य प्रतिदिनं पूर्वदिशः पश्चिमदिशि भ्रमणस्यापेक्षया स्वाभाविकं सरलतरञ्च ।

(२) सूर्यश्चन्द्रोऽन्ये ग्रहाश्च दूरदर्शकयन्त्रेणाक्षभ्रमणं कुर्वन्तो दरीदृश्यन्ते, अतएव
पृथिव्या अप्यक्षभ्रमणं युक्तियुक्तम् ।


(३) यदि सूर्योऽन्ये ग्रहाश्च सुदूरवर्तिनक्षत्रसमूहश्च (संक्षेपेण सम्पूर्णः खगोलः) प्रतिदिनं
पूर्वस्मात् पश्चिमदिशं भ्रमेयुः, तर्हि तेषां मध्योत्सारिणी शक्तिः खलु महती भवेत् । इदन्तु न
तथा । अत एव पृथिवी एव अक्षभ्रमणं करोति ।

(४) 'न्यूटन'-महोदयेन १६७९-तमे ख्रिस्ताब्दे एकः प्रयोगः कृतः । एकस्मादत्युच्च-
हर्म्यशिखरात् सोऽपातयदेकं लौहपिण्डम् । स लौहपिण्डो यथार्थाधोबिन्दोः किञ्चित्पूर्वमपतत् ।
किञ्चित्पूर्वपतनमिदं पृथिव्या अक्षभ्रमणादेव ।

(५) रणक्षेत्रे उत्तरदिक्स्थलक्ष्याभिमुखप्रक्षितः शरो यथार्थलक्ष्यात् किञ्चित् पूर्वेण
पतति, लक्ष्यात् किञ्चित् पश्चिमं साधितः शर एव लक्ष्ये पतति । एवमेव दक्षिणदिक्स्थलक्ष्ये
साधितः शरो यथार्थलक्ष्यस्य किञ्चित् पश्चिमेन पतति । अत एव सिद्धं यत् भूपृष्ठमनु वस्तु
पृथिव्या अक्षभ्रमणात् सव्यं व्यावर्तते । भूगोले अधीतो वातानां क्रमोऽपीदमेव समर्थयति ।

(६) १८५१-तमे ख्रिस्ताब्दे फ्रांसदेशवासी 'कूको'-महोदय एकं लोलकं ('पेण्डु-
लमा'ख्ययन्त्रम्) परिभ्रमय्य अक्षभ्रमणस्य समर्थनमकरोत् । एकस्मादत्युच्चहर्म्यशिखरस्य
पटलस्य मध्यभागाद् एकेन २०० फिटमितलौहरज्ज्वा एको बृहदयःपिण्डोऽवलम्बितः । अयःपिण्ड-
स्याधोभागे एका लौहसूचिका आसक्तासीत् । सा च वालुकापूर्णसमतलभाजनं स्पृशत्येव ।
तत्स्पर्शेन वालुकोपरि रेखा कृष्यते । तत्र सर्वाणि प्रयोगवस्तून्त्यतिश्लक्ष्णानि संघर्षविहीनानि ।
प्रयोगे दृष्टं यद् वालुकोपरि कृष्टाया रेखाया दिशा शनैः शनैर्भिन्ना भवति । प्रतिहोरं
दिग्भिन्नत्वं पञ्चदशगुणिताक्षांशज्यामितांशाः । अर्थाद् ध्रुवप्रदेशे कृते प्रयोगे दिग्भिन्नत्वं प्रतिहोरं

१५° भवेत्, निरक्षप्रदेशे च न किमपि दिग्भिन्नत्वमागच्छेत् । 'पेरिस'नगरस्य अक्षांशः ४८°५०' मितः, अक्षांशज्या '७५, अत एव प्रतिहोरं दिग्भिन्नत्वं ११½° भवेत् । प्रयोगे (कूकोकृते प्रयोगे) दिग्भिन्नत्वं ११½° एव आसीत् । यतो लोलकस्य सैव दिशा वर्तते (प्रयोगवस्तूनामतिश्लक्ष्णत्वात्), रेखाया दिग्भिन्नता वर्तते, अतः स्वामाविकोऽयं निष्कर्षो यद् बालुकापूर्णसमतलमाजनमेव परिभ्रमति, अर्थात् पृथिवी परिभ्रमति । 'कूको'लोलनप्रयोगस्य एकं कलाचित्रमधो दीयते ।



कूकोमहोदयस्य प्रयोगः

(७) पृथिव्या ध्रुवनिम्नतापि भुवोऽक्षभ्रमणं प्रमाणीकरोति । यदा कोऽपि पिण्डोऽक्षभ्रमणं करोति तदा तस्मिन् मध्योत्सर्पिणी प्रवृत्तिर्जायते । यथा यथाक्षभ्रमणं शीघ्रतरं भवति तथा तथा मध्योत्सर्पिणी शक्तिः प्रबला भवति । मध्योत्सर्पिशक्तेः पिण्डस्य सर्वेषां कणानामक्षसूत्राद् दूरगमनप्रवृत्तिर्भवति । परन्त्वयं दूरगमनप्रवृत्तिर्निरक्षप्रदेशे सर्वाधिका, ध्रुवप्रदेशे न्यूनतमा शून्यसमा, अक्षसमीपत्वात् । अत एव पिण्डस्य निरक्षप्रदेशः किञ्चिद् बहिर्लम्बी स्थूलो वा भवति । यतः पृथिव्या एतादृशी स्थितिः, अत एव पृथिवी अक्षभ्रमणं करोति । गुरोः शनेश्च अतिशीघ्रतराक्षभ्रमणत्वाद् ध्रुवनिम्नताया मानमधिकतरम् ।

२.२२ अक्षभ्रमणवेगः, अक्षभ्रमणकालश्च

पृथिवी प्रायः ६० घटिकायां निजाक्षं परित एकं भ्रमणं करोति, अर्थात् पृथिव्या अक्षभ्रमणकालः हो २३ मि ५६ से ४००९९ । यतः पृथिव्याः परिधेरसन्नमानं २५००० क्रोशार्धानि,

१. लोलकवत् 'जाइरेस्कोप'यन्त्रमपि स्वदिशां न विजहाति । अत एवानेन यन्त्रेऽपि सरलतया अक्षभ्रमणं सिद्ध्यति ।

अतस्सा प्रतिसेकिण्डं $\frac{२५०००}{२४ \times ६० \times ६०} = \frac{३}{१०} = .३$ मितं कोशार्धभागं भ्रमति, अथवा प्रतिपक्षं सप्तक्रोशार्धानि भ्रमति ।

२.२३ अक्षभ्रमणवेगे अक्षभ्रमणकाले वा परिवर्तनानि

इह जगति सर्वेषु कार्येषु कालनिश्चयस्यावश्यकता वर्तते । अधुना प्रायः सर्वेषु मध्यवित्त-पुरुषाणां गृहेषु दृश्यन्ते घटिकायन्त्राणि, परन्तु सर्वाणि घटिकायन्त्राणि सर्वदा समकाले सममेव समयं न प्रकटयन्तीति सामान्योऽनुभवः । प्रायस्तेषां भिन्नता जायते । भिन्नता चेयमादर्शघटिकाभिः 'रेडियो'कालसंकेतादिभिर्दूरीक्रियते यदा कदा जनैः । रेडियोसंकेताश्च वेधशालास्थसूक्ष्मसमय-मापकयन्त्रैः संशोधयन्ते (वेधशालास्थसूक्ष्मघटिकायन्त्राणां विवरणं § दास्यते) । तानि वेधशाला-स्थयन्त्राणि च महता प्रयत्नेन सर्वथा दोषपरिवर्जितानि निर्मितानि, तथापि सम्भवस्तेषु सूक्ष्मातिसूक्ष्मकालभेदः । इदमपि परिहर्तुं ज्योतिर्विदो नक्षत्राणां याम्योत्तरवेधैरेव प्रतिदिनं दैनन्दिनयाम्योत्तरोल्लङ्घनसमयस्य पूर्वज्ञानात् कालं संशोधयन्ति । एवं कालसंशोधने याम्यो-त्तरोल्लङ्घनवेधः परमोपयोगी ।

परन्तु याम्योत्तरोल्लङ्घनं नक्षत्राणां पृथिव्या अक्षभ्रमणादेव । यदि पृथिव्या अक्षभ्रमण-काले आगच्छेत् कश्चिद् भेदः, सर्वा कालसंशोधनव्यवस्था सदोषा भवेत्, अत एव अक्षभ्रमण-कालविकारः सर्वथा सूक्ष्मातिसूक्ष्मतया निश्चेतव्यः । विकारोऽयं निश्चीयतेऽन्यग्रहाणां वेधैः । चन्द्रकृतनक्षत्राच्छादनसमयः, गुरोरुपग्रहाणां परिक्रमणसमयः, सूर्यबिम्बे शुक्रस्योल्लङ्घनसमयः— सर्वे एते गणनया गणयन्ते पूर्वम् (एतेषां सर्वेषां पृथिव्या अक्षभ्रमणकालेन न कोऽपि सम्बन्धः, अत एव पृथिव्याः सत्यपि अक्षभ्रमणकालविकारे न दृश्यते एतेषां वेधेषु कश्चिद् भेदः), ततो वेधेन निश्चीयन्ते, ततो गणनागतसमय-वेधसमययोरन्तरं पृथिव्या अक्षभ्रमणकालविकार इति निर्धार्यते । एवमत्यल्पमितोऽपि कालभेदो निश्चीयते । अत एव ज्योतिर्विद्भिः साधितं यत् पृथिवी अचलगात्या अक्षभ्रमणं न करोति, काले काले अक्षभ्रमणकाले परिवर्तनं लक्ष्यते, परि-वर्तननियमाश्चैते—

(१) पृथिवी शनैः शनैरक्षभ्रमणगतिं मन्दीकरोति । फलस्वरूपं दिनस्य मानं हो मि से प्रतिशतकं ००.१६ सेकिण्डभागादधिकं भवति, अर्थाद् यदि अद्य दिनमानं २३ ५६ ४०.९०५-हो मि से मितं तर्हि संवत्सराणां शतकस्य अनन्तरं दिनं २३ ५६ ४०.९२१-मितं भविष्यति ।

(२) अक्षभ्रमणगतौ अनियमितानि परिवर्तनानि दृश्यन्ते । अनियमितकालभेदस्य महत्तममानं ३० सेकिण्डमितं सम्भवम् । १७८५-तमे ख्रिस्ताब्दे पृथिव्या अक्षभ्रमणगतिरकस्मात् मन्दाभवत्, १८९९-तमे ख्रिस्ताब्दे साऽकस्माद् द्रुता जाता ।


(३) वार्षिकपरिवर्तनमपि गतौ दृश्यते । वसन्ते पृथिव्या गतिर्मन्दा भवति, शरदि द्रुततां भजते । अस्मात् कारणाद् दिनमाने महत्तमकालभेदः ०००००.२५ सेकिण्डमितः ।

२.२४ परिवर्तनकारणानि

समुद्रमध्ये समुद्राधस्तले आप्लावानां सङ्घर्षणम्, नदीभिः पृथिवीपृष्ठस्य एकस्माद् भागाद् भागान्तरं जल-प्रस्तर-वणकानां वहनम्, वायोः ऋतुसम्बन्धि-प्रवाहाः, समुद्राधस्तलस्योद्गमनमधोगमनञ्च, सर्वाण्येतानि कालभेदस्य मूले वर्तन्ते ।

२.२५ पार्थिवध्रुवयोः (सुमेरुकुमेर्वोः) प्रतीयमानविचलनम्

इष्टस्थानस्य अक्षांशनिर्णयो ध्रुवप्रदेशस्य वेधेनोन्नतांशानधिगम्य भवति, अत एव ज्योतिर्विदः काले काले ध्रुवोन्नतांशानां वेधान् कुर्वन्ति । अद्भुतं दृष्टं तैर्यद् उन्नतांशानां किञ्चिदतिसूक्ष्मातिसूक्ष्मान्तरं दृश्यते काले काले । बहुकालपर्यन्तं वेधान् विधाय तैर्निश्चितं यद् ध्रुवस्य विचलनं पार्थिवध्रुव- (सुमेरुकुमेरु)-विचलनाज्जायते । पार्थिवध्रुवयोर्विचलनमिदं अतिसूक्ष्मातिसूक्ष्मम्, अर्थात् प्रत्येको ध्रुवः ४० फिटपर्यन्तमेव विचलति । सर्वाधिकं विचलनमप्येकस्या विकलाया न्यूनमेव । निम्नचित्रे विचलनं प्रदर्श्यते—



ध्रुवविचलनं सर्वप्रथमं 'आइलर'-महोदयेन गणितेनैव सूचितम्, पश्चाद् वेधेन निर्णीतम् । ध्रुवो निजमध्यमस्थानाद् द्विप्रकारकया गत्या विचलति । प्रथमगतेरान्दोलनं ०".१८, आवृत्तिकालः ४३२ दिनानि; द्वितीयगतेरान्दोलनं ०".०९, आवृत्तिकालश्च ३६५ दिनानि ।

२.३ पृथिव्याः परिक्रमणम्

प्राचीनकाले ज्योतिर्विदो भूस्थिरतावादिन आसन्, अर्थात् पृथिवी स्थिरा, सर्वे ग्रहाः सूर्यचन्द्राः पृथिवी परितो भ्रमन्ति, सूर्यश्च भगोले एकेन वर्षेण भुव एकां पूर्णां प्रदक्षिणां करोतीति तेषां कथनमासीत् । अधुना तु सर्वत्रेदं मतं निरस्तम् । हेतुप्रमाणपुरस्सरं सुनिश्चितं यत् पृथिवी एव सूर्यस्य परिक्रमां करोति, न तु सूर्यः पृथिव्याः ।

२.३१ प्रमाणानि

(१) प्रथमं तु दूरदर्शकयन्त्रैरिदं दृश्यते यत् सर्वे भौमादिग्रहाः सूर्यस्य प्रदक्षिणां कुर्वन्ति । पृथिवी अपि प्रदक्षिणां करोतीति निर्णयः "स्वाभाविकः ।

(२) अस्य गणितकं प्रमाणं केप्लर-नियमेन लभ्यते । केप्लरनियमेन (ग्रहाणां मध्यमदूरत्वम्)^३ — निष्पत्तिः सदैव स्थिरो राशिः । अत्र बुधस्य भौमस्य शुक्रस्य शनेश्च (प्रदक्षिणाकालः)^२

(मध्यमदूरत्वम्)^३ / (परिक्रमणकालः)^२ = १ समानो राशिरेव । अत आकर्षणसिद्धान्तेन अनुमानद्वयस्य सम्भावना (क) प्रथमं सर्वे ग्रहाः सूर्यं परितो भ्रमन्ति, (ख) द्वितीयं सर्वग्रहान् परितो सूर्यो भ्रमति । द्वितीयस्याशक्यत्वात् प्रथमानुमानमेव युक्तियुक्तम् । यतो भुवः (मध्यमदूरत्वम्)^३ / (परिक्रमणकालः)^२ = १ अन्यग्रहपरिक्रमणगतस्थिरो राशिः, अत एव भूरपि सूर्यं परितो भ्रमति ।

भुवमभितो भ्रमतश्चन्द्रस्य (मध्यमदूरत्वम्)^३ / (परिक्रमणकालः)^२ = अन्यग्रहाणां परिक्रमणगतस्थिरराशेर्भिन्नाः, अत एव चन्द्रभुवोराकर्षणशक्तिभिन्ना । यदि सूर्यो भूगोलपरिक्रमणशाली भवेत्, तदा तस्यापि चन्द्रतुल्यः स्थिरराशिर्भवेत् । न स तथा, अत एव सूर्यः पृथिव्याः प्रदक्षिणां न करोति । एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां गणितविधया भुवः सूर्यपरिक्रमणं सिद्धम् ।

(३) नक्षत्राणां वार्षिकं लम्बनं दृश्यते (विशेषेण द्रष्टव्यः § ११.३३) नक्षत्राणां भगोले प्रतीयमाना स्थितिः षणमासानन्तरं किञ्चिद् भिन्ना भवति, पुनः षणमासानन्तरं (अर्थात् प्रथमस्थितेर्वर्षानन्तरं) नक्षत्राणि तत्रैव दृश्यन्ते । अनेन भुवः परिक्रमणं सूच्यते ।

(४) नक्षत्राणां प्रकाशस्य किञ्चिद् मार्गच्युतिर्लभ्यते (विशेषेण द्रष्टव्यः § २.६५) । अनेन प्रकाशस्य सीमितगतिकत्वं भुवः परिक्रमणञ्च सिद्धयति ।


२.३२ परिक्रमणमार्गः (भूकक्षा)

पृथिव्याः परिक्रमणकक्षा दीर्घवृत्ताकारा । अस्य दीर्घवृत्तस्य उत्केन्द्रितात्यल्पमिता । अस्यैकस्मिन्नाभौ तिष्ठति सूर्यः, अन्यो नाभौ रिक्त एव । दीर्घवृत्तरचना एवं क्रियते—


द्वे शलाके किञ्चिदन्तरे दृढं स्थाप्येते, एकं सूत्रञ्च गृहीत्वा तस्य द्वे कोटी ग्रन्थिना प्रतिग्रह्ये, ततो यदि एकां शलाकां (अथवा लेखिनीं) गृहीत्वा, तथा वक्रीकृतं सूत्रं तद्

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

आतततया समन्ताद् भ्राय्येतदा सूत्रभ्रमणेन कल्पित आकारो दीर्घवृत्तं कथ्यते । अत्र द्वे शलाके दीर्घवृत्तस्य द्वौ नाभी, सूत्रदीर्घत्वं = बृहदक्षयासः $\times (१ + \text{उत्केन्द्रिता})$ ।



परिक्रमणकक्षाया एवं निश्चयः कृतः । सूर्यस्य प्रतीयमानविम्बव्यासः पृथिव्या दूरत्वापेक्षी, अर्थाद् यथा यथा पृथिवी सूर्याद् दूरं गच्छति तथा तथा सूर्यविम्बं लघुतरं प्रतीयते, यथा यथा च सूर्यस्य समीपं गच्छति तथा तथा सूर्यविम्बं दीर्घतरं प्रतीयते । सूर्य-



द्वितीयोऽध्यायः

२३


विम्बस्य प्रतीयमानव्यासस्य च वेधेनोपलब्धिः, दूरदर्शकेनैव सुकरा । अतः प्रतिदिनं सूर्यस्य दूरत्वमपि गणनशक्यम् । दैनिकदूरत्वानां चित्रे आलेखनेन दीर्घवृत्ताकारं क्षेत्रं लभ्यते ।

अस्य दीर्घवृत्तस्य उत्केन्द्रतात्यल्पमितैव । तस्य मानं केवलं $\frac{1}{2}$ मितम् (सूक्ष्ममानं ०.१६७४) । अनया उत्केन्द्रतया लिखितं दीर्घवृत्तं केवलं नेत्राभ्यां वृत्तमिव दृश्यते ।

दीर्घवृत्ते यो बिन्दुः सूर्यस्य समीपतमः स नीचबिन्दुः कथ्यते । दीर्घवृत्ते यो बिन्दुः सूर्यात् परमदूरत्वे स्थितः स उच्चबिन्दुः (उच्चं वा) प्रोच्यते । नीचबिन्दुः जनवरी-मासस्य प्रथमदिने, उच्चबिन्दुश्च जुलाई-मासस्य प्रथमदिने भवति । नीचस्थप्रतिग्याः सूर्याद् दूरत्वं ९,१४,००,००० क्रोशार्धमितम् । उच्चस्थप्रतिग्याः सूर्याद् दूरत्वञ्च ९,४४,००,००० क्रोशार्धमितम् । सूर्यस्य प्रतीयमानविम्बव्यासश्च क्रमशः ३२' ३६" कलादिकमितः, ३१" ३१" कलादिकमितश्च । सूर्यस्य मध्यमदूरत्वं ९,२९,००,००० क्रोशार्धानि ।

२.४ ऋतवः

वर्षे पाश्चात्यमतेन चत्वारः ऋतवः—वसन्तो ग्रीष्मः शरत् शिशिरश्च । वसन्तो वसन्त-संपातात् कर्कसंक्रान्तिपर्यन्तकालः, ग्रीष्मः कर्कसंक्रान्ति-शारद-सम्पातमध्यवर्तिकालः, एवं शरद्वतुः



शारदसंपाताद् मकरसंक्रान्तिपर्यन्तकालः, शिशिरवृत्तं मकरसंक्रान्ति-वसन्तसंपातमध्यवर्तिकालः ।

२.४१ ऋतूनां कालावधयः

यतः पृथिव्या मन्दकर्णः समकाले समक्षेत्राण्यतिक्रामति, अत एव पृथिवी सूर्यसमीपप्रदेशेषु तीव्रगत्या परिभ्रमति । दूरप्रदेशे अर्थादुच्चैः मन्दगत्या परिभ्रमति, अत एव सूर्यसमीपप्रदेशेषु ऋतवो लघुतराः, दूरप्रदेशेषु किञ्चिदीर्घतराः, शिशिरो लघुतमः, शरद् किञ्चिदीर्घा, वसन्तो दीर्घतरो ग्रीष्मश्च दीर्घतमः । सामान्यतया ऋतूनां निम्नलिखितानि मानानि—

वसन्तः	—	९२ दिनानि	२०°२	होराः
ग्रीष्मः	—	९३ दिनानि	१४°४	होराः
शरद्	—	८९ दिनानि	१८°७	होराः
शिशिरः	—	८९ दिनानि	०°५	होराः
आर्तववर्षमानम्		३६५ दिनानि	५°८	होराश्च ।

२.४२ ऋतुकारणम्

ऋतूनाम् औष्ण्यस्य शैत्यस्य च कारणं सूर्यसन्निधिर्न, यतः शिशिरर्तौ भूः सूर्यस्य समीपतमं वर्तते (भूनीचबिन्दुः जनवरीमासस्य प्रथमदिनाङ्के) । तथापि स एव कालः शैत्यातिरेकस्य । एवं ग्रीष्मर्तौ भूः सूर्यस्य दूरतमं तिष्ठति (भुव उच्चबिन्दुः जुलाईमासस्य प्रथमदिनाङ्के), तथापि न दूरत्वात् कापि न्यूनता औष्ण्यस्य ।


तर्हि किं कारणं ग्रीष्मे औष्ण्यस्य, शिशिरे च शैत्यस्य ? अत्र पृथिव्या अक्षस्य प्रवणता मुख्यो हेतुः । यदि पृथिवी स्थिरा भवेत् (अर्थात् भूपरिक्रमणं न स्यात्) तदा न स्याद् ऋतु-वैभिन्न्यम् । एकस्मिन् स्थाने सर्वदैक एव तापक्रमो भवेत् । यदि पृथिव्या अक्ष ऊर्ध्वाधरः स्यात्तर्हि कश्चित् स्थानविशेषः सर्वदा सूर्यं प्रति एकामेव प्रवणतां भजेत—निरक्षप्रदेशेषु सर्वदा-त्यौष्ण्यम्, ध्रुवप्रदेशेषु सर्वदातिशैत्यम्, अर्थात् स्थानविशेषे सर्वदैक एव तापक्रमः । परन्तु वस्तुतो नैवम् । ध्रुवयोर्लग्नं सूत्रं (अर्थात्, अक्षः) कान्तिवृत्ततलस्योर्ध्वाधरात् २३½° मितं प्रवणतां भजते । अक्षोऽयं भूकक्षायां सर्वदा समानान्तर एकबिन्दुभिमुखश्च, अर्थाद् महाकाशे अक्षस्य दिशा न परिवर्तते । अक्ष एवं स्थितोऽस्ति यद् ग्रीष्मर्तौ पृथिव्या उत्तरार्धः सूर्याभिमुखः, शिशिरर्तौ दक्षिणार्धश्च सूर्याभिमुखो भवति ।

अक्षस्य प्रवणत्वात् सूर्यस्य क्रान्त्यंशा विभिन्नाः । मकरसंक्रान्तौ सूर्यः सुदूरदक्षिणे वर्तते, तस्य क्रान्त्यंशाश्च—२३° ३०' मितः । वसन्त-संपात-शरदसंपातयोः सूर्यो नाडीवृत्ते दृश्यते । कर्कसंक्रान्तौ सूर्यः सुदूरोत्तरे, तस्य क्रान्त्यंशाश्च + २३° ३०' मितः । अत एव सूर्यस्य दृङ्मण्डल-मसमम् । २५ पृ० प्रथमचित्रे सूर्यस्य विभिन्नदृङ्मण्डलानि प्रदर्शितानि ।

यतो विविधर्तौ सूर्यस्य क्रान्त्यंशा विभिन्नाः, अर्थात् भूमण्डले सूर्यकिरणानां विविधकोणेभ्यः पातो दृश्यते, अतो विविधर्तौ सूर्यकिरणोपलब्धतापो विविधः, सूर्यकिरणोपलब्धतापस्य सूर्यकिरण-जनितकोणापेक्षितत्वात् । यदि सूर्यकिरणा ऋजवः, तर्हि सूर्यकिरणलब्धतापोऽधिकः । यदि सूर्यकिरणाः कुटिलास्तर्हि सूर्यकिरणलब्धतापो न्यूनः । इदं २५ पृ० द्वितीयचित्रात् स्पष्टं भविष्यति—


द्वितीयोऽध्यायः

२५



विभिन्नेषु ऋतुषु विभिन्नानि सूर्यदृग्मण्डलानि ।

[क—अवस्थायां किरणा ऋजवः, भुवः क—स्थाने विस्तृताः । ख—अवस्थायां किरणाः



औण्यशैत्ये किरणानामार्जवकौटिल्यापेक्षिणी

७७०६६

कुटिलाः, ख—स्थाने वितताः । ख—स्थानस्य क्षेत्रफलं क—स्थानस्य क्षेत्रफलात् महत्तरम् । यतः किरणानां तापयोगः समः, अर्थात् क—स्थाने या तापप्राप्तिः सा एव ख—स्थाने तापप्राप्तिः, अत एव क—स्थानस्य भागविशेषस्य तापप्राप्तिः ख—स्थानस्य तत्तुल्यभागविशेषस्य तापप्राप्तेरधिका । अर्थात् क—स्थाने ख—स्थानापेक्षया औष्ण्यमधिकतरम्]

ग्रीष्मे सूर्यकिरणा ऋजवः, शिशिरे च सूर्यकिरणाः कुटिला भवन्ति, अत एव ग्रीष्मे औष्ण्यं शिशिरे च शैत्यं वर्तते । इदञ्च प्रथमं कारणम् ।

पुनश्च शिशिरे सूर्यकिरणस्तिर्यक्त्वाद् वायुमण्डलस्य अधिकभागानुलङ्घयन्ति, वायुमण्डलोलङ्घने किरणानां तापो हीयते । इयं हानिरुलङ्घनदैर्घ्याधीना । उलङ्घनदैर्घ्यञ्च शिशिरे अधिकम् । अत एव वायुमण्डलप्रतिरोधविनाशात् शिशिरे सूर्यकिरणा न्यूनमात्रया तापं ददति । इदञ्च द्वितीयं कारणम् ।

अस्त्येकमन्यत् कारणम् । शिशिरे दिनमानमल्पम्, ग्रीष्मे दिनमानमधिकम् । अर्थात् क्षेत्र-विशेषः सूर्यात् शिशिरेऽल्पकालपर्यन्तं तापं लभते, ग्रीष्मर्तौ चाधिककालपर्यन्तम् । अत एव तत्र शिशिरे तापस्य न्यूनता, ग्रीष्मे च बहुलता दृश्यते ।

एवं किरणानां कुटिलापतनेभ्यः (१) अधिकक्षेत्रे तापप्रसरणम्, (२) वायुमण्डलस्य अधिकोलङ्घनम्, (३) दिनमानस्य अल्पतरत्वञ्च शिशिरे शैत्यहेतवः ।

२.४३ कथं ऋतुश्चिरायते ?

यदि सूर्यकिरणोपलब्धताप एव औष्ण्यस्य मूले वर्तते तर्हि सर्वाधिकौष्ण्ययुक्तं दिनं जून-मासस्य २२—तमदिनाङ्के भवेत्, सर्वाधिकशैत्ययुक्तं दिनञ्च दिसम्बरमासस्य २२—तमदिनाङ्के भवेत् । परन्तु नैवं दृश्यते । किमत्र कारणम् ? पृथिवीं परितो वायुमण्डलं वर्तते । वायुमण्डलमिदं तत्पृथिव्यास्तापं बहिराकाशगमनात् प्रतिरुणद्धि । नूनं २२—तमे जूनमासस्य दिनाङ्के पृथिवी सर्वाधिकं तापं गृह्णाति, परन्तु तदा तस्याः कोषे तावन्मात्रकस्तापसञ्चयो न विद्यते यावन्मात्रकः प्रायः पक्षानन्तरे । अनेनैव हेतुना महाशैत्यमनुभूयते जनवरीमासमध्ये ।

सिद्धान्तोऽयं दैनिकशैत्यौष्ण्यानां सम्बन्धेऽपि सत्यम् । सर्वाधिकोष्णकालोऽपराहो भवति न तु मध्याह्नः, एवमेव सर्वाधिकशीतलकालो रजन्याश्चतुर्थप्रहरे भवति, न तु द्वितीयप्रहरान्ते ।

२.५ वायुमण्डलम्

अदृश्यरूपेण परमलघुभारकेण वायुना सर्वे प्राणिनः प्राणवन्त इति सनातनोऽनुभवः । वायुरयं वस्तुतो वाष्पाणां मिश्रणमस्ति, पृथिवीमभितो द्विशतक्रोशार्धपर्यन्तं मण्डलाकारवायुमण्डले च लभ्यते । वायुमण्डले निम्नलिखितवाष्पाणामुपस्थितिर्दृश्यते—

नाइट्रोजनम्

७७.१६%

आक्सीजनम्

२०.६%

द्वितीयोऽध्यायः

२७

जलीयवाष्पाणि	१.४ %
आरगन-हिलियम-नियम-क्रेण्टन-जेननादयः	०.८ %
कार्बनडाइआक्साइडम्	०.०४ %
	१००.०० %

२.५१ वायुमण्डलस्य त्रयः स्तराः

वायुमण्डलं पृथिव्या उपरि ५०० क्रोशार्धपर्यन्तं विततमस्ति । अस्मिन् त्रयः स्तरा दृश्यन्ते—(१) दशक्रोशार्धपर्यन्तम् उष्णमण्डलम्, (२) दशक्रोशार्धात् पञ्चाशत्क्रोशार्धपर्यन्तं स्थिरमण्डलम्, (३) पञ्चाशत्क्रोशार्धात् पञ्चशतक्रोशार्धपर्यन्तञ्च 'आयण'मण्डलम् ।

उष्णमण्डले विभिन्नोच्छ्रयेषु विभिन्नास्तापक्रमाः । पृथिवीपृष्ठस्य समीपे उच्चतमः, सर्वाधिकोच्छ्रये निम्नतमः केवलं—५५.६ सेन्टीग्रेडमितः । अत्रैव मेघा अवलोक्यन्ते, अत्रैव च वायुप्रवाहाः स्वोर्ध्वाधोगतिभिः संक्षोभान् उत्पाद्य दूरदर्शकपतितविम्बे किञ्चिद् धूमिलत्वं जनयन्ति ।

स्थिरमण्डले मेघा न सन्ति । अत्र च जलीयवाष्पाण्यपि विरलतया विद्यन्ते । मेघहीनेऽस्मिन् स्तरे केवलमनुबन्धक्षैतिजवायुप्रवाहाः प्रवहन्ति । अत्र वाष्पाणि प्रायो मुक्तावस्थाया-मेव लभ्यन्ते ।

आयणमण्डले केवलं नाइट्रोजनम् आक्सीजनञ्च लभ्येते । अस्मात् स्थानाद् रेडियो-तरङ्गाः पृथिवीं प्रति परावर्तन्ति । आयणमण्डलस्य विवरणं § ५.३१५ तमेऽपि दास्यते ।

२.५२ प्रकाशकिरणानां वर्तनक्रिया

सर्वे खगोलीयपिण्डप्रक्षिप्तप्रकाशकिरणा वायुमण्डलं प्रविश्य पृथिवीपृष्ठस्यदूरदर्शकयन्त्रे पतन्ति । अत एव ज्योतिर्विद्भ्यो वायुमण्डलस्य प्रकाशकिरणानां विकारस्य चाध्ययनं परममहत्त्वपूर्णमस्ति ।

प्रकाशकिरणा विभिन्नघनत्ववतां वस्तूनां माध्यमेन निस्सृत्य काञ्चिद् वक्रतां भुग्नतां नर्ति वा भजन्ते । इयं वक्रता, भुग्नता, नतिर्वा किरणवक्रीभवनं किरणवर्तनं वर्तनं वा कथ्यते ।

अस्य वर्तनस्य नैकानि परिचितोदाहरणानि सन्ति ।


(१) जलपात्रे अर्धनिमग्नस्य एकस्य सरलकाष्ठदण्डस्य जलमग्नभागो जलाद् बहिर्वर्ति-भागश्च एकस्यां रेखायां न दृश्येते । जलतले दण्डः किञ्चिद् भुग्नो दृश्यते ।

(२) एकस्मिन् जलविहीनपात्रे अधस्तले एकां रूप्यकमुद्रां स्थापयेत्, पात्रस्य पार्श्वे एवं तिष्ठेद् यद् मुद्रा न दृश्यते । यदि कोऽप्यन्यो जनस्तस्मिन् पात्रे जलं पातयति, मुद्रा शनैः शनैर्दर्शनीयतां भजते (चित्रं २ द्रष्टव्यम्) ।

३८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्


अत्र उभयोरुदाहरणयोर्जलस्य वर्तनशक्तिः प्रयुक्तासीत् । जले वर्तनशक्तिर्विद्यते, तथा शक्त्या जलनिमग्नप्रकाशकिरणाः किञ्चिद् भुग्नतां भजन्ते ।



वर्तनस्य उदाहरणे

विवरणपूर्णविशेषाध्ययनाय भौतिकशास्त्रग्रन्था अवलोकनीयाः । अत्र दिग्दर्शनार्थमेव वर्तननियमाः संक्षेपेण दीयन्ते—

(१) प्रकाशकिरणा यदा जलम् अन्यपारदर्शकवस्तु वा भित्त्वा वहिर्गच्छन्ति तदा तेषां मार्गे किञ्चिद् भिन्नता आयाति, अर्थाद् आपतितकिरणानां दिशा वर्तितकिरणानां दिशया किञ्चिद् भिन्ना दृश्यते । भिन्नतेयं वस्तुतत्त्वेषु निर्भरा । निष्पत्तिः $\frac{\text{आपतितकोणज्या}}{\text{वर्तितकोणज्या}}$ वस्तुनो वर्तनाङ्कः कथ्यते । जलस्य वर्तनाङ्कः १.३३ मितोऽस्ति ।




वर्तनम्

द्वितीयोऽध्यायः

२६


(२) यदि किरणा विरलमाध्यमात् सघनमाध्यमं प्रविशन्ति, तर्हि तेऽभिलम्बानुकूल-



दिशायां भुग्नतां भजन्ते । यदि च सघनमाध्यमाद् विरलमाध्यमं प्रविशन्ति, तर्हि तेऽभिलम्ब-
प्रतिकूलदिशायां भुग्नतां भजन्ते ।

२.५३ वेधेषु वर्तनजनितसंस्काराः

उपरि वर्णितं यत् किरणा विरलमाध्यमात् सघनमाध्यमं प्रविश्य अभिलम्बानुकूलदिशायां
नर्ति प्राप्नुवन्ति । वायुमण्डले उपरिभागे विरलवायवः सन्ति, निम्नभागे च सघनवायवः सन्ति,



वेधे वर्तनजनितसंस्काराः क्रियन्ते ।

अत एव किरणा निरन्तरमभिलम्बानुकूलदिशायां नमन्ति । एवं वस्तुतः क-स्थाने स्थितं नक्षत्रं
ख-स्थाने दृश्यते, यथा जलपात्रे क-स्थितमुद्रा ख-स्थाने अदृश्यत । अत एव किरणवर्तनाद्

३०

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

इष्टनक्षत्रस्य प्रतीयमाननतांशा वास्तविकनतांशेभ्योऽल्पाः, व्यत्यासेन प्रतीयमानोन्नतांशा वास्तविकोन्नतांशेभ्योऽधिका भवन्ति । वर्तनजनितमिदमंशान्तरं विभिन्नेषु उन्नतांशेषु नतांशेषु वा विभिन्नम् । खस्वस्तिकस्थनक्षत्रे किमप्यन्तरं न जायते; क्षितिजलग्ननक्षत्रे च सर्वाधिकमन्तरं जायते । निम्नलिखितसारिण्यां विभिन्नोन्नतांशेषु वर्तनजनितमंशान्तरं दीयते । वेधोपलब्धनतांशेष्विदं संकलय्य, वेधोपलब्धोन्नतांशेभ्यश्चेदं विकलय्य यथार्थनतांशाः प्राप्यन्ते । अर्थात्

यथार्थनतांशाः = वेधोपलब्धनतांशाः + वर्तनान्तरम्

यथार्थोन्नतांशाः = वेधोपलब्धोन्नतांशाः — वर्तनान्तरम् ।

२.५३ सारिणी

प्र. उ.	वर्तना- न्तरं	प्र. उ.	वर्तना- न्तरं	प्र. उ.	वर्तना- न्तरं	प्र. उ.	वर्तना- न्तरं	प्र. उ.	वर्तना- न्तरं	प्र. उ.	वर्तना- न्तरं	प्र. उ.	वर्तना- न्तरं
०°०'	३३'०"	५०	९'५४"	१०	५'१५"	२०	२'३५"	३०	१'३८"	४०	१'०८"	५०	०'४८"
०°३०'	२८'२३"	५३	९'०८"	११	४'४७"	२१	२'२७"	३१	१'३५"	४१	१'०५"	५५	०'४०"
१°०'	२४'२९"	६०	८'२८"	१२	४'२३"	२२	२'२०"	३२	१'३१"	४२	१'०३"	६०	०'३३"
१°३०'	२१'१५"	६३	७'५१"	१३	४'०३"	२३	२'१४"	३३	१'२८"	४३	१'०१"	६५	०'२६"
२°००'	१८'३५"	७०	७'२०"	१४	३'४५"	२४	२'०८"	३४	१'२४"	४४	०'५९"	७०	०'२१"
२°३०'	१६'२४"	७३	६'५३"	१५	३'३०"	२५	२'०२"	३५	१'२१"	४५	०'५७"	७५	०'१५"
३°००'	१४'३६"	८०	६'२९"	१६	३'१७"	२६	१'५६"	३६	१'१८"	४६	०'५५"	८०	०'१०"
३°३०'	१३'०६"	८३	६'०८"	१७	३'०४"	२७	१'५१"	३७	१'१६"	४७	०'५३"	८५	०'५"
४°००'	११'५१"	९०	५'४८"	१८	२'५४"	२८	१'४७"	३८	१'१३"	४८	०'५१"	८९	०'१"
४°३०'	१०'४८"	९३	५'३१"	१९	२'४४"	२९	१'४२"	३९	१'१०"	४९	०'४९"	९०	०'०"

प्र. उ. = प्रतीयमानोन्नतांशाः

तापमानं ५०°

वायुपीडनम् २९"६

[चैम्बर्स मैथेमेटिकल टेबेल्स]

२.५४ वायुमण्डले किरणवर्तनस्य प्रभावाः

(१) आकाशो नीलवर्णो दृश्यते—वायुमण्डले असंख्यरजःकणाः सन्ति । प्रकाशकिरण-तरङ्गास्तैः समाहता विकीर्णा भवन्ति । विकरणे च ह्रस्वतरङ्गाः सरलतया, दीर्घतरङ्गाश्च कृच्छ्रेण प्रकाशकिरणेभ्यः पृथग् भवन्ति । श्यामवर्णस्य (नीलवर्णस्य) किरणतरङ्गा अतिह्रस्वाः, झटिति च विकीर्णाः सन्त आकाशं नीलवर्णेन रञ्जयन्ति ।


(२) सान्ध्यप्रकाशो रक्तवर्णो दृश्यते—सूर्यस्य क्षितिजलग्नस्य प्रकाशकिरणा वायुमण्डलस्य अधिकभागानुल्लङ्घ्यास्माकं समीपमागच्छन्ति । सुदीर्घमार्गोल्लङ्घनाद् ह्रस्वतरङ्गा नीलवर्णकिरणा विकीर्णा भूत्वा नश्यन्ति, रक्तवर्णस्य तरङ्गा अतिदीर्घादस्माकं समीपमागमने समर्था भवन्ति, अत एव सूर्यश्चन्द्रो वा रक्तवर्णको दृश्यते, सान्ध्यप्रकाशोऽपि रक्तवर्णो भवति ।

द्वितीयोऽध्यायः

३१

(३) रात्रावप्युष्णता वर्तते—दिवा दिवाकरः पृथिवीं तपति, परन्तु दिवाप्राप्ततापो रात्रावपि वर्तते । अत्र वायुमण्डलस्यैव वयं कृतज्ञा यतो वायुमण्डलं कमलमिवाचरति पृथिवी-लब्धतापनिरोधने । वायुमण्डलजः कृणास्तापस्य बहिरनन्ताकाशे विलयनं रुन्धन्ति ।


(४) सान्ध्यप्रकाशो भवति—वायुमण्डलोपस्थितेः प्रभातकाले सायंकाले वा सान्ध्य-प्रकाशो वर्तते । सूर्यो यथार्थसूर्यास्तान्तरं किमपि कालं क्षितिजलग्नो दृश्यते, (अत्रावधारणीयं जलपात्रस्थापितमुद्रादर्शनम्—§ २.५२ तमे दत्तं चित्रम्) पुनश्च सूर्ये वस्तुतोऽस्तंगतेऽपि सूर्यकिरणा वायुमण्डले पतन्ति, यतो वायुमण्डलं पृथिव्यपेक्षया उच्चवर्ति (सायङ्काले उच्चस्थाने निम्नस्थाना-पेक्षया विलम्बेन सूर्यकिरणा दृश्यन्ते)^१ । एवं दिवारात्रिसंगमकाले सान्ध्यप्रकाशो भवति ।



(५) सूर्यश्चन्द्रो वा उदया-

स्तकालयोर्दीर्घवृत्ताकारो दृश्यते—अत्रापि किरणवर्तनं हेतुः । चित्रे सूर्यबिम्बस्य निम्नतमो भागः क्षितिजलग्नः, सूर्यबिम्बस्य उच्च-तम भागस्य यथार्थोन्नतांशाः ३२-कलामिताः, सूर्यबिम्बव्यासस्य ३२ कलावत्वात् । परन्तु प्रतीय-मानोन्नतांशा यथार्थोन्नतांशेभ्यो भिन्नाः । निम्नतमभागस्य उन्न-तांशाः (यथार्थोन्नतांशाः + वर्त-

नान्तरम्) = $0^\circ + 33 = 33$ कलामिताः, उच्चतमभागस्य प्रतीयमानोन्नतांशाः (यथार्थो-



न्नतांशाः + वर्तनान्तरम्) = $32' + 28' = 60'$ कलामिताः । एवं प्रतीयमानसूर्यबिम्बस्य व्यासस्य

१. “विहाय धरणितलमुन्मुच्य कमलिनीवनानि शकुनय इव दिवसावसाने तपोवन-तहशिखरेषु पर्वताग्रेषु च रविकिरणाः स्थितिमकुर्वन्त” —कादम्बरी ।

ऊर्ध्वाधरमानं $६०' - ३३ = २७'$ परन्तु क्षैतिजमानं पूर्ववत् $३२'$ मितम् । अत एव सूर्यविम्बं दीर्घवृत्ताकारं दृश्यते, दीर्घवृत्तस्य महाक्षस्य मानं $\frac{३}{४} ३' = १६'$, अल्पाक्षस्य मानं $\frac{३}{४} ७' = १३' ५$ कलादिकम् । चन्द्रोऽप्येवमुदयास्तकालयोर्दीर्घवृत्ताकारो भवति ।

(६) दूरदर्शके नक्षत्राणां बिम्बे कम्प्रप्रभात्वं दृश्यते


वायुमण्डले वायुविक्षोभा दृश्यन्ते । वायुविक्षोभेषु विभिन्नस्तरेषु विभिन्नतापक्रमा विद्यन्ते । विभिन्नेषु तापक्रमेषु विभिन्ना वर्तनाङ्का भवन्ति । नक्षत्राणां प्रकाशकिरणा विभिन्नैर्वर्तनाङ्कैर्विचलिता भवन्ति, किरणानां प्रभा कम्पमाना दृश्यते दूरदर्शकयन्त्रे । काले काले नक्षत्राणां स्थानच्युतिः नैकवर्णकत्वञ्च लभ्येते ।

(७) ध्वनिसृष्टिर्भवति

अस्य वायुमण्डलस्योपस्थितेरेव वयं परस्परं संभाषितुं समर्थाः । (वायुमण्डलविहीनचन्द्रे सदैव पूर्णा निःशब्दता वर्तते) । वायुमुखनिःसृतशब्दतरङ्गान् अपरजनस्य कर्णौ प्रापयति । वायवभावे ध्वनिसृष्टिरसम्भवा भवेत् ।

२.६ अयनगतिः

सूर्यो यदा मेषराशेः प्रथमं बिन्दुं स्पृशति तदा वर्षारम्भो भवति । मेषराशेः प्रथमबिन्दु-
मेषसम्पातनाम्ना प्रसिद्धः, यतोऽत्र नाडीचक्रस्य क्रान्तिवृत्तस्य च संपातो विद्यते । अयं वसन्त-
सम्पातनाम्नापि प्रसिद्धः, वसन्तस्य प्रारम्भे स्थितत्वात् । अस्य मेषसम्पातस्य विचित्रा गति-
दृश्यते । यद्यस्मिन् वर्षे मेषसम्पातो मेषराशि-
स्थस्य कस्यचिन्नक्षत्रस्य समीपं दृश्यते, तर्हि आगामिवर्षारम्भे मेषसम्पातः पूर्वनक्षत्रात्
कञ्चित् पश्चिमदिशायां द्रक्ष्यते, अर्थाद् मेषसम्पातः प्रतिवर्षं किञ्चित् पश्चिमदिशां
प्रति विचलति । विचलनमिदं प्राचीनैर्ज्योतिर्विद्भिरपि विदितम् । अस्य विचलनस्य हेतुः
पृथिव्या अयनगतिरेव ।




२.६१ पृथिव्या अयनगतिः

एकस्य घूर्ण्यमानस्य भ्रमरकस्य (क्रीडनकविशेषस्य) तिष्ठो गतयो दृश्यन्ते—(१) तद् अक्षभ्रमणं करोति, (२) तस्य अक्षस्य भूस्थिता कोटिः (कीलस्य भूलङ्गो बिन्दुः) काले काले भुवि ईषद्वृत्ताकारे मार्गे भ्रमति, (३) भ्रमरकाक्षस्य भूस्थिता कोटिस्तु भुवि वर्तते एकस्मिन्नेव बिन्दौ, परन्तु अपरा ऊर्ध्वस्था कोटिरेकस्मिन् वृत्ते परिभ्रमति । पृथिव्या अपि

द्वितीयोऽध्यायः


३३

भ्रमरकस्येव तिस्रो गतयो वर्तन्ते—(१) प्रथमा गतिः पृथिव्या अक्षभ्रमणम्, (२) द्वितीया गतिर्भुवः सूर्यं परितो भ्रमणम्, (३) तृतीया च गतिरयनगतिरुच्यते । इयमेवात्र विचार्यते ।



पृथिवी भ्रमरकस्य च भ्रमति ।

अस्यां गत्यां पृथिव्या अक्षस्तु सदैव ऊर्ध्वाधररेखातः $२३\frac{1}{2}^{\circ}$ मितां प्रवणतां भजते, परन्तु ऊर्ध्वस्था पार्थिवाक्षकोटिः (सुमेरुः) वृत्ताकारे भ्रमति । तदनुसारं भूमध्य-सुमेरु-लग्नरेखा खगोलं यत्र स्पृशति स काल्पनिकविन्दुरपि परिभ्रमति । (अस्य काल्पनिकविन्दोः समीपतमं नक्षत्रं



उत्तरवृषस्थानस्य अयनवृत्ते चलनम् ।


तत्कालीनो ध्रुवः प्रोच्यते) । ध्रुवस्य परिक्रमणकालः २५,८०० वर्षमितोऽस्ति । यतो ध्रुवपरि-
भ्रमणाद् मेषसम्पातोऽपि भ्रमति, अतो मेषसंपातस्य नाडीवृत्ते पूर्णपरिक्रमणं २५,८०० वर्षे
भवति । अर्थादेकस्मिन् वर्षे $\frac{३६० \times ६० \times ६०}{२५८००} = ५०''$ २५६४ विकलामितं वक्रविचलनं
लभ्यते ।

उपर्युक्तं यद् भूमध्य-सुमेरु-लग्नरेखा खगोलं यत्र स्पृशति तस्य काल्पनिकचिन्दोः
समीपतमं नक्षत्रं तत्कालीनं ध्रुवस्थानं कथ्यते । ध्रुवस्थानं २५,८०० वर्षैरेकं परिक्रमणं
करोति । अधुना ध्रुवस्थानं α — ऋक्षक-नक्षत्रस्य (उत्तरध्रुवस्य) समीपे वर्तते, α — ऋक्षक-
नक्षत्रमस्माकं ध्रुवः कथ्यते । ईसापूर्वम् ३००० अब्दे ध्रुवः α — कालिय-नक्षत्रस्य समीप-
मासीत् । ख्रिस्ताब्दे ७,५०० तमे α वृषपर्व नक्षत्रम्, ख्रिस्ताब्दे १४,०००-तमे अभिजिद्-
(α — वीणा) नक्षत्रं ध्रुवो भविष्यति ।

२.६२ अयनगतेः कारणम्

अयनकारणव्याख्या सरलविषयो नास्ति, तथापि संक्षेपेण किञ्चिद् व्याख्यायते । भ्रमरकस्य
तृतीयाया गत्याः हेतुर्गुरुत्वाकर्षणशक्तिरेव । गुरुत्वाकर्षणशक्तिर्निरन्तरं भ्रमरकमध्यभागं पृथिवीकेन्द्रं
प्रति आकर्षति, घूर्णनञ्च भ्रमरकस्य भूमिपतनं निवारयति । परन्तु सङ्घर्षेऽस्मिन् समतुलितगतिस्तदैव
भवति यदा भ्रमरकस्य अक्ष ऊर्ध्वाधरस्थितिं विहाय काञ्चित् प्रवणतां भजते । अत एव अक्षस्य
ऊर्ध्वस्था कोटिः परिक्रमणं करोति ।

पृथिवीगतविषये गुरुत्वाकर्षणशक्तिस्तु न विद्यते । केवलं चन्द्रसूर्यग्रहाणामाकर्षणशक्तिः
प्रयुज्यते । अक्षभ्रमणात् पृथिव्या विषुवप्रदेशाः स्फीता (बहिर्लम्बिनः) भवन्ति । चित्रे शारद-
संपातकालिका पृथिवी प्रदर्श्यते । सूर्यः पृथिवीमाकर्षति, परन्तु अ १-स्थाने सूर्याकर्षणं अ २-



अयन-चलनस्य कारणं सूर्य-आकर्षणम् ।

स्यानापेक्षया अधिकम्, अत एव विषुवरेखायाः क्रान्तिवृत्ततलैकीभूतत्वे प्रवृत्तिर्दृश्यते । यदि पृथिव्या

द्वितीयोऽध्यायः

३५

अक्षभ्रमणं नाभविष्यत्, विषुवरेखा क्रान्तिवृत्तलवर्तिनी अभविष्यत् । परन्तु एवं न । अत एव भ्रमरकाक्षस्येव पृथिव्या अक्षस्य ऊर्ध्वस्था कोटिवृत्ते परिभ्रमति ।

चन्द्रोऽपि पृथिव्या विषुवरेखां निजकक्षातलं प्रति आकर्षति । सूर्यचन्द्रजनिताकर्षणं सूर्यचन्द्रविषयकायनं कथ्यते । एवमेव ग्रहविषयकायनमपि वर्तते । सर्वेषामयनानां समूहेन जनिता गतिः पृथिव्या अयनगतिः कथ्यते ।

२६३ अयनगतेः परिणामाः

मूलमेषसम्पात-प्रातिवर्षिकमेषसम्पातयोरन्तरं वर्तते । सर्वप्रथमं मेषसम्पातोऽश्विनी-नक्षत्रेऽदृश्यते, परन्तु गणनाप्रारम्भाद् द्वितीये वर्षेऽयमश्विनीनक्षत्रात् ५०''-२५६४ मितपश्चिममतिष्ठत्, तृतीयवर्षे १'४०''-५१२८ मितं पश्चिमम्; एवमधुना मेषसम्पातस्य अश्विनीनक्षत्रादन्तरं २३'६' मितमस्ति । इदमन्तरं भारतीयज्योतिषशास्त्रे 'अयनांशः' कथ्यते ।

भारतीयज्योतिर्गणिते ग्रहाणां सूर्यचन्द्रयोश्च गणना मूलमेषसम्पातात् क्रियते । अर्थादस्माकं गणनायां ग्रहाणां भोगादीनां निरयनांशा दीयन्ते । पाश्चात्यज्योतिर्गणिते तेषां गणना दृश्यमानमेषसम्पातात् क्रियते । अत एव तेषां गणनया ग्रहाणां भोगादीनां सायनांशा दीयन्ते । एवं पाश्चात्यगणनागतभोगांशादिभ्योऽयनांशान् व्यवकलय्य भारतीयगणनानुसारं भोगांशादयो लभ्यन्ते ।

अयनगतेर्निम्नलिखितपरिवर्तनानि भवन्ति—


(१) राशिनाम-नक्षत्रमण्डलान्मोर्भेदो दृश्यते । पुरा गणनारम्भे मेषराशि-मेषनक्षत्रमण्डलयोः किमप्यन्तरं नासीत्, एवमेव वृषराशि-वृषनक्षत्रमण्डलयोः, मिथुनराशि-मिथुननक्षत्रमण्डलयोः । अधुना अन्तरं वर्तते । अद्यतनीयमेषराशिर्मेपनक्षत्रपुञ्जे न वर्तते, स मीननक्षत्रमण्डलसमीपे दृश्यते ।

(२) ऋतवः शनैः शनैः परिवर्तन्ते । ऋतुविषयकवर्षस्यारम्भो दृश्यमानमेषसम्पाताद् भवति । अस्य मानञ्च नाक्षत्रवर्षकालादल्पम्, (यतो मेषसम्पातः स्वयं वक्रगत्या सूर्ये प्रति ५०''-२५६४ मितान्तरमागच्छति) । इदमन्तरं २०' २४'' मिनटादिकमितम् । ७२ वर्षेषु दिनैकमितमन्तरं भवति; ७२० वर्षेषु १० दिनानामन्तरं भवति । अनेनैव कारणेन वसन्तोत्सवादयः शीतकालेऽधुना दृश्यन्ते ।

(३) शनैः शनैर्नूतननक्षत्रमण्डलानि दृष्टिगोचरतां यान्ति । अयनगतेर्नक्षत्राणां क्रान्त्यंशा अपि परिवर्तन्ते । अत एव नूतननक्षत्रमण्डलानि दृष्टिपथमवतरन्ति । अधुना ३०-मिताक्षांशवर्तिदेशेषु ध्रुवस्योन्नतांशाः ३० मिताः सन्ति, तत्र च-६०°-मितक्रान्त्यंशवर्तिनक्षत्राणि दृश्यन्ते, परन्तु १२,००० वर्षानन्तरं यदा उत्तरध्रुवोऽभिजितः समीपे वर्तिष्यते, तस्मादेव स्थानादाधुनिकदक्षिणध्रुवोऽपि द्रक्ष्यते ।

अ॒र्वाची॑नं ज्योति॑र्वि॒ज्ञान॑म्


(४) प्रतिवर्षं मेषसम्पातः ५०".२५६४ मितं पश्चिमं गच्छति । तदनुसारं मेषसम्पात-विषुवांशेषु ४६.१० विकलामितं प्रतिवर्षमन्तरं दृश्यते, क्रान्त्यंशेषु च २०.०४ विकलामितमन्तरं



दृश्यते । यतो नक्षत्राणां मेषसम्पातमूलकनियामका दीयन्ते, अत एव नक्षत्राणां नियामकसूची विशेषकालायैव निर्मायते । कालान्तरे तेषां नियामकानां प्रातिर्यथोचितवार्षिकपरिवर्तनानि संस्कृत्य भवति ।

२.६४ अक्षचिचलनम्

पूर्वानुच्छेदेषु व्याख्यातं यद्यनगतया खगोल उत्तरध्रुवस्थानं किञ्चित्परिवर्तनं लभते । उत्तरध्रुवस्थानं कदम्बस्थानात् २३^१/_२ मितज्यया लिखते वृत्ते २५,८०० वर्षैः परिभ्रमणमेकं करोति । परन्तु 'ब्रेडले' महोदयेन दृष्टं यद् नक्षत्राणां यथार्थक्रान्त्यंशप्राप्तये केवलमयनसंस्कार-



अक्ष निचलनम्

मार्गच्युतिसंस्कार-वर्तनसंस्कारा न समर्थाः । तेन सततनिरीक्षणैर्लब्धं यद् ध्रुवस्थानमयनवृत्ते (कदम्बस्थानं केन्द्रं कृत्वा २३ $\frac{1}{2}$ ° मितज्यया लिखिते वृत्ते) तरङ्गवद् गच्छति, अर्थात् तेन

द्वितीयोऽध्यायः

३७

लिखितो मार्गो दन्तुरितवृत्तवद् दृश्यते (द्रष्टव्यं ३६ पृ०चित्रम्) । प्रत्येकस्या तरङ्गस्यावृत्तिकालो १९ वर्षमितः । उत्तरध्रुवस्थानस्य अयनवृत्ताद् विचलनमिदमक्षविचलनं कथ्यते ।

२.६५ मार्गच्युतिः (Aberration)

वर्षाकाले सामान्योऽनुभवः सर्वेषां यद् यथा यथा वृष्टौ मार्गं गच्छन् छत्री जनः स्वर्गतिं वर्धयते तथा तथा वृष्टिबिन्दव ऊर्ध्वाधरतो नागम्य किञ्चित् सम्मुखाद् आगच्छन्तो दृश्यन्ते; तथा तथा च स छत्रं तिर्यक् करोति । (द्रष्टव्यं चित्रम्) । यदि स छत्री जनोऽत्यधिकवेगेन धावति तर्हि वृष्टि-बिन्दवः प्रायेण सम्मुखात् क्षैतिजा भूत्वा आगच्छन्तः प्रतीयन्ते । ऊर्ध्वा-धरपतनशीलबिन्दूनामियं तिर्यगागम-नप्रतीतिमार्गच्युतिसिद्धान्तेन व्याख्यायते ।



वर्षाकाले धारासंपातस्य मार्गच्युतिः

पृथिव्यपि प्रतिसेकिण्डं १८ $\frac{1}{2}$ क्रोशार्धगत्या निजकक्षायां भ्रमति । अत एव नक्षत्राणां प्रकाशरश्मयो वृष्टिबिन्दुवत् तिर्यग् दूरदर्शक-यन्त्रं प्रविशन्ति । अत एव वेधोप-लब्धनक्षत्रस्थानानि यथार्थस्थानेभ्यः

किञ्चिद् भिन्नानि । मार्गच्युतिजनितमन्तरमिदं निरीक्षणेन २०.५ विकलामितं प्राप्तम् । इदं मार्गच्युतिजनितान्तरं सर्वप्रथमं १७२९-तमे ख्रिस्ताब्दे 'ब्रेडले' महोदयेन दृष्टम् ।

मार्गच्युतिजनितान्तरेण सूर्याद् दूरत्वं निश्चीयते (द्रष्टव्यम् § ५.१५) । अनेन सिद्धान्तेन भुवः परिक्रमणमपि प्रमाणोक्तिरियते । यतो विचलनमिदमपेक्षते—(१) दर्शकस्य वेगम्, (२) प्रकाशगतिवेगम्, (३) नक्षत्रस्य स्थितिञ्च । यदि पृथिवी अचलाऽभविष्यत् तर्हि प्रकाशमार्ग-च्युतिरभविष्यत् । यदि पृथिवी समगत्या परिक्रमणमकरिष्यत् तर्हि नक्षत्राणां मार्गच्युतिः सदैव समा, अत एवानिरीक्ष्याऽभविष्यत् । यदि पृथिवी असमगत्या परिक्रमणं कुर्यात् तर्हि नक्षत्र-प्रकाशस्य मार्गच्युतिर्निरीक्ष्या भवेत् । इदमेवमस्ति, अत एव पृथिवी असमगत्या सूर्यं परितो भ्रमति ।

२.७ पृथिव्या आयुः

पृथिव्या आयुषो यथार्थमाननिर्णयेऽद्यापि ज्योतिर्विदां विद्याऽसफलैव । 'हेमहोल्टज'-महोदयेन सूर्यस्य आयुः पूर्वं २,५०,००,००० वर्षेभ्यो न्यूनमिति निर्णीतम्, परं भूगर्भशास्त्रिणां

१. (वर्षाणि निश्चितम् । पृथिवी सूर्यतनयैव, अत एव तस्या आयुः २,५०,००,०००) ।

३८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

मतेन पृथिव्या आयुः २,५०,००,००० वर्षेभ्योऽप्यधिकमस्ति । भूगर्भशास्त्रिणामायुर्निर्णयाय त्रयो विधयः ।

(१) स्तरोच्छ्रयविधिः

पृथिव्यां शिलानां नानास्तराः सन्ति । भूगर्भशास्त्रिणो भूखननं विधाय स्तराणां गणनाः कृत्वा पृथिव्या आयुषो निर्णयं कुर्वन्ति । एकस्मिन् वर्षे नदीनदादय एतावन्मात्रया कल्कनिक्षेपं कुर्वन्ति, एतावन्मात्रकल्कनिक्षेपः कियत्सु वर्षेषु कृत इति त्रैराशिकेन विधिना गणना क्रियते ।

(२) समुद्रलावण्यमात्राविधिः

समुद्रेऽअधुना ३.५ प्रतिशतं लवणं वर्तते । भूगर्भशास्त्रिणः प्रतिवर्षं कियत्या मात्रया सरित्प्रवाहनिक्षिप्तलवणं समुद्रमागच्छतीति गणयित्वा त्रैराशिकेन समुद्रस्य आयुर्गणयन्ति । समुद्रः पृथिव्याः समकालीनोऽस्ति, अत एव पृथिव्या आयुरपि गणितं भवति ।

(३) रेडियो-एक्टिविटी-विधिः

स्तरोच्छ्रयविधौ लावण्यमात्राविधौ च दोष एको महान् । न वर्तते किमपि प्रमाणं यत् पुरातनकालेऽप्यनेनैवानुपातेन (अनयैव मात्रया वा) स्तरवृद्धिर्लावण्यवृद्धिर्वा आसीत् । परं विज्ञानविद्भिः ख्रिस्ताब्दे १९२७-तमे एको दोषहीनो विधिः प्राप्तः । यूरेनियमधातुः शनैः शनैः 'सीस'धातुर्भवति । इयञ्च परिणतिः स्थिरवेगेन भवति । रेडियो-एक्टिविटी-सिद्धान्तेन सर्वप्रथमं परमाणूनामस्थिरत्वं प्रतिपादितम् । परमाणवः शनैः शनैस्त्रिविधानदृश्यकिरणान् विकीर्णयन्ति । एतेऽदृश्यकिरणाः α -किरणाः, β -किरणाः, γ -किरणा इति नाम्ना प्रसिद्धाः । अनेन सिद्धान्तेन 'यूरेनियम'-धातुः (यस्य परमाणुभारः २३८), थोरियमधातुः (यस्य परमाणुभारः २३२) वा शनैः शनैर्गुणं विहाय सीसरूपं (सीसस्य परमाणुभारः २०७) धारयति । अत्र परिवर्तनवेगः प्रयोगशालायां सदैव सम एव दृश्यते । १% परिवर्तनं ७,६०,००,००० वर्षेषु भवति । भूगर्भशास्त्रिणः शिलायां वर्तमान-यूरेनियममिश्रित-सीसस्य रेडियो-एक्टिविटीविषयकविश्लेषणं विधाय शिलानामायुर्गणयन्ति । प्राचीनतमशिलाया आयुः १,८५,००,००,००० वर्षाण्यस्ति । अत एव पृथिव्या आयुः १,८५,००,००,००० वर्षेभ्योऽधिकम्, परं कदाचित् ३,००,००,००,००० वर्षेभ्यो न्यूनमस्ति ।^१

२.८ कालविभागः

संसारे सर्वकार्येषु यथार्थकालस्यापेक्षा वर्तते, विशेषतस्तु यन्त्रप्रधानाधुनिककाले । कालगणना कालनिश्चयो वा ज्योतिषशास्त्रस्य प्रथमं प्रयोजनमासीत्, अस्ति च । (द्रष्टव्यः §) । कालनिर्णये देशविस्तारस्य अपेक्षा दृश्यते । साधारणघटिकायां द्वे सूचिके


१. जेम्सजीन्स-महोदयस्य मतेन पृथिव्या आयुः २,००,००,००,००० वर्षमितमस्ति । सर्वप्रथमं प्राणिनामुत्पत्तिः ३०,००,००,००० वर्षेभ्यः पूर्वमभवत्, मानवोत्पत्तिश्च केवलं ३,००,००० वर्षेभ्यः पूर्वम् ।

द्वितीयोऽध्यायः

३६

देशविस्तारे परिभ्रमन्त्यावेव कालं सूचयतः । पुरा शङ्कुच्छाया समयं प्राकटयत्, परन्तु साऽपि देशविस्तारे पर्यभ्रमत् ।

सामान्यघटिकायन्त्रे सूचिकाद्वयं वर्तते । लघुसूचिका होरां वर्णयति, महासूचिका च होरायाः षष्ठ्यंशान् (मिनटाख्यान्) प्रदर्शयति । वैज्ञानिकदृष्ट्या महती सूचिका व्यर्था, यतो लघुसूचिका एकला एव होरां सूचयितुमलम् । महती सूचिका केवलं होरांशान् सुस्पष्टतया व्यक्तानेव करोति । अत एव समयप्रदर्शनप्रक्रिया लघुसूचिकाया एव द्रष्टव्या । लघुसूचिकायाः १२-अङ्काङ्कितस्थानप्रोताया ऊर्ध्वा-धररेखाया कोणीयमानमेव समयं प्रदर्शयति । अतो विश्लेषणेन ज्ञायते यत् समयमापने द्वयोर्वस्तुनोरपेक्षा—



घटिका

(१) एका स्थिरा रेखा वर्तते यस्याः कोणीय-दूरत्वं मीयते । रेखेयं प्रमाणरेखा कथ्यते ।

सामान्यघटिकायामियं द्वादशाङ्काङ्कितस्थान-सूचिकाकेन्द्र-प्रोतरेखा प्रमाणरेखा ।

(२) एकं गतिशीलं वस्तु वर्तते, यस्य प्रमाणरेखायाः कोणीयान्तरं मीयते । इदं कालगणकमुच्यते । घटिकायन्त्रे इदं लघ्वी सूचिका ।

खगोलस्य समयमापकत्वम्

ज्योतिर्विदां खगोल एव सर्वथा शुद्धं समयमापकयन्त्रम् । खगोलसमयमापकयन्त्रे निजा याम्योत्तररेखा प्रमाणरेखा, खगोलीयत्रिन्दुविशेषश्च समयगणकः । याम्योत्तररेखाया समय-गणकस्य कोणीयमानमेव समयः । यथा—याम्योत्तरं यदा उत्तरदिशि समयगणकमुल्लङ्घयति तदा मध्याह्नकालः, यदा दक्षिणदिशि उल्लङ्घयति तदा निशीथकालः, अहश्च आनुक्रमिकोल्लङ्घन-द्वयमध्यवर्तिकालावधि ।

साधारणतया त्रीणि समयगणकानि उपयुज्यन्ते—

समयगणकानि

कालनामानि

अहनि होराणां संख्या

हो मि से

(१) मेघसम्पातः

नाक्षत्रकालः

नाक्षत्रदिनम् = २३ ५६ ०४.०९०५४

(२) स्पष्टः सूर्यः

स्पष्टसौरकालः

प्रतिदिनं भिन्ना भिन्ना

हो मि से

(३) मध्यमः सूर्यः

मध्यमसौरकालः

दिनम् = २४-०-०

(लोकव्यवहारकालः)

२.८१ नाक्षत्रकालः

नाक्षत्रकालो मेघसम्पातस्य स्थानीयहोराकोणोऽस्ति, अर्थाद् मेघसम्पातस्य याम्योत्तर-

वृत्तलङ्घनसूत्राद् मेघसम्पातजनितो होरात्मककोणः । नाक्षत्रकालस्य प्रारम्भो मेघसम्पातस्य याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनकालाद् गण्यते ।

कालोऽयमत्यन्तमुपयोगी ज्योतिर्विद्भ्यो यतोऽयं नक्षत्रसम्बन्धी कालः । नक्षत्राणामुदय-कालो याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनकालोऽस्तकालश्च नाक्षत्रकालमानेन एकस्मिन् प्रदेशे (स्थानविशेषे) सर्वदा सर्वथा एक एव । लोकव्यवहारकाले नेयमुपयोगिता यतो यदि किञ्चिद् नक्षत्रमद्य रात्रौ हो मि से

दशहोरायामुदेति, श्वः तत् १५६४-समये उदेष्यति । एवमेव यदि किमपि नक्षत्रं जनवरी-मासस्य प्रथमदिनाङ्के ११ होरायां याम्योत्तरवृत्तमुलङ्घयति, तदेव फरवरीमासस्य प्रथमदिनाङ्के प्रायः ८ होरायां याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनं करिष्यति ।

अत एव समस्तज्यौतिषकार्येषु नाक्षत्रकालमानेन कालो निश्चीयते, वेधशालासु च नाक्षत्रकालसूचकघटिका अवश्यं दृश्यते । पाश्चात्यपञ्चाङ्गेषु च प्रतिदिनं लोकव्यावहारिक-मध्याह्नस्य नाक्षत्रकालमानेन कालो दीयते ।

२०८११ नाक्षत्रकालानयनम्

नाक्षत्रकालस्य आनयनं सदा वेधेनैव भवति । कल्पचिन्नक्षत्रस्य याम्योत्तरवृत्तोलङ्घन-कालिक-विषुवांशा एव होरात्मकमानेन तस्य नक्षत्रस्य नाक्षत्रकाल उच्यते । यदि विषुवांशाः

हो मि से

हो मि से

होरात्मकमानेन १० १० १५.२ मिताः सन्ति तर्हि नक्षत्रस्य नाक्षत्रकालः १० १० १५.२ मितोऽस्ति । याम्योत्तरवृत्तस्य इष्टनक्षत्रेण उलङ्घनकालो वेधशालासु 'याम्योत्तरयन्त्रेण', 'फोटो-ग्राफिक-जेनिथ ट्यूब'यन्त्रेण वा निश्चीयते (अनयोर्यन्त्रयोर्वर्णनं § ९३ तमे द्रष्टव्यम्) । नाक्षत्रकालघटिकापि याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनेन संशुध्यति । यथा उपर्युक्तनक्षत्रस्य याम्योत्तरोलङ्घन-हो मि से

काले यदि वेधशालास्थघटिकायन्त्रे १० १० १६.४ मितः कालो विद्यते तर्हि नाक्षत्रकालघटिका १.२ सेकिण्डमितं द्रुततरेति निश्चीयते ।

सितम्बरमासस्य २१ तमे दिनाङ्के नाक्षत्रकालेन समो लोकव्यवहारकालः । पश्चाद् लोकव्यवहारकालः प्रायः ४ सेकिण्डं प्रतिदिनमग्रे चलति । मध्याह्नस्य नाक्षत्रकालः पाश्चात्य-पञ्चाङ्गेषु लिखितो विद्यते ।

२.८१२ नाक्षत्रादिनम्


नाक्षत्रादिनस्य समयगणको मेघसंपातः, नाक्षत्रादिनञ्च मेघसम्पातानुक्रमिकोलङ्घनद्वयमध्य-वर्तिकालावधि । परन्तु इदमहो मध्यमसौराहात् किञ्चिदल्पमर्याद् यद्यद्य मेघसम्पातो याम्योत्तरवृत्तं मध्यमसौरमध्याह्ने उलङ्घयति तर्हि श्वः स याम्योत्तरवृत्तं मध्यमसौरमध्याह्नात् किञ्चित् पूर्वमुल्लङ्घयिष्यति । इदञ्च वेधेन निर्णीयते । भिन्नतेयं भुवः सूर्य परितः परिभ्रमणादेव । ४१ पृष्ठस्थे चित्रे इदं स्पष्टीकृतमस्माभिः ।

१. स्थूलगणनायै रेडियोसंकेतैरेव घटिका संशुध्यति । रेडियोसंकेता मध्याह्ने १॥ वादनवेलायां रात्रौ ६॥ होरायाञ्च दीयन्ते ।

द्वितीयोऽध्यायः

४१

चित्रे अ—स्थानाय अथ नाक्षत्रमध्याह्नः सौरमध्याह्नसमः, अर्थात् सूर्यं प्रति रेखा, मेषसम्पातं प्रति रेखा एकैव । इवो भुवः सूर्यं परितो भ्रमणशीलत्वात्, कोणीयगतेश्च प्रतिदिनमे-



कांशमितत्वाद् अंशैकमितकोणीयान्तरे भविष्यति, अर्थात् सूर्यं प्रति कर्षिता रेखा मेषसम्पात-
प्रोतरेखाया अंशैकमितकोणीयान्तरे भविष्यति (द्वे मेषसंपातप्रोतरेखे समानान्तरे एव,

मेघसम्पातविन्दोः सुदूरवर्तित्वाद्) । अत एव अ-स्थानं सौरमध्याह्नं नाक्षत्रमध्याह्नात् पश्चाद् लभ्यते । अर्थाद् नाक्षत्रमध्याह्नं सौरमध्याह्नात् पूर्वं भवति ।

यतः पृथिवी अंशैककोणं त्वाक्षभ्रमणे प्रायः $\frac{२४ \times ६०}{३६०} = ४$ मिनटकालेन गच्छति, अत

एव नाक्षत्रदिनं सौरदिनात् ४ मिनटमितमल्पम् । नाक्षत्रमध्याह्नश्च सौरमध्याह्नात् ४ मिनट-मितकालेन पूर्वं भवति ।

एवम्—

हो मि

नाक्षत्रदिनमानम् = २३ ५६ ०.४.०९०५४ मध्यमसौरमानेन ।

हो मि


मध्यमसौरदिनमानम् = २४ ३ ५६.५५५३६ नाक्षत्रमानेन ।

२.८२ स्पष्टसौरकालः

नाक्षत्रकालो वेधकार्येषु महत्त्वपूर्णः, परन्तु व्यवहारे स नोपयोगी; यतो नाक्षत्रकालः प्रत्यहं दिनमानात् प्रायः ४-सेकिण्डमितकालेन विलम्बते (२३ दिनाङ्के मार्चस्य नाक्षत्रमध्याह्नो निशीथे दृश्यते) । अत एव व्यवहारे सौरकाल एव प्रचलितः । अस्माकं सर्वाणि कर्माणि सूर्य-प्रकाशे भवन्ति, सूर्य एव सविता, अत एव सौरकालस्य प्रचलनं स्वाभाविकमेव ।

परन्तु वर्तते एका बाधा स्पष्टसौरगणनायाम् । स्पष्टसूर्यस्य गतिर्न समा । सा कदाचिद् मान्यं भजते, कदाचिच्च शैथ्यं भजते । अनेन गतिभेदेन ३० सेकिण्डमितं दिनमानेऽन्तरं लभ्यते । गतिभेदस्य कारणान्यधो दीयन्ते—

(१) 'केप्लर' महोदयस्य प्रथमसिद्धान्तेन भूकक्षा दीर्घवृत्ताकारा । द्वितीयसिद्धान्तेन भूः (भुवः कर्णः) समकाले कक्षायां समक्षेत्राण्याक्रामति । अत एव नीचसमीपवर्तिभूदृशदिनै-र्यावन्मात्रकं परिक्रमणमार्गस्य भागं गच्छति, तावन्मात्रकं परिक्रमणमार्ग-भागं तैरेव दिनैर्न गच्छति । फल-स्वरूपं भुवो गतिर्नीचैः शैथ्यं भजते, उच्चैश्च मान्यम् । पुनश्च यतः सूर्यो भूगतिहेतोरेव भ्रमणं कुर्वन् दृश्यते, अत एव सूर्यस्य गतिरसमा । अस्माद् हेतोर्जनितं दिनमानान्तरं



कक्षायां भूपरिभ्रमणम्


प्रतिवर्षं द्विवारं (३१ दिसम्बरे, १ जुलाई-मासे च) शून्यमितं भवति, मार्चमासे सितम्बरमासे चेद् सप्तमिनटमितम् ।

(२) यदि सूर्यस्य दैनिकी गतिः समापि भवेत् तदापि स्पष्टसौरदिनमानमसमं स्यात्,

द्वितीयोऽध्यायः

४३

यतः सूर्यः क्रान्तिवृत्ते भ्रमति, क्रान्तिवृत्तश्च नाडीवृत्ताद् भिन्नम्, तयोः कोणीयान्तरञ्च २३' ३०' मितम्। अत एव नाडीवृत्ते क्रान्तिवृत्तस्य समभागा-
नामपि छेदका असमा भवन्ति, अर्थात् सूर्यस्य
समगतिचलितक्रान्तिवृत्तीयसमभागा अपि नाडीवृत्ते
असमभागान् रचयिष्यन्ति। दिनमानञ्च नाडीवृत्ताद्
गण्यते, अत एव समगत्या चलन्नपि स्पष्टसूर्योऽसम-
दिनमानं कल्पयिष्यति। पार्श्वचित्रेणैवं स्पष्टी-
भविष्यति। अस्माद् हेतोर्जनितं दिनमानान्तरं चतुर्वारं
वर्षं शून्यं भवति (२२ दिनाङ्के मार्चस्य, २३ दिनाङ्के
जूनस्य, २३ दिनाङ्के सितम्बरस्य, २२ दिनाङ्के
दिसम्बरस्य)। अधिकाधिकमानञ्च दशमिनयमितम्।




प्राणकालान्तरम्

(३) उपर्युक्तयोर्हेत्वोः सम्मेलनेन कालसमी-
करणमधिगम्यते। कालसमीकरणं प्रथमान्तर-द्वितीया-
न्तर-योगेन भवति। (विशेषेण द्रष्टव्यः ११ २.८३)।

२.८३ मध्यमसौरकालः

कालोऽयं लोकव्यवहारकालः। अस्य कल्पनं स्पष्टसौरदिनमानस्य भिन्नत्वात् कृतम्। अत्र
एकः काल्पनिकः सूर्यः कल्प्यते, यो नाडीवृत्ते समगत्या भ्रमति, यस्य भ्रमणकालश्च वास्तविकसूर्यभ्रमण-
कालसमः। मध्यमसौरदिनं मध्यमसूर्यानुक्त भिकोलङ्घनद्वयमध्यवर्तिकालावधि। इदं २४-होरात्मकम्।

कालसमीकरणम्



कालसमीकरणम्

मध्यमसौरकाल-स्पष्टसौरकालयोरन्तरं कालसमीकरणं कथ्यते । कालसमीकरणम् ऋणं यदि मध्यमसौरकालः स्पष्टसौरकालादधिकः, धनं यदि मध्यमसौरकालः स्पष्टसौरकालान्यूनः । अर्थात्—

स्पष्टसौरकालः—मध्यमसौरकालः = कालसमीकरणस्य मानम् । यतो मध्यमसौरकालः सामान्यघटिकायन्त्रेण मीयते, स्पष्टसौरकालः शङ्कुना ज्ञायते । अतः—

शङ्कुदत्तकालः—सामान्यघटिकागतकालः = कालसमीकरणमानम् ।

२.८३१ पूर्वाह्नकालावधिरपराह्नकालावधिश्च

पूर्वाह्नकालावधिः (सूर्योदयाद् मध्याह्नपर्यन्तं कालः) अपराह्नकालावधिः (मध्याह्नात् सूर्यास्तपर्यन्तं कालः) सर्वथा न सममितः, अर्थाद् मध्याह्नो न सूर्योदय-सूर्यास्त-मध्यकालः । तयोर्विभिन्नता कालसमीकरणमानापेक्षिणी । अपराह्नकालात् पूर्वाह्नकालस्यान्तरं द्विगुणितकालसमीकरणमानम् । अर्थात्—

पूर्वाह्नकालः—अपराह्नकालः = २ × कालसमीकरणमानम्, अथवा पूर्वाह्नकालः = अपराह्नकालः + २ कालसमीकरणमानम् । अत एव पूर्वाह्नकालावधिस्तावद् अपराह्नकालावधेर्महान्, यावत् कालसमीकरणं धनात्मकं विद्यते ।

यदि दिनमानं विदितमस्ति तर्हि सूर्योदयः सूर्यास्तकालश्च एवं ज्ञायते—

$$\text{सूर्योदयकालः} = १२^{\text{हो}} - \frac{\text{दिनमानं} + २ \text{ कालसमीकरणमानम्}}{२}$$

$$\text{सूर्यास्तकालः} = १२^{\text{हो}} - \frac{\text{दिनमानं} - २ \text{ कालसमीकरणमानम्}}{२}$$

२.८३२ कालसमीकरणफलम्

मकरसंक्रान्तिदिवसे दिनमानं लघुतमं रात्रिमानञ्च दीर्घतमम् । तदपरेद्युर्दिनमानं पूर्व-दिवसदिनमानात् किञ्चिद् दीर्घतरम् । यदि अपरेद्युर्दिनमानं पूर्वदिवसदिनमानात् २ सेकिण्ड-मितदीर्घतरं तर्हि पूर्वाह्नकाले अपराह्नकाले उभयोरपि सेकिण्डैकमितदीर्घतरत्वं भविष्यतीति सामान्यधारणा जनानाम् । परन्तु न तत्तथा । अपराह्नकालस्तु शनैः शनैर्दीर्घतरतां भजते, पूर्वाह्नकालः पूर्वसमोऽथवा पूर्वाल्पतरः । घटनावैचित्र्यमिदं कालसमीकरणादेव । मकरसंक्रातिसमीपे सूर्यस्य गतिः कतिपयदिवसानि समैव, तस्मात् स्पष्टापराह्नकालाः सममिताः; परन्तु कालसमीकरणं शनैः शनैर्वर्धते । अत एव मध्यममध्याह्नः प्रतिदिनं स्पष्टमध्याह्नात् पूर्वं पूर्वतरं याति, अर्थात् सूर्यास्तस्य मध्यमसौरकालो वर्धते प्रत्यहम्, अर्थादपराह्नकालो दीर्घतरतां भजते ।

२.८४ स्थानीयकालः

पृथिवी स्वाक्षं परितः पश्चिमतः पूर्वदिशं भ्रमति, अत एव पूर्वदिग्वर्तिदेशेषु सूर्योदयः पूर्वं भवति सूर्यास्तः पूर्वं भवति, सूर्यस्य याम्योत्तरवृत्तोल्लङ्घनमपि पूर्वं भवति । एवं स्थानीयमध्याह्न-

द्वितीयोऽध्यायः

४५

कालस्य समये पूर्वभूतत्वात् तत्स्थानीयकालं पश्चिमदिग्वर्तिदेशीयकालापेक्षया अग्रे भवति ।^१ इदं मग्नत्वं देशान्तराधीनम् । यतः ३६०° अंशमितं भूचक्रं पृथिवी ६० घटिकासु भ्रमति, अत एव अंशैकमितदेशान्तरे सति समयान्तरं $\frac{६० \times ६०}{३६०} = १०$ पलमितं (४ मिनटमितं) दृश्यते ।

स्थानीयकालानयनपद्धतिः

देशान्तरांशयोरन्तरं दशघ्नं क्रियते । इदं फःमानेन लिख्यते । पुनः प्रथमस्थानस्य काले इदं संयोज्य (यदि द्वितीयस्थानं पूर्ववर्ति) विशोध्य (यदि द्वितीयस्थानं पश्चिमवर्ति) वा द्वितीयस्थानस्य स्थानीयकालो ज्ञायते ।

यदि प्रत्येकनगरस्य वासिनः स्वस्थानीयकालेनैव व्यवहारं प्रारभेरन् तर्हि अव्यवस्था स्यात् । अतः किञ्चित्स्थानं निश्चीयते यतो रेखांशानां प्रवृत्तिर्भवति । पाश्चात्यज्योतिषशास्त्रे 'ग्रिनिच'नाम नगरं ख्रिस्ताब्द-१८८४-पश्चात् प्रमाणनगरम् । तत एव रेखांशानां प्रवृत्तिः प्रारभ्यते । प्राचीनभारतीयसिद्धान्तग्रन्थेषु गौरवमिदमुज्जयिनी-नामकनगरस्य ।

पाश्चात्यपञ्चाङ्गेषु 'ग्रिनिच'स्थानीया ग्रहाणां भोगांशादयो दीयन्ते । ततो निजस्थानस्य ग्रहस्थानानि लभ्यन्ते । 'ग्रिनिच'कालापेक्षया स्थानीयकालो यद्यधिकस्तर्हि रेखान्तरं पूर्ववर्ति, अन्यथा पश्चवर्ति ।

२.८५ प्रामाणिककालः

पूर्वानुच्छेदे वर्णितं यद् यदि प्रत्येकनगरस्य वासिनः स्वस्थानीयकालेनैव व्यवहारं प्रारभेरन् तर्हि अव्यवस्था स्यात् । इमामव्यवस्थां परिहर्तुं प्रायेण एकस्मिन् राज्ये एक एव कालः प्रचलति, स तस्य राज्यस्य राष्ट्रस्य वा प्रामाणिकः कालः प्रोच्यते । भारतवर्षे सर्वकार्याणि भारतीयप्रामाणिककालेन कुर्वन्ति जनाः, चीनवासिनः सर्वकर्माणि चीनीयप्रामाणिककालेन विदधति, एवमेव सर्वे निजदेशस्य प्रामाणिककालेन कर्माणि कुर्वन्ति । भारतीयप्रामाणिककालो 'ग्रिनिच'कालात् ५ $\frac{१}{२}$ होरामितेन अग्रेचरः, अर्थाद् यदा ग्रिनिचनगरे रात्रेः द्विवादनवेला भवति, अत्र ७ $\frac{१}{२}$ होरा-वादनवेला भवति ।

२.८६ अन्तराष्ट्रियदिनाङ्करेखा

ग्रिनिचनगरात् १८० अंशमितदेशान्तरे अद्भुता स्थितिर्विद्यते । तस्मात् स्थानात्

१. कल्प्यते यत् सूर्योदयः ६ होरावादने भवति । एकस्मिन्नेव अक्षांशे स्तः द्वे क-ख-स्थाने । क-स्थाने वयं स्थिताः, ख-स्थानं च पूर्वदिग्वर्ति । ख-स्थाने यदा सूर्योदयो भवति तदा तस्य ख-स्य स्थानीयकालः ६-होरावादनकालः, परन्त्वस्मभ्यं सूर्योदयः पश्चाद् भविष्यति, अस्माकं ६-होरावादनकालोऽपि पश्चाद् भविष्यति । अर्थाद् यदा तत्र ख-स्थाने ६-होरावादनकालः, अत्र ६-होरावादनपूर्वकालः । अतः ख-स्थानीयकालः क-स्थानीयकालाद् अग्रेचरः ।

किञ्चित् पूर्ववर्तिस्थानस्य कालो ग्रिनिचकालात् प्रायः १२ होरामितमग्रे तिष्ठति, किञ्चित् पश्चवर्ति-
स्थानस्य कालो ग्रिनिचकालात् प्रायः १२ होरामितं पश्चात्तिष्ठति । एवं स्वल्पान्तरवर्तिस्थानयोः
कालयोः प्रायेण २४ होराणामन्तरं दृश्यते, अर्थाद् दिवसैकस्य अविच्छिन्नतात्र वर्तते । अत एव
दोषममुं परिहर्तुमत्र अन्तराष्ट्रियतिथिरेखा कल्प्यते, यत्र सर्वे नाविका दिनाङ्कपरिवर्तनं
कुर्वन्ति ।

विशेषद्रष्टव्यानि

§ २.१ पृथिव्या आकारः

पृथिवी गोलाकारेत्यतिप्राचीनं मतम् । ऋग्वेदसंहितायामिदं सप्रमाणं व्याख्या-
तम् । यथा—

चक्राणासः परीणाहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुभमाना ।

न हिन्वानासस्तितिरुस्त इन्द्रं परि स्पशो अदधात् सूर्येण ॥

(ऋ-सं० १-३३-८)

§ २.१ भागः 'आ'वत्तत्रापि सूर्योदयस्य असमकालत्वात् पृथिव्याः समतलत्वं निराकृत-
मस्ति । यथा—

आ प्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा इलोकं देवः कृणुते स्वाय धर्मणे ।

प्र बाहू अस्ताक् सविता सवीमनि निवेशयन् प्रसुवन्नक्तुभिर्जगत् ॥

(ऋ-सं० ४-५३-३)

एवमेव गोपथब्राह्मणग्रन्थेऽपि (९.१०) नैकानि वाक्यानि दृश्यन्ते ।

पश्चात् सर्वैरेव ज्योतिर्विद्भिर्गोलाकारत्वं प्रमाणपुरस्सरं निजग्रन्थेषु प्रदर्शितम् ।
'भूगोल' इति शब्द एव भुवो गोलत्वं प्रकटयति । भास्कराचार्येण भूर्वर्तुलकाकारा (वृत्तो वृत्तः)
कथिता—

भूमेः पिण्डः शशाङ्कश्चक्रविरविकुजेज्यार्किनक्षत्रकक्षा-

वृत्तैर्वृत्तो वृत्तः सन् मृदनिलसलिलव्योमतेजोमयोऽयम् ।

नान्याधारः स्वशक्त्यैव वियति नियतं तिष्ठतीहास्य पृष्ठे

निष्ठं विश्वं च शश्वत् सदनुजमनुजादित्यदैत्यं समन्तात् ॥

श्रीपतिना मतान्तराणि प्रदर्श्य भूमेः स्वरूपं कदम्बपुष्पनिचयग्रन्थिसमं कथितम्—

आदर्शोदरसन्निभा भगवती विश्वम्भरा कीर्तिता

कैश्चित् कैश्चन कूर्मपृष्ठसदृशी कैश्चित् सरोजाकृतिः ।

१. कल्प्येते द्वे क-ख-स्थाने आन्तराष्ट्रिकदिनाङ्करेखातिसमीपवर्ति क-स्थानं पूर्वदिशायाम्,
ख-स्थानं पश्चिमदिशायाम् । यदि 'ग्रिनिच'नगरे सोमवासरस्य मध्याह्नस्तदा क-स्थाने
सोमवारस्य अर्धरात्रिः, ख-स्थाने रविवारस्य अर्धरात्रिः ।

द्वितीयोऽध्यायः

४७

अस्माकं तु कदम्बपुष्पनिचयग्रन्थेः समा सम्मता
सर्वत्रासुमतां चयेन निचिता तोयस्थलस्यायिनाम् ॥

भूगोलस्य समतलतां निराकुर्वन् वर्णयति स एव—

मुकुरतलसमा चेत् सर्वतो मेदिनीयं

कनकगिरिरयं तद्दृष्टियोग्यो भवेन्नः ।

इदमपि खलु मिथ्याच्छादकास्तस्य शैलाः

सकलकुलगिरिभ्यो नूनमुच्चैः सुमेरुः ॥

किञ्च राक्षसपुरस्थितैर्नरै-

र्ह्यते नियतमुन्नतो ध्रुवः ।

येन काञ्चनगिरीन्द्रमस्तका-

देष दूरमुपरि व्यवस्थितः ॥

प्राचीनज्योतिर्विदां § २.१. (३) वर्णिततथ्यस्य ज्ञानमासीत् (द्रष्टव्या विशेषदृष्टिर्गोला
§ तमा), परन्तु तैस्तत्तथ्येन गोलाकारत्वं न प्रमाणीकृतं कदाचित्, पृथिव्या गोलाकारत्वस्य
सर्वसम्मतत्वात् ।

§ २.१२ पृथिव्या व्यासः

आधुना पृथिव्या व्यासः पृथिव्याः परिधिमानं प्रत्यक्षविधिना गणयित्वा निश्चीयते । इयमेव
पद्धतिरस्माकमाचार्यैरुररीकृतासीत् । व्यास-परिधि-सम्बन्धस्तैरतिसूक्ष्मतया विदितः । यथा निम्न-
सारिण्या स्पष्टीभविष्यति । [परिधिः = व्यास × π — अत्र 'π' स्थिराङ्कस्य मानं दीयते]

सूर्यसिद्धान्तः

ब्रह्मगुप्तः

द्वितीय आर्यभटः

✓ १०

३°१६२३

प्रथम आर्यभटः

$\frac{६२८३२}{२००००}$

३°१४१६

भास्कराचार्यः

$\frac{२२}{७}$ अथवा $\frac{३९२७}{१२५०}$

३°१४२८ स्थूलमानम्
३°१४१६ सूक्ष्ममानम्

अन्यसिद्धान्तेषु

$\frac{२१६००}{६८७६}$

३°१४१३६

आधुनिकगणितशास्त्रे

३°१४१५९२७

[अत्र भास्कराचार्यस्य सूक्ष्ममानं पूर्णतया आधुनिकगणितशास्त्रसमम्] .

भूपरिधिमानाय निम्नो विधिर्भास्कराचार्येण दत्तः—

पुरान्तरं चेदिदमुत्तरं स्यात् तदक्षविश्लेषलवैस्तदा किम् ।

चक्रांशकैरित्यनुपातयुक्त्या युक्तं निरुक्तं परिधेः प्रमाणम् ॥

निरक्षदेशः स्वदेशाद् यथा यथा दक्षिणतो भवति खखस्तिकाद्विपुवद्भुक्तं नतम् ।

तयोरन्तरेऽक्षांशाः । ते च निरक्षदेशादपसारयोजनैरनुपातेनोत्पद्यन्ते । अतः कस्मिंश्चित् पुरेऽ-

क्षांशान् ज्ञात्वा तस्मात् पुरादुत्तरतोऽन्यस्मिन् पुरे ज्ञेयाः । ततस्तेषामन्तरांशैः पुरान्तरयोजनैश्चानुपातः । यदि अन्तरांशैः पुरान्तरयोजनानि लभ्यन्ते तदा चक्रांशैः ३६० किमिति । फलं भूपरिधियोजनानि” इति [अयमेव विधिरधुनापि स्वीक्रियते, केवलं सूक्ष्मयन्त्रसाहाय्येन मानानयनेऽधिकं यथार्थत्वं लभ्यते] । अनेन विधिना लब्धं व्यासमानमधो दीयते—

पञ्चसिद्धान्तिकामतेन	१०१८ $\frac{६}{१०}$	योजनानि
आर्यभट-लल्लमतेन	१०५०	”
सूर्यसिद्धान्तमतेन	१६००	”
सिद्धान्तशिरोमणौ भास्कराचार्यमतेन	१५८१ $\frac{१}{२४}$	”
महासिद्धान्तमतेन	२१०९	”
(क्रोशार्धानि)		
पाश्चात्यार्वाचीनमतेन	७९२६-६८	विषुवद्वृत्तीयमानम्
	७८९९-८८	ध्रुवीयमानम्

योजनक्रोशार्धं (मील) सम्बन्धो निर्णीतो नास्ति, अत एव तुलना नात्र सुकरा ।

§ २.२ पृथिव्या अक्षभ्रमणम्

पृथिवी अचला^१ एवेति प्रायः प्राचीनाचार्याणां मतम् । केवलमार्यभटाचार्यो भपञ्जरं सुस्थिरं पृथिवीञ्च चलाममन्यत । यथा नौकाधिरूढो जनोऽनुलोमगमनात् स्थिरान् तटवर्तिवृक्षादीन् विपरीतदिग्गामिन इव मन्यते, तथैव पृथिव्या भ्रमणेन सुदृढं भ्रमकं लङ्कातः समानान्तरगतयोर्याम्योत्तरदिशोः समया गत्या भ्रमद् दृश्यते ।

अनुलोमगतिर्नैस्थः पश्यत्यचलं विलोमगं यद्वत् ।

अचलानि भानि तद्वत् समपश्चिमगानि लङ्कायाम् ॥ (गोलपादे)

परं हन्त ! वराहमिहिरेण तत्परवर्तिभिर्ब्रह्मगुप्तलल्लश्रीपत्यादिभिः सर्वैर्ज्योतिर्विद्भिः खण्डितम् । यथा—

भ्रमति भ्रमस्थितेव क्षितिरित्यपरे वदन्ति नोडुगणः ।

यद्येवं श्येनाद्या न खात् पुनः स्वनिलयमुपेयुः ॥

अन्यच्च भवेद् भूमेरह्वा भ्रमरंहसा ध्वजादीनाम् ।

नित्यं पश्चात् प्रेरणमथाल्पगा स्यात् कथं भ्रमति ॥

(वराहमिहिरः)

यद्येवमम्बरचरा विहगाः स्वनीडमासादयन्ति न खलु भ्रमणेन धात्र्याः ।

किञ्चाम्बुदा अपि न भूरिपयोमुचः स्युर्देशस्य पूर्वगमनेन चिराय हन्त ॥

भूगोलवेगजनितेन समीरणेन केत्वादयोऽप्यपरदिग्गतयः सदा स्युः ।

प्रासादभूधरशिरांसि च सम्पतेयुस्तस्माद् भ्रमत्युडुगणस्त्वचलाऽचलैव ॥

कदाचित्चैरनिरीक्षितमासीद् यद् वायुमण्डलमपि भुवा सह भ्रमति ।

१. “भूमिरचलाऽनन्ता” इति कोशे ।

द्वितीयोऽध्यायः

४६

§ २.३ पृथिव्याः परिक्रमणम्

पृथिवी सूर्ये परितो भ्रमतीति तथ्यस्य निरीक्षणं पुरा प्रायेणासम्भवमासीद् यत् सूर्य-परिक्रमणरतायाः पृथिव्या जनिता दृग्विषयाः पृथिवीपरिक्रमणरतसूर्याद् जनितेभ्यो दृग्विषयेभ्योऽभिन्ना एव ।

§ २.४ ऋतवः

ऋतवो भारतीयगणनायां षट् (पञ्च वा) सन्ति । 'ऋतु'शब्द ऋग्वेदे विरलमेव दृश्यते, परन्तु शरद्हेमन्तादिशब्दाः पुष्कलमात्रया तत्र प्रयुक्ताः सन्ति । तथापि यजुर्वेदादिषु ऋतुशब्दः, ऋतूनां नामानि, ऋतुसंख्याविषयकचर्चाश्च पर्याप्तमात्रया विद्यन्ते । कदाचित् षट्संख्याकऋतवोऽधिकं प्रचलिता आसन् । तैत्तिरीयब्राह्मणे (२,७,१०)—

पञ्चशारदीयेन यजेत ॥.....पञ्च वा ऋतवः संवत्सरः ॥

ऐतरेयब्राह्मणे च—

द्वादशमासाः पञ्चर्तवो हेमन्तशिशिरयोः समासेन ॥ (१.१)

एवंविधा उल्लेखाः सन्ति । संवत्सराय कल्पनया पक्षिरूपं दत्त्वा तैत्तिरीयब्राह्मणे (३.१०.४१) ऋतूनां वर्णनमसि सुन्दरमस्ति—

“तस्य ते (संवत्सरस्य) वसन्तः शिरः ॥ ग्रीष्मो दक्षिणः पक्षः ॥ वर्षाः पुच्छम् ॥

शरदुत्तरः पक्षः ॥ हेमन्तो मध्यम् ॥” इति ।

एवं वर्षारम्भो वसन्तादासीत् ।

§ २.४.२ ऋतूनां कारणम्

ऋतूनां कारणं सूर्य एवेति ऋग्वेदे नैकसूक्तेषु लभ्यते । अत्र निदर्शनरूपं निम्नं दीयते—
“पूर्वामनु प्रदिशं पार्थिवानामृतून् प्रशासद्विदधावनुष्टु ॥” (ऋ. सं. १.१५.३) ।

§ २.५ वायुमण्डलम्

अस्माकं शास्त्रेषु सप्त वायुस्कन्धा उल्लिखिताः सन्ति । ते (१) आवहः (भूवायुः), (२) प्रवहः, (३) उद्वहः, (४) संवहः, (५) सुवहः, (६) परिवहः, (७) परावहश्च । उक्तञ्चात्र श्रीपतिना—

स्यादावहः प्रवह उद्वहसंवहौ च स्वादिर्वहः परिवहश्च परावहश्च ।

स्कन्धाः क्रमेण मरुतामिति सप्तसंख्या विश्वम्भरावहनमावहमाहुरेके ॥

एषु वायुषु प्रवहो भक्त्रं भ्रामयति । आवहश्च भूवायुरस्माकमाधुनिकशब्दावल्यां वायुमण्डलम् । वायुमण्डलस्य उच्छ्रयो द्वादशयोजनानि (भास्कराचार्यस्य योजनं = ५ क्रोशार्धानि) अर्थात् ६० क्रोशार्धानि (तुलनीयमत्र आधुनिकमानम्) ।

§ २.५.४ सन्ध्यारागस्य मूले वायुमण्डलमेवेति वराहसंहितायाः श्लोकैः स्पष्टीभविष्यति—

भूम्युत्थितै रजोबूमैर्दिगन्तव्योऽग्नि संस्थितैः ।

सूर्याल्पकिरणैर्मिश्रैरारुण्यमवभासते ॥

विरलावयवं वस्तु यद् दृष्टेर्न्यवधायकम् ।

तेनाभ्रमरुणीभूतं दृश्यते शक्रचापवत् ॥

सन्ध्यारागः स विज्ञेयो दिनादौ च दिनात्यये ।

राकायां तु निशावक्त्रे तथैवेन्दुघनोद्यमे ॥

§ २.६ अयनगतिः

विषुवत्क्रान्तिवृत्तयोः सम्पातस्य चलनं वर्तत इति कदाचिद् वैदिकार्याणामप्यनुभव आसीत् । याजुषज्यौतिषग्रन्थे तत्कालीनदक्षिणायनोत्तरायणयोः स्थाने दत्ते । सर्वप्रथमं वराहमिहिरेण बृहत्-संहितायामुक्तमिदं तथ्यम्—

आश्लेषार्धादक्षिणमुत्तरमयनं खेऽर्धनिष्ठाद्यम् ।

नूनं कदाचिदासीद्येनोक्तं पूर्वशास्त्रेषु ॥

साम्प्रतमयनं सवितुः कर्कटकाद्यं मृगादितश्चान्यत् ।

उक्ताभावो विकृतिः प्रत्यक्षपरीक्षणैर्व्यक्तिः ॥

तत्परवर्तिज्योतिर्गणकैरप्यस्य सत्ता स्वीकृता ।

सूर्यसिद्धान्तानुसारमयनांशाः २७ अंशान्तरेषु भ्रमन्ति । अर्थात् प्रथममयनांशाः पश्चिमं २७ अंशपर्यन्तं गच्छन्ति, ततः पूर्वं २७ अंशपर्यन्तम् । इयं दोलकवदयनांशानां गतिरधुना ज्योतिषविज्ञानेन न स्वीक्रियते । आधुनिकानामिदं मतं यदयनचलनं चक्रवत् पूर्णचक्रांशेषु भ्रमति । मुञ्जालस्य (गोलध्याये), कदाचिद् भास्कराचार्यस्य, गणेशदैवज्ञस्याप्येवं मतमासीत् । मुञ्जालादिभिर्वार्षिकगतिः ५९,९००७ विकलामिता गणिता । मानमिदं पाश्चात्यगणितागतमानादधिकं प्रतीयते, परन्तु नैवम् । वर्षमानं पुराणानां वर्तमानवर्षमानादधिकं गणितम्, अत एव अयनस्य वार्षिकी गतिरप्यधिका भूता । गणितेन सिद्धयते यद् यदि शुद्धवर्षमानं गृहीत्वा गणना क्रियते तर्हि मुञ्जालादिभिर्गणिता वार्षिकी गतिः ५०."०४१ मिता भवति । मानमिदं केवलं १.५६८ विकलाम्यधिकम् ।

३.२.७ आयुः

भारतीयपञ्चाङ्गेषु प्रथमपष्ठे एव पृथिव्या यदायुर्दत्तं भवति तदेव आधुनिकतमपाश्चात्यसिद्धान्तैरागच्छतीत्यद्भुतो विषयः ।

३.२.८ कालविभागः

सूर्यसिद्धान्तादिग्रन्थेषु मानाध्याये कालविभागा वर्ण्यन्ते । पाश्चात्यसिद्धान्तेषु त्रयः काला एव प्रचलिताः, अस्माकं तु नव मानानि—

ब्राह्मं दिव्यं तथा पितृयं प्राजापत्यं गुरोस्तथा ।

सौरं च सावनं चान्द्रमार्श्वं मानानि वै नव ॥ (सूर्यसिद्धान्ते, १४।१)

एषां व्यवहारे चत्वारि दृश्यन्ते—

चतुर्भिर्व्यवहारोऽत्र सौरचान्द्रार्श्वसावनैः ।

बार्हस्पत्येन षष्ठ्यब्दं ज्ञेयं नान्यैस्तु नित्यशः ॥ (सूर्य० १४।२)

नक्षत्रमानमेवं वर्ण्यते—

भक्षत्रभ्रमणं नित्यं नाक्षत्रं दिनमुच्यते ।

एवमेवमन्येषां वर्णनानि कृतानि ॥

तृतीयोऽध्यायः



चन्द्रः

[स्वशीतलज्योत्स्नया आह्लादयन् सर्वलोकान् अस्मन्मातरं धरित्रीं स्वमातरमिव परि-
क्रामति चन्द्रः । अतः पृथिव्याः पश्चात्तस्य परिचयो दीयते ।]

३.१ चन्द्रस्य दूरत्वम्

३.११ दूरत्वनिर्धारणम्

ज्योतिर्विद्यायां दूरत्वनिर्धारणे सैव रीतिः प्रयुज्यते या लौकिकव्यवहारेऽगम्यवस्तूनां
दूरत्वनिर्धारणे । यदि नद्या अपरतटे एको वृक्षस्तिष्ठति,
तस्य दर्शकस्थानाद् दूरत्वमस्मिन्नेव तटे तिष्ठन्
यदि दर्शको ज्ञातुमिच्छति, तर्हि स रेखागणित-
स्याश्रयं भजते । क-स्थाने तिष्ठन् वृक्षं प्रेक्ष्यैकं
स्थूणं स्थापयति, वृक्षस्थूणरेखायां वृक्षमवलोकयन्
पश्चभागं कानिचित् पदानि गत्वा द्वितीयं च-
स्थूणं खनति । पुनः ३० हस्तमितान्तरं (अभीष्ट-
हस्तमितान्तरं वा) गत्वा ज-स्थाने तृतीयं स्थूणं
खनति । ज-स्थानाद् वृक्षं पश्यन्नेव अग्रे गत्वा
ज-स्थानवृक्षरेखायां चतुर्थं स्थूणं खनति । एवं
त्रिभुजद्वयं ($\triangle$ वृ क ख, $\triangle$ वृ च ज) प्राप्यते ।




अत्र वृ च ज-त्रिभुजेन अस्म-
त्प्रयोजनम् । वृ च ज-त्रिभुजे
वृ च ज कोणस्य वृ ज च-कोणस्य
च मानं ज्ञात्वा लिख्यते ।
पुनस्तत्रैव एकमीदृशं त्रिभुजमा-
लिख्यते, यस्य आधाररेखा ३
इंचमिता, आधारकोणौ क्रमशः
वृचज कोणमितः, वृजच-कोण-
मितश्च । एवं तथदत्रिभुजं
वृचजत्रिभुजं च परस्परं सर्वथा
समाने । अत एव त्रिभुजे
तदथे यदि तथ-रेखाया मानं
४-इञ्चानि, तर्हि चवृ-रेखायाः

(दृष्टदूरत्वस्य) मानं ४० हस्ता भविष्यति । एवं रेखागणितेन (तद्विशिष्टशास्त्रया त्रिकोण-मितिनामिकया) अगम्यवस्तुनो दूरत्वमनुमीयते । अनेनैव विधिना क्षेत्रमापका भूप्रान्तस्य मानचित्रमालिखन्ति, यतः शृङ्खलाभिर्माणं सर्वत्र न सम्भवम् ।

३.१२ चन्द्रदूरत्वनिर्धारणम्

कल्प्यते यत् पृथिव्यां स्तो द्वे वेधशाले क-स्थाने ख-स्थाने च । क-ख-स्थानयोरक्षां-शान्तरं ८४° मितम् । भूकेन्द्रात् (भू-स्थानात्) क-स्य ख-स्य भूपृष्ठस्थितत्वाद् दूरत्वं समानं ४००० क्रोशार्धमितम्, अर्थात् त्रिभुजे क भू खे, भूख-भुजा भूक-भुजा समाने, अत एव



प्रत्येकं कोणः $\angle$ भू क खः $\angle$ भू ख कः ४८° मितः, क ख-भुजा च ५३०० क्रोशार्धमिता । पुनः कस्थानीया याम्योत्तरवृत्तमुलङ्घयतश्चन्द्रस्य वेधोपलब्धनतांशाः n_1 -मिताः, ख-स्थानीयास्तस्मिन्नेव काले नतांशाः n_2 मिताः । अत एव

$$\angle \text{चं क ख} = १८०^{\circ} - n_1 - ४८^{\circ}$$

$$\angle \text{चं ख क} = १८०^{\circ} - n_2 - ४८^{\circ}$$

एवं चं क-ख त्रिभुजे एका भुजा (क ख = ५३५३ क्रोशार्धानि) विदिता, द्वौ कोणौ ($\angle$ चं क खः, $\angle$ चं ख कः) विदितौ । अत एव भुजा 'चक' (क-स्थानाच्चन्द्रस्य दूरत्वम्), च ख-भुजा (ख-स्थानाच्चन्द्रस्य दूरत्वम्) च त्रिकोणमित्या ज्ञातव्ये ।

$$१. \text{कख-भुजा} = २ \times ४००० \text{ (व्यासार्धः) } \times \text{कोज्या } ४८^{\circ}$$

$$२. \text{चं क-भुजा} = \frac{५३५३ \times \text{ज्या (चंखक)}}{\text{ज्या (कचंख)}}$$

तृतीयोऽध्यायः

५३


ततस्त्रिभुजे चंभूके, द्वे भुजे (चंक-भुजा, कभू-भुजा) विदिते, कोणः चं कू भू अपि विदितः, अत एव च भू-भुजा ज्ञातुं योग्या भवति । चभू-भुजा प्रायः २, ३८, ८५७ क्रोशार्धमिता ।

३.१३ लम्बनम्


पूर्वविधिश्चन्द्रस्य दूरत्व-निर्धारणे प्रयुज्यते, परन्तु स सुकरो न भवति ग्रहाणां दूरत्व-निर्धारणे । तेषां दूरत्वनिर्णये एकोऽन्यो विधिः प्रयुज्यते । तेन विधिना यदि चन्द्रस्य दूरत्वं मीयते तर्हि प्रथमं चंभूक-कोणो मीयते । कोणोऽयं लम्बनमुच्यते ।

एवं भूपृष्ठग्रहप्रोतरेखा-भूमध्यग्रहप्रोतरेखा-समुत्पन्नकोणः ग्रहस्य दैनिकलम्बनमुच्यते,

अर्थाद् यदि 'भू' भूमध्य-केन्द्रम्, 'पृ' भूपृष्ठस्थपुरुषः, तर्हि भू ग्र पृ-कोणस्तस्य ग्रहस्य लम्बनम् ।



भूमध्यीय लम्बनम्



क्षैतिजलम्बनम्

३.१४ लम्बनदूरत्वसम्बन्धः

उपरि चित्रे 'भू पृ ग' एकं समत्रिभुजम्, अत एव

$$\text{दूरत्वम्} = \text{भूयासार्धं} \times \text{क्षैतिजलम्बनम्}$$

१. क्षैतिजलम्बन-भूमध्यीयलम्बनसम्बन्धः । भूमध्यीयलम्बनम् = क्षैतिजलम्बनम् $\times$ नतांशज्या (दृग्ज्या), अत एव भूमध्यीयनतांशा वेधोपलब्धनतांशेभ्यो लम्बनमितकं न्यूनाः । अर्थात्

$$\text{भूमध्यीयनतांशा} = \text{भूपृष्ठीयवेधोपलब्धनतांशा} : \text{लम्बनम्} ।$$

२४

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

यदि लम्बनं सेकिण्ड- (विकला)माने गणितं तर्हि

$$\text{दूरत्वम्} = \frac{\text{भूव्यासार्धं} \times २०६२६५''}{\text{क्षैतिजलम्बने विकलानां संख्या}}$$


उदाहरणम्—चन्द्रस्य वेधेन गणनया वा क्षैतिजलम्बनं ५७'६'' चन्द्रस्य दूरत्वस्य मानं प्राप्यताम् ।

$$\text{चन्द्रदूरत्वम्} = \frac{४००० \times २०६२६५}{३४२६}$$

$$= २,४०,००० \text{ (आसन्नमानेन) क्रोशार्धानि ।}$$

३.१५ चन्द्रस्य लम्बननिर्धारणम्

यदि एकस्यामेव देशान्तररेखायां द्वे क-ख-स्थाने स्थिते, चन्द्रस्य नतांशाश्च पूर्ववत् क्रमशः n_1 -मिताः, n_2 -मिताः, भूमध्यीलम्बनं क्रमशो l_1 -मितं l_2 -मितम्, तर्हि



$$l_1 = \text{क्षैतिजलम्बनं} \times \text{ज्या} (n_1)$$

$$l_2 = \text{क्षैतिजलम्बनं} \times \text{ज्या} (n_2)$$

$$\text{अर्थात् } l_1 + l_2 = (\text{क्षैतिजलम्बनं}) \times (\text{ज्या } n_1 + \text{ज्या } n_2)$$

तृतीयोऽध्यायः

५५

अथवा

$$\text{क्षैतिजलम्बनम्} = \frac{\text{ल}_1 + \text{ल}_2}{\text{ज्या न}_1 + \text{ज्या न}_2}$$

(ल_१ + ल_२)स्य मानं सरलतया ज्ञायते, यतः ल_१ + ल_२ - न_१ + न_२ -
क-स्थानस्याक्षांशाः—ख-स्थानस्य अक्षांशाः ।

अत एव चन्द्रस्य नतांशानां ज्ञानाद् लम्बनज्ञानं सम्भवम् ।

$$\text{एवं क्षैतिजलम्बनम्} = \frac{\text{न}_1 + \text{न}_2 - \text{कस्थानस्याक्षांशाः} - \text{खस्थानस्याक्षांशाः}}{\text{ज्या (न}_1) + \text{ज्या (न}_2)}$$

३.१६ चन्द्रदूरत्वमानम्

चन्द्रो भुवोऽन्यग्रहापेक्षया समीपतरमिति पुरातनकालात् सर्वेषां मतम् । इदं स्वाभाविक-
मप्यासीत्, यतः—

- (१) चन्द्रस्य प्रदक्षिणाकालः सर्वाधिकाल्पः ।
- (२) सूर्यग्रहणावसरे चन्द्रः सूर्यभुवोर्मध्ये आपतति ।
- (३) चन्द्रबिम्बपरिमाणं बृहत्तमम् ।

परन्तु यथार्थदूरत्वनिर्धारणमतिसरलं न । पूर्वानुच्छेदेषु यो विधिर्दत्तस्तैन चन्द्रस्य
मध्यमलम्बनं ५७' २'' ७ मितम्, मध्यमदूरत्वञ्च तदनुसारेण २३८८५७ क्रोशार्धानि प्राप्यते ।

गणितागतदूरत्वस्य सत्यतास्थापनाय अचिरात्पूर्वं १९४६-तमे ख्रिस्ताब्दे एकः प्रयोगः
कृतोऽमेरिकायाम् । तत्र सेना-संकेत-विभागेन 'रडार'यन्त्रेण विद्युत्तरङ्गाश्चन्द्रं प्रति प्रक्षिप्तास्ते
२.५६ मितसेकिण्डानन्तरं चन्द्रात् परावर्त्य पुनस्तत्रागताः, अत एव चन्द्रस्तदा १.२८ मित-
सेकिण्डदूरत्वे आसीत् । अर्थात्—

$$\begin{aligned} \text{दूरत्वम्} &= १.२८ \times \text{विद्युद्वेगः} \\ &= १.२८ \times १,८६,२७० \text{ क्रोशार्धानि} \\ &= २,३८,४२५ \text{ क्रोशार्धानि} \end{aligned}$$

३.२ चन्द्रस्य व्यासादयः

३.२१ चन्द्रव्यासमानम्

चन्द्रस्य दृश्यबिम्बस्य मध्यममानं ३१' ७'' मितमस्ति । इदं वेधेन प्राप्यते । अत एव
यथार्थव्यासस्य मानं निम्नलिखितेन ५६ पृ० स्थितेन क्षेत्रेण ज्ञायते गण्यते वा ।

$$\text{अत्र } \frac{\text{चन्द्रव्यासार्धः}}{\text{भूव्यासार्धः}} = \frac{\text{विम्बव्यासार्धमानम्}}{\text{चन्द्रलम्बनम्}} \text{ अत एव चन्द्रव्यासार्धः} = \frac{१३३५ \times ३९६३.२४}{३४२२७} \\ = १०२९.९५ \text{ क्रोशार्धानि ।}$$

३.२२ चन्द्रस्य पिण्डमात्रा


गुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तेन चन्द्रस्य
पिण्डमात्रा निश्चीयते । § ३.३१ व्यक्ती-
करिष्यते यद् वस्तुतश्चन्द्रभूपिण्डयोर्गुरुत्वा-
कर्षणीयकेन्द्रमेव सूर्यं परितो भ्रमति,
भूश्च चन्द्रश्च तत्केन्द्रमभितो भ्रमतः । अनेन
भुवो मध्यकेन्द्रपरिक्रमणेन सूर्यस्य प्रतीयमान-
स्थित्यां किञ्चित् परिवर्तनं दृश्यते—चान्द्र-
मासस्य एकस्मिन् पक्षे सूर्यस्य गतिः किञ्चित्
शैथ्यं प्राप्नोति, द्वितीये च पक्षे सा
किञ्चिन्मान्द्यं लभते । परिवर्तनमिदं कदापि
द्वादशविकलभ्योऽधिकं न ।

स्थितिविज्ञानेन ज्ञायते यद् यदि
भुवः पिण्डमात्रा पिभू चन्द्रस्य पिण्डमात्रा
पि च, तर्हि गुरुत्वाकर्षणीयकेन्द्रस्य दूरत्वं

$$\begin{aligned} & \text{भूकेन्द्रात्} \frac{\text{पि च}}{\text{पि भू} + \text{पि च}} \times \text{भूचन्द्रा} \\ & \text{न्तरम्, तथा चन्द्रकेन्द्रात्} \frac{\text{पि भू}}{\text{पि भू} + \text{पि च}} \times \\ & \text{भूचन्द्रान्तरम् ।} \end{aligned}$$

उपरि भुवो मध्यकेन्द्रपरिक्रमणात्
सूर्यस्थगत्यां द्वादशविकल्पाभितान्तरमागच्छ-
तीत्युक्तम् । सूर्यस्य दूरत्वञ्च पूर्वविदितमेव
९,२९,००,००० क्रोशार्धमितम् । अत एव
एकस्मिन् 'रेडियने' ९,२९,००,०००

क्रोशार्धानि तर्हि १२ विकलासु कियन्ति ? इति त्रैराशिकेन ५७६० क्रोशार्धानि



तृतीयोऽध्यायः

५७

लभ्यन्ते । अत एव भूकेन्द्राद् मध्यकेन्द्रस्य दूरत्वं $\frac{५७६०}{२} = २८९५$ क्रोशार्धानि । इदञ्च उपरि

गणितं $\frac{\text{पि भू}}{\text{पि भू} + \text{पि च}} \times \text{भूचन्द्रान्तरम्}$ । अत एव—

$$\frac{\text{पि भू}}{\text{पि भू} + \text{पि च}} \times \text{भूचन्द्रान्तरम्} = २८९५$$

अनेन समीकरणेन $\frac{\text{पि च}}{\text{पि भू}} = \frac{१}{८१.५६}$ लभ्यते । अर्थात् चन्द्रस्य पिण्डमात्रा भुवः

पिण्डमात्राया $\frac{१}{८१.५६}$ भागमिता ।

३.२३ चन्द्रस्य घनत्वम्

चन्द्रस्य आयतनं पार्थिवायतनस्य $\frac{१}{४९}$ भागमितम्, अत एव चन्द्रस्य घनत्वं $\left(\frac{\text{पिण्डमात्रा}}{\text{आयतनम्}} \right)$

$$= \frac{४९}{८१.५} = ०.६ \text{ भागमितं पार्थिवघनत्वस्य, अर्थात् } ०.६ \times ५.५ = ३.३ \text{ गुणितं जलघनत्वस्य ।}$$

३.३ चन्द्रस्य परिक्रमणम्

पूर्वानुच्छेदे चन्द्रस्य मध्यमदूरत्वं २३८८५७ क्रोशार्धमितं गणितम्, परन्तु वास्तविकदूरत्वं सदा न समम् । यतश्चन्द्रो भुवं परितो दीर्घवृत्ताकारकक्षायां भ्रमति, यथा भूः सूर्यं परितो भ्रमति । चन्द्रकक्षाया उत्केन्द्रिता ०.५४९ ($= \frac{१}{२}$) मिता । यदा चन्द्रो दूरतमस्तदा चन्द्रोच्चं कथ्यते, समीपतमे चन्द्रनीचमुच्यते ।

३.३१ चन्द्रस्य सूर्यं परितो भ्रमणम्


चन्द्रः पृथिवीं परितो भ्रमति, पृथिवी च सूर्यस्य प्रदक्षिणां करोति, अत एव चन्द्रोऽपि सूर्यस्य प्रदक्षिणां करोति । सूर्यस्य प्रदक्षिणायां वस्तुतः एकपिण्डवद् भूचन्द्रावाचरणं कुतः,

८

या च भूकक्षा कथ्यते सा भूचन्द्रयोः केन्द्रस्य कक्षा । अस्य केन्द्रस्य भूचन्द्रश्च उभौ परिक्रमं कुरुतः, केन्द्रञ्च सूर्यं परितो भ्रमति । परन्तु केन्द्रमिदं भूपिण्ड-मध्यवर्ति,^१ अत एव भुवः केन्द्रं परितो भ्रमणं न लक्ष्यते, चन्द्रस्य केन्द्रं परितो भ्रमणं भुवं परितो भ्रमणमिव दृश्यते ।

३.३२ चन्द्रकलाः

चन्द्रो भुवमभितो भ्रमणं प्रायः $२९ \frac{1}{2}$ दिनेषु करोति, परन्तु चन्द्रः प्रकाशहीनपिण्डत्वाद् न भाति निजभास्वरत्वेन, ये च रजनीकररश्मयः कथ्यन्ते ते केवलं चन्द्रे पतित्वा ततः परावृत्ताः सूर्यरश्मय एव । अत एव भास्वरत्वविहीनत्वाच्चन्द्रस्तदैव दृश्यते यदा तस्य प्रकाशितगोलार्धः पूर्णतोऽथवांशतोऽस्माकं सकक्षमा-गच्छति । प्रकाशितगोलार्धोऽयं भुवं परितश्चन्द्रस्य भ्रमणशीलत्वाद् विभिन्नेषु इनान्तरेषु विभिन्नमात्रया अवलोक्यते— कदाचित् पूर्णतया सम्मुखे आयाति, कदाचिदर्धतया, कदाचिच्च पूर्णतया तिरोहितो भवति । एवं प्रकाशित-गोलार्धस्य विभिन्नदर्शनेभ्यश्चन्द्रस्य कलासु क्षयवृद्धी भवतः । निम्नसारिण्यां चन्द्रस्य विभिन्नकालेषु कला-दृष्टि-स्थानादयो दीयन्ते—



१. चन्द्रस्य पिण्डमात्रा भुवः पिण्डमात्रा या $\frac{1}{51.५६}$ मिता, अत एव भूचन्द्रयोः

केन्द्रं भूकेन्द्रात् $\frac{1}{८२.५६}$ मितदूरत्वे, अर्थात् (आसन्नमूल्येन) २८८०

क्रोशार्धेषु स्थितः । यतो भूव्यासार्धः ४,००० क्रोशार्धानि, केन्द्रमिदं भूपिण्डान्तर्वर्ति ।

तृतीयोऽध्यायः

५६

दृष्टिः चन्द्रस्य स्थानम् इनान्तरम् चन्द्रभागदर्शनम् कला तिथिः
 युतिः भूसूर्ययोर्मध्ये शून्यम् अप्रकाशितगोलार्धः हीना अमावस्या
 (ततश्चन्द्रः सूर्यस्य पूर्वं तिष्ठति, इनान्तरं वर्धते, प्रकाशितगोलार्धः क्रमशः सम्मुखे याति-
 कलाश्च शनैः शनैर्वर्धन्ते ।)


त्रिभान्तरम् भुवः पार्श्वे समकोणमितम् प्रकाशितगोलार्धस्य अष्टमी अष्टमी
 अर्धभागः

(तत इनान्तरं समकोणाधिकं वर्धते, प्रकाशितगोलार्धोऽधिकांशभागान् प्रकटयति ।)
 षड्भान्तरं भूः सूर्यचन्द्रयोर्मध्ये 90° मितम् प्रकाशितगोलार्धः पूर्णाः कलाः पूर्णमासी
 पूर्णतया दृश्यते

(तत इनान्तरं षड्भान्तराद् हीयते शनैः शनैः, तथैव प्रकाशितगोलार्धस्तिरोधानं भजते)
 त्रिभान्तरम् भुवः पार्श्वे समकोणमितम् प्रकाशितगोलार्धस्य अष्टमी अष्टमी
 अर्धभागो न दृश्यते

(इनान्तरं शनैः शनैस्त्रिभान्तराद् हीयते, अप्रकाशितगोलार्धस्याधिकांशभागाः सम्मुख-
 मागच्छन्ति, चन्द्रः सूर्यस्य पश्चिमे तिष्ठति ।)


युतिः भूसूर्ययोर्मध्ये शून्यम् अप्रकाशितगोलार्धः हीना अमावास्या
 चन्द्रकला, चन्द्रस्य दृष्टिः, स्थानादयश्च निम्नचित्रादपि सुस्पष्टा भविष्यन्ति—



३.३३ चन्द्रालोकः

(१) साधारणतया प्राकृतजनानां मतमिदं यत् चन्द्रस्य अष्टमीशकलस्य आलोकः
 पूर्णिमाचन्द्रस्य आलोकस्य अर्धः, कलानामर्धत्वात् ; अर्थात् पूर्णमास्यां यया मात्रया रजनीकरो

भूलोकं प्रकाशयति, अष्टम्यां तदर्धमात्रया प्रकाशयति; यतः पूर्णमास्यां पूर्णश्चन्द्रः, अष्टम्या-
मर्धश्चन्द्रः । परन्तु नैवं विद्यते । अष्टम्यां चन्द्रालोकः पूर्णिमालोकस्य नवांशः । निम्नलिखित-
रेखावर्गाङ्कितपत्रे आलोकमात्रा दीयते—



आलोकमात्रा - रेखाचित्रम्

अष्टम्यां चन्द्रालोकः पूर्णिमालोकस्य नवांशमित इति । अत्रेदं कारणम् । अष्टम्यां सूर्यकिरणा-
स्तिर्यक्तया चन्द्रपृष्ठे पतन्ति, तिर्यक्पतनाच्छाया दीर्घा भवति । पूर्णिमायां सूर्यकिरणाः सम्मुखतया
पतन्ति, छाया च हीना भवति । पुनश्च चन्द्रे पतिता छाया पृथिव्यां पतितायाश्छायाया अपेक्षया
गाढा, यतश्चन्द्रे वायुमण्डलं न वर्तते । अत एव छायाया दैर्घ्याद् गाढत्वाच्च अष्टम्यां चन्द्रालोकस्य
मात्रा अत्यल्पीयसी ।

(२) शिशिरर्तौ चन्द्रालोकोऽधिको भवति । सूर्यस्य सुदूरदक्षिणे स्थितिः शिशिरर्तौ
भवति । अत एव पूर्णचन्द्रस्य तदा सूर्यषड्भान्तरे स्थितत्वात् स्थितिः सुदूरोत्तरे भवति । चन्द्रस्य
सुदूरोत्तरस्थितत्वाद् किरणा ऋजवो भवन्ति, चन्द्रोदयाच्चन्द्रास्तकालपर्यन्तं कालावधिश्च
दीर्घः । अत एव चन्द्रकिरणानामृजुपतनाद् दीर्घकालिकचन्द्रदर्शनाच्च चन्द्रालोकः शिशिरर्तौ
अधिको भवति ।

३.३४ भुव आलोकश्चन्द्रपृष्ठे


यथा चन्द्रो भूपृष्ठात् प्रकाशवान् दृश्यते, तथैव भूश्चन्द्रपृष्ठाद् दृश्यते । परन्तु कला
व्यत्यासेन भवन्ति । यदा अस्माकं चन्द्रस्य पूर्णाः कलाः, तदा चन्द्रवासिनां भुवो हीनाः कलाः,

तृतीयोऽध्यायः

६१

यदास्माकं चन्द्रस्य हीनाः कलाः, तदा तेषां भुवः पूर्णाः कलाः । एवमेव यदा चन्द्रस्य इनान्तरम् 'अ'-मितम्, तदा भुव इनान्तरं (१८०-अ)-मितं भविष्यति ।

भुव आलोकः शुक्लपक्षस्य द्वितीयाचन्द्रे तृतीयाचन्द्रे वा सरलतया दर्शनीयतामायाति । शुक्लपक्षस्य द्वितीयायां तृतीयायां वा चन्द्रस्य न केवलं प्रकाशितशृङ्गमवलोक्यते, सूर्यकिरणैरप्रकाशितभागा अपि (द्रष्टव्यमत्र फोटो चित्रम्) अवलोक्यन्ते । ईषत्प्रकाशितभागेषु न सम्भावना सूर्यरश्मिपातस्य, सूर्यपराङ्मुखत्वात् । अतस्ते भुव आलोकेनैव आलोकिताः सन्ति ।



भुव आलोकश्चन्द्रालोकस्य षष्टिगुणितः ।
अत्र प्रकाशबाहुल्यस्य कारणद्वयम्—

(१) चन्द्रदृष्टभूमिम्बव्यासो भूदृष्टचन्द्र-
बिम्बव्यासस्य चतुर्गुणितः । यतः परावर्तिता-
लोककिरणाः क्षेत्रानुपातिनः, भूमिम्बक्षेत्रञ्च भुव आलोकः [यरकिज्ञ-वेधशाला]
चन्द्रबिम्बक्षेत्रस्य १३.४ गुणितम्, अत एव भूतलात् चन्द्रतलापेक्षया १३.४ गुणिता
आलोककिरणाः परावर्तन्ते ।

(२) किरणानां परावर्तिनी शक्तिः परिक्षेपणशक्तिरुच्यते । कल्प्यते यत् कस्मिंश्चित् पदार्थे १००-संख्याकाः सूर्यकिरणाः पतन्ति, तेषां नैकाश्च किरणा वस्तुपृष्ठे नष्टा भवन्ति, कल्प्यते यत् केवलं पञ्चदशसंख्याकाः किरणाश्च परावर्तन्ते, तदा तस्य वस्तुनः परिक्षेपणशक्तिः '१५ ($\frac{15}{100}$)' मितास्ति । निरीक्षणेन प्राप्तं यत् चन्द्रस्य परिक्षेपणशक्तिः '०७-मिता, परन्तु भुवः परिक्षेपणशक्तिः '४२ मिता; एवं चान्द्रपरिक्षेपणशक्त्यपेक्षया भुवः परिक्षेपणशक्तिरत्यधिका ।

एवं भूव्यासदैर्घ्यात् परिक्षेपणशक्तेराधिक्याच्च भुव आलोकश्चन्द्रालोकस्य षष्टिगुणितः ।

३.४ चन्द्रस्य अक्षभ्रमणम्


वयं चन्द्रस्य सदैव एकमेव रूपं पश्यामः, अत एव तस्य अक्षभ्रमणकालो भुवं परितो भ्रमणकालसमः । एकस्मात् प्रयोगात् तर्कोऽयं स्पष्टीभविष्यति ।

एकस्यां कक्षायां मध्ये एको दीपः स्थाप्यताम्, एको जनश्च एवं परिक्रमणं कुर्यात् यत्

६२

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

परिक्रमणे सदैव स दीपाभिमुखतां भजेत् । स



अक्षभ्रमणम्


झटित्यनुभवति यद् यदि स परिक्रमणजनित-
कोणमितमक्षभ्रमणं न करोति, स दीपसम्मुखतां त्यजति । अस्य गणितीयोपपत्तिरपि वर्तते । चित्रे ख-स्थानस्य कोणीयान्तरं ४ अस्ति । यदि जनः किञ्चिदप्यक्षभ्रमणं न करोति तर्हि तस्य मुखं 'थ'-प्रति भवति (खथ-रेखा कदी-रेखायाः समानान्तरा) । यदि स वस्तुतो दीपं द्रष्टुमिच्छति तर्हि स थखदी-सममवश्यमक्षभ्रमणं कुर्यात् । यतः खथ-रेखा कदी रेखा समानान्तरा, कदीख-कोणः = थखदी-कोणः = ४, अर्थात् परिक्रमणकृतकोणसमोऽक्षभ्रमणकृतकोणोऽस्ति । अत एव तस्य परिक्रमणकालसमोऽक्षभ्रमणकालः ।

३.४१ दृश्यताभेदाः

यद्यपि पूर्वमुक्तं यद् वयं सर्वदा चन्द्रस्यैकमेव रूपं पश्यामः, तथापि सूक्ष्मपरीक्षणं दर्शयति यद् यदा कदा चिन्मपर्यन्तभागेऽल्पमात्रया नूतनाः प्रदेशा दृश्यन्ते, परिचिताश्च लुप्यन्ते । नूतनप्रदेशदर्शनमिदं दृश्यताभेद उच्यते । दृश्यताभेदाश्च दोलकात्मकास्त्रिमूलकाश्चाधो दीयन्ते—

(१) अक्षांशविषयकदृश्यताभेदः

चन्द्रपरिक्रमणकक्षातलात् चान्द्रविषुवरेखायाः प्रवणता ६.५ अंशमिता, अत एव एकस्मिन् पक्षे उत्तरध्रुवात् परवर्तिनो भागा दृश्यन्ते, द्वितीयपक्षे च दक्षिणध्रुवात् परवर्तिनो



भागा दृश्यन्ते । (चित्रमुपरि दत्तं द्रष्टव्यम्) च_१-स्थित्यां चन्द्रस्य उत्तरध्रुवपरवर्तिभागाः, च_२-स्थित्यां दक्षिणध्रुवपरवर्तिभागाश्च दृश्यन्ते ।


(२) रेखांशविषयकदृश्यताभेदः

चन्द्रस्य परिक्रमणमार्गो दीर्घवृत्ताकरः, अत एव चन्द्रस्य परिक्रमणवेगो नीचैः शैथन्यम्, उच्चैश्च मान्द्यं भजते, परन्त्वक्षभ्रमणवेगः सदैव समो विद्यते । एवं काले कालेऽक्षभ्रमणवेग-

तृतीयोऽध्यायः

६३

परिक्रमणयोरन्तरं दृश्यते । अनेनान्तरेण काले काले चन्द्रस्य पूर्वतमबिम्बकोटेः परवर्तिनः $७\frac{2}{3}$




रेखांश विषयक दृश्यताभेदः

अंशव्यापिभागाः, काले काले पश्चतमबिम्बकोटेः परवर्तिनः $७\frac{2}{3}$ अंशव्यापिभागा दृश्यन्ते ।

(३) दैनिकदृश्यताभेदः

भूपृष्ठस्था वयं दिवसस्य रात्रेर्वा विभिन्नकाले विभिन्नदिशया चन्द्रं पश्यामः । चन्द्रोदये किञ्चित्पश्चिमकोटेः कलैकमितव्यापिपरवर्तिभागाः, चन्द्रास्ते पूर्वकोटेः कलैकमितव्यापिपरवर्तिभागाश्च दृश्यन्ते । एवं वयं चन्द्रबिम्बस्य ५९% भागान् पश्यामः ।



दैनिकदृश्यताभेदः

३.५ चन्द्रतले भौतिकस्थितयः

३.५१ वायुमण्डलम्

चन्द्रतले वायुमण्डलं न विद्यत इति निश्चितमेव, तथाप्यत्र कतिपयानि प्रमाणानि दीयन्ते—
(१) चन्द्रे सान्ध्यप्रकाशो न दृश्यते। दिवसावसानेऽकस्मादेव रात्रिरागच्छति। सान्ध्यप्रकाशो वायुमण्डलभावादेव भवतीति § १.५४ तमे व्याख्यातम्, अत एव सान्ध्यप्रकाशाभावो वायुमण्डलभावं सूचयति।

(२) यदा चन्द्रो नक्षत्राण्याच्छादयति तदा नक्षत्राणि झटिति लुप्तानि भवन्ति (द्रष्टव्यं फोटोचित्रं § ४.५२-तमे दत्तम्)। वायुमण्डलभावे तेषां प्रथमं धूमिलत्वम्, ततो रक्तवर्णत्वम्, ततश्शनैः शनैर्लोपो भवेत्।

(३) दूरदर्शकेन चन्द्रपृष्ठचिह्नानि स्पष्टतया दृश्यन्ते। यदि चान्द्रवायुमण्डलस्य घनत्वं पार्थिववायुमण्डलघनत्वस्य $\frac{1}{100000}$ तममपि भवेत्, चन्द्रपृष्ठदर्शने काचिदस्पष्टतावश्यमागच्छेदिति भौतिकशास्त्रिणां मतम्।

(४) चन्द्रस्य परिक्षेपणशक्तिरत्यल्पा, केवलं ०.७-मिता। वायुमण्डलयुक्तग्रहाणां परिक्षेपणशक्तिरधिका भवति। शुक्रस्य तु परिक्षेपणशक्तिः ०.७-मिता लभ्यते।

(५) चन्द्रपृष्ठे गुरुत्वाकर्षणशक्तिर्भुवि गुरुत्वाकर्षणशक्तेः ०.१६५ भागमिता। गुरुत्वाकर्षणशक्तिरियमतिदुर्बला, अत एव वायुमण्डलोपस्थितिश्चन्द्रेऽसम्भवा।

‘विमोचनवेगः’—वायुमण्डलरक्षणम्

चन्द्रे प्रारम्भे नूतं वायुमण्डलमासीत्, परन्तु चन्द्रवायवः शनैः शनैर्महाकाशे विलीना अभवन्। वाष्पेषु बहुसंख्याका व्यूहाणवः सन्ति, ते इतस्ततो भ्रमन्ति। ते भ्रमन्तो महाकाशं गच्छन्ति यदि ग्रहस्तेषां व्यूहाणूनां गुरुत्वाकर्षणरज्जुभिर्वन्धनेऽसमर्थः। पृथिव्या गुरुत्वाकर्षणशक्तिः पर्याप्ता, परन्तु केचिद् वाष्पव्यूहाणवो बहिर्गन्तुं समर्था भवन्ति। चन्द्रस्य गुरुत्वाकर्षणं पार्थिवगुरुत्वाकर्षणस्य $\frac{1}{100000}$ मितम्, अत एव तत्र वायूनां व्यूहाणवः सरलतया महाकाशे विलीयन्ते।

वायुमण्डलरक्षणे ग्रहस्य उपग्रहस्य वा सामर्थ्यं तत्पृष्ठस्थविमोचनवेगापेक्षि। भुवि विमोचनवेगः सप्तक्रोशार्धानि प्रतिसेकिण्डमस्ति, अर्थाद् यदि किमपि वस्तुस्माद् विमोचनवेगात् प्रक्षिप्यते तर्हि गुरुत्वाकर्षणरज्जुं भित्त्वा तद् महाकाशं गच्छति^१। चन्द्रपृष्ठे विमोचनवेगः $1\frac{1}{2}$ क्रोशार्धानि प्रतिसेकिण्डमस्ति, अत एव तत्र वायूनां व्यूहाणवो झटिति महाकाशे व्यलीयन्त।

१. यदि प्रक्षेपवेगः प्रतिसेकिण्डं पञ्चक्रोशार्धाल्पस्तर्हि वस्तु पृथिव्यां पुनर् आगच्छति, यदि प्रक्षेपवेगः प्रतिसेकिण्डं पञ्चक्रोशार्धाधिकः परन्तु प्रतिसेकिण्डं सप्तक्रोशार्धन्यूनस्तर्हि वस्तु चन्द्रवद् वृत्ते दीर्घवृत्ते वा भुवं परितो भ्रमणं करिष्यति (अनेनैव सिद्धान्तेन कृत्रिमचन्द्रा आगामिष्वे मोचयन्ते)। यदि प्रक्षेपवेगः सप्तक्रोशार्धमितस्तर्हि वस्तु परवलये, यदि सप्तक्रोशार्धाधिकस्तर्ह्यपरवलये महाकाशे उत्पतति। सौरमण्डलाद् बहिर्गमनाय प्रक्षेपवेगोऽवश्यं ३० क्रोशार्धाधिको भवेत्।

तृतीयोऽध्यायः

६५

वायुमण्डलस्य वायुव्यूहाणूनां महाकाशे विलीनत्वं व्यूहाणूनां वेग-
विमोचनवेग-निष्पत्तिमपे-
क्षते । [प्रतिसेकिण्डं हाईड्रोजनस्य वेगः १०१४ क्रोशार्धानि, नाईट्रोजनस्य ००३० क्रोशार्धानि,
आक्सीजनस्य ००२८ क्रोशार्धभागः, कार्बनडाई-आक्साइडस्य च ०.२४ क्रोशार्धभागोऽस्ति] ।
विज्ञानविदां मतमिदं यद् यदि विमोचनवेगस्त्रिगुणितस्तर्हि कतिपयैः सप्ताहैः, यदि विमोचनवेग-
श्चतुर्गुणितस्तर्हि कतिपयवर्षसहस्रैः, यदि विमोचनवेगः पञ्चगुणितस्तर्हि कतिपयवर्षकोटिभिर्वायु-
मण्डलस्य वायवो महाकाशे विलीना भविष्यन्ति ।

३.५२ जलाभावः


आश्चर्यं खलु महद् यद् जलधिजश्चन्द्रो जलविहीनोऽस्ति । चन्द्रपृष्ठे न कदापि
मेघा दृष्टाः, न च जलधाराजनितविलयनं शिलानाम् । यदि कदाचिद् जलं प्रारम्भे स्यात्,
तदवश्यमेव वायुमण्डलाभावे ब्राष्परूपेण निर्गतं स्यात् ।

३.५३ तापक्रमः

चन्द्रपृष्ठे मध्याह्ने १००° सेन्टीग्रेडमितः, सूर्यास्ते ५०° सेन्टीग्रेडमितः, निशीथे च-१५०°
सेन्टीग्रेडमितस्तापक्रमो विद्यते । चन्द्रग्रहणावसरे होरैककाले १५०-अंशानामन्तरं दृश्यते तापक्रमे ।


३.६ चन्द्रपृष्ठचिह्नानि

चन्द्रपृष्ठवर्तिनतोन्नतस्थलानि साधारणदूरदर्शकयन्त्रेणापि प्रेक्षणीयतां भजन्ते । सर्वा-



चन्द्रस्य छायाचित्रम्

नुकूलप्रेक्षणीयता कृष्णपक्षस्य तृतीयायां शुक्लपक्षस्य द्वादश्याञ्च भवति । चन्द्रस्य अर्धभाग एव दृश्यत इति अनुच्छेदे ३.३२ तमे स्पष्टीकृतम् । अस्मिन् चन्द्रार्धे दश पर्वतश्रेण्यः, अनेकान्येकाकीनि पर्वतशृङ्गाणि, सहस्राधिकगर्ताः, त्रिंशत्सहस्राधिकानि ज्वालागिरिमुखानि च विद्यन्ते ।



चन्द्रस्य मानचित्रम्

कतिपयानि समुद्रनाम्ना प्रसिद्धानि श्यामल-समतल-स्थानान्यपि दृश्यन्ते । एषां सर्वेषां नामानि ज्योतिर्विद्भिर्दत्तानि, नैकानि च चन्द्रस्य मानचित्राणि निर्मितानि सन्ति, येषां साहाय्येन चान्द्र-स्थलानामवलोकनं तन्नामाभिज्ञानञ्चातिसरलम् । उपरि दत्तमेकं मानचित्रं सफोटोचित्रं द्रष्टव्यम् ।

३.६१ चान्द्रसमुद्राः

चन्द्रपृष्ठे कतिपयानि श्यामलानि चिह्नानि दृश्यन्ते । एषां विविधवर्णनानि सर्वत्र । एतानि 'लाञ्छनानि' शशकरोपेण दृष्टानि कैश्चित्, मनुष्यरूपेणापरैः, पुस्तकपाठिनीरूपेण चान्यैः । ज्योतिर्विद्भिर्मध्ययुगे एतानि समुद्रा इत्युक्तानि, अधुनापि समुद्रनाम्ना प्रसिद्धानि, यद्यपि सर्वे ज्योतिर्विदस्तेषां जलविहीनत्वं जानन्ति । एते समुद्राश्चतुर्दशसंख्याकाः सन्ति । प्रायेण ते गोला-काराः, वेला चैषामनियताकारा । (द्रष्टव्यं फोटोचित्रमधो दत्तम्, यत्र 'इन्निम'-'सागरः', 'पोसिलारम'-महासागरश्च दृश्यते) ।

तृतीयोऽध्यायः

६७

समुद्राख्यप्रदेशा वस्तुतो ज्वालागिरिमुखशून्या विशालाः समतलकाश्च सन्ति । समतल-
त्वात्ते नतोन्नतस्थलापेक्षया श्यामला दृश्यन्ते । पुरातने काले अत्र खलु द्रुता ज्वालामुखीधातव
आसन्, ते च समयानन्तरं कठोरपृष्ठका भूत्वा समतला जलविहीनप्रदेशा अभवन् ।



चन्द्रः—‘प्लैटो’-‘कोपरनिकस’-अपेननाईन्साः’ [माउण्ट-विलसन-वेधशाला]


३.६२ चान्द्रज्वालागिरिमुखानि

त्रिंशत्सहस्राधिकानि वृत्ताकाराणि ज्वालागिरिमुखानि विभिन्नपरिमाणकानि । एषां
महत्तमस्य व्यासः १४४ क्रोशार्धानि, लघुतमस्य व्यासश्च केवलं ३० हस्तमितः । वृत्ताकारपरिधय

६८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

उच्चगिरिरूपाः सन्ति, उच्चतमपरिधिपर्वतस्य उच्छ्रयः २०,००० फीटाधिकोऽस्ति । ज्वालामिरि-
मुखानां तलं क्वचित् परिधिबहिर्वर्तितदुन्नतं क्वचिन्नतञ्च दृश्यते ।




चन्द्रस्य दक्षिणभागः [माउण्ट-विलसन-वेधशाला]

एषामुत्पत्तिविषये न वर्तते विदुषामैकमत्यम् । केषाञ्चिन्मतेऽत्र ज्वालामुखिन
आसन् । परन्तु न दृश्यतेऽधुना कोऽपि ज्वालामुखी, पुरासीदित्यपि संशयविषयः । पार्थिवस्य
विशालतमज्वालामिरिमुखस्य व्यासः सप्तक्रोशार्धाल्पः, परन्तु चान्द्रस्य व्यासः १४४ क्रोशार्धानि ।
कथं चन्द्रे ईदृशानि विशालानि ज्वालामिरिमुखान्यभवन्निति कठिना समस्या । अपरेषां मतेनैता-
न्युल्कापातजनितानि । परन्तुवेतन्मतस्वीकारे दृश्यन्ते नैका आपत्तयः । नूनमुल्कापातेनेदृशानि

तृतीयोऽध्यायः

६६

गिरिमुखान्युत्पद्यन्ते, परन्तु तेषां व्यासा अतिविशाला न दृश्यन्ते । पृथिव्यामुल्कापातजनित-
गिरिमुखानां विशालतमो व्यासः केवलं क्रोशार्धमितः, चान्द्रस्य तु १४४ क्रोशार्धमितः ।




‘कोपरनिकस’-ज्वालागिरिमुखम् .[लिङ्ग-वेधशाला]

पुनश्च कथं चन्द्र एवेदशानां भयङ्कराणां पातानां भाजनमभूत् ? कथं चोल्कापाताः सदैव
ऊर्ध्वाधरतोऽपतन् ? इत्यादीनां प्रश्नानामुत्तरं न सरलम् । एवमेषां गिरिमुखानामुत्पत्तो
रहस्यगर्भा एव ।

३.६३ चान्द्रपर्वताः

ज्वालागिरिमुखानां परिधौ पर्वतश्रेण्यो दृश्यन्ते । एषामुच्छ्रयस्त्रिकोणमितीयविधिना
सूर्यकिरणजनितच्छायया माप्यते । परिधिपर्वतानामुच्चतमशृङ्गाणि दृश्यन्ते । उच्चतमस्य
उच्छ्रयोऽस्ति २७,००० फुटमितः । निम्नफोटोचित्रे ‘एपेनाइस’ पर्वतश्रेणी दृश्यते—



चन्द्रे 'एपेनाइस'-पर्वतः [लिक्-वेधशाला]

३.६४ गर्ता घृणयश्च

भूकम्पजनितपार्थिवगर्ता इव चन्द्रमस्यज्ञातगहना उपत्यकारूपा लम्बा संकीर्णाश्च सरलगर्ता अवलोक्यन्ते ।

घृणयो गर्तेभ्यो भिन्नाः, यतो गर्तानां छाया दृश्यते, आसाञ्च न कापि छाया । घृणयः कतिपयज्वालागिरिमुखेभ्यो निःसृताः सहस्राधिकक्रोशपर्यन्तमबाधगत्या पर्वते समतले च गच्छन्त्यः, ५-१० क्रोशार्धविस्तीर्णाः पूर्णचन्द्रे प्रकाशमानाः सरला रेखाः सन्ति । फोटोचित्रे § ३.६१ तमे दत्तेऽतिप्रसिद्धा 'कोपरनिकस'-निःसृताः प्रदर्श्यन्ते ।

३.७ खगोले चन्द्रस्य मार्गः


३.७१ राहुकेतू

खगोले चन्द्रस्य गतिर्नक्षत्राणां भूमिकायां माप्यते । वेधेन प्रतिदिनं नक्षत्राणां मध्ये

तृतीयोऽध्यायः

७१

चन्द्रस्य स्थितयोऽङ्कयन्ते । अङ्किताः स्थितय एकं महद्वृत्तं कल्पयन्ति, यस्य क्रान्तिवृत्तात् प्रवणता पञ्चाशन्मिता । इदं महद् वृत्तं चन्द्रस्य कक्षा-वृत्तमुच्यते । यत्रेदं कक्षावृत्तं क्रान्तिवृत्त-मुल्लङ्घयति, तत्रस्थौ द्वौ बिन्दू राहुकेतू कथ्येते । चन्द्र उत्तरं गच्छन् यत्र क्रान्ति-वृत्तमुल्लङ्घयति तत् स्थानं राहुनाम्ना प्रसिद्धम्, यत्र च दक्षिणं गच्छन् उल्लङ्घयति तत् स्थानं केतुनाम्ना प्रसिद्धम् । चन्द्रो राहुस्थानमुल्लङ्घय पुनस्तत् स्थानं २७ दि ५ हो ५ मि ३६ से (२७.२१२२२२) दिनान्तरे आगच्छति ।



३.७२ चन्द्रगतिस्थिराङ्कानां चलत्वम्

चन्द्रस्य गतिः खगोले स्थितिर्वा अतिदृच्छेण निर्धार्यते, यतश्चन्द्रगतिस्थिराङ्काः

सर्वे चलाः । ग्रहाणां गतिनियमनं सरलं यद् आकर्षणबद्धगोलद्वयस्य गतिः 'केप्लर'नियमैर्बद्धा (द्रष्टव्यः § ६०८२), परन्तु आकर्षणबद्धगोलत्रयस्य गतिनियमनमतिदुष्करम् । अत्र गोलत्रये सन्ति—सूर्यः, भूः, चन्द्रश्च । अस्मिन् गोलत्रये चन्द्रः सर्वाधिकदुर्बलः । तस्य तिस्रो गतयः—

- (१) सूर्यं परितो वार्षिकपरिक्रमणम् । (इदं भूगोलेन विक्षिप्यते)
- (२) भूचन्द्रमध्यकेन्द्रमभितोः मासिकपरिक्रमणम् । (इदं सूर्येण विक्षिप्यते)
- (३) भुवं परितो मासिकपरिक्रमणम् ।

अत एव चन्द्रगतेः सर्वे स्थिराङ्काश्चला दृश्यन्ते ।

(क) संपातपरिवर्तनम्

उपर्युक्तं यत् चन्द्रकक्षावृत्त-क्रान्तिवृत्त संपातौ राहुकेतुनामकौ । एतौ राहुकेतू न स्थिरौ । तयोर्वक्रगतिः पुरातनकालाद् विदितासीत्, यतोऽस्या वक्रगतेर्ज्ञानं वेधेन सुसरलमासीत् । चन्द्रो यद्यत्र क्रान्तिवृत्तं वृषराशाबुल्लङ्घयन् दृश्यते, अष्टादशमासानन्तरं मेषराशाबुल्लङ्घयन् द्रक्ष्यते, अत एव राहुः केतुर्वा अष्टादशमासैरेकं राशिं पूर्वं गच्छति ।

राहुः केतुर्वा पुनस्तमेव राशिं ६७९३.५ दिनान्तरे (१८ ३/४ वर्षान्तरे) आगच्छति, अर्थात् तयोर्भगणकालः १८ ३/४ वर्षमितः ।

(ख) संपातपरिवर्तनगतेः (परिवर्तनम्) असमगतिः

राहोर्भगणकालः १८ ३/४ वर्षमितः, परन्त्वस्य वक्रगतिः सर्वदा न समा । यदि सूर्यो राहोर्भिन्नान्तरे युतौ वा, तर्हि राहोर्वक्रगतिर्मध्यमा । यदि सूर्यस्य राहोः कोणीयान्तरं ४५ अंशमितम् तर्हि वक्रगतिरतिमन्दा अतिशीघ्रा वा दृश्यते । वक्रगतेर्मध्यमानादाधिक्यं न्यूनत्वं वा १°४०'-मितादधिकं न भवति ।

७२.

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

(ग) कक्षाणमनस्य परिवर्तनम्

कक्षावृत्तेन क्रान्तिवृत्ताद् यो कोणः कल्प्यते (अर्थात् कक्षाणमनस्य) सोऽपि न स्थिरः । कोणोऽयं कदाचिद् वर्धते, कदाचिच्च हीयते । कक्षाणमनस्य मध्यममानं $५^{\circ} ८' ४३''$ अस्ति । सर्वाधिकमानं $५^{\circ} २०'$ अंशादिकम्, सर्वालपमानञ्च $४^{\circ} ५७'$ अंशादिकम् । अस्य आवृत्तिकालः १७३ दिनमितः ।

(घ) उत्केन्द्रितायाः परिवर्तनम्

कक्षावृत्तस्य उत्केन्द्रिता $००^{\circ} ५४९$ मितास्ति, परन्त्वस्यामपि काले काले परिवर्तनानि दृश्यन्ते । कदाचिदियं वर्धते, कदाचिच्च हीयते । हानिवृद्धिश्च कदापि $००^{\circ} ११७$ -मिता-दधिका न ।

(ङ) नीचबिन्दोः परिवर्तनम्

चन्द्रकक्षावृत्तस्य नीचबिन्दुः प्रतिदिनं ४०१ विकलमितया ऋजुगत्या चलति । नक्षत्राणां भूमिकायामयं ३२३२ दि ११ हो १४ मि समयानन्तरं (८ वर्ष ३११ दि समयानन्तरं) पुनः पूर्वस्थानमागच्छति । मेषसम्पातस्य भूमिकायामयं ३२३१ दि ८ हो ३५ दि काले परिक्रमणं करोति ।

(च) नीचबिन्दुपरिवर्तनस्य परिवर्तनम् (असमगतिः)

नीचबिन्दोरुपरि कथितं परिवर्तनमपि समगत्या न भवति । असमगत्या परिभ्रमणशीलत्वाद् भोगांशेषु सर्वाधिकमन्तरं $१२^{\circ} २०'$ अंशादिकं लभ्यते ।

एवं चन्द्रस्य गतेः स्थिराङ्काः सर्वे चलाः ।

३.७३ चन्द्रस्य स्थितिनिर्णयः

प्रथमं मध्यमगत्या परिभ्रमतो मध्यमचन्द्रस्य स्थितिर्निश्चीयते, ततस्तत्र निम्नाः संस्काराः क्रियन्ते—

(१) मन्दफलसंस्कारः (Equation of centre)

चन्द्रस्य दीर्घवृत्ताकारकक्षाया उत्केन्द्रिता पर्याप्ता $०^{\circ} ५४९$ मितास्ति, अत एव केप्लर-नियमानुसारं कक्षावृत्ते भ्रमतश्चन्द्रस्य स्थितिर्मध्यमगत्या परिभ्रमतो मध्यमचन्द्रस्य स्थिते-र्नितान्तं भिन्ना । संस्कारोऽयं कालसमीकरणसंस्कारवद् दृश्यते ।

उच्चैः नीचैश्च मध्यमचन्द्रः स्पष्टचन्द्रश्च युगपद् दृश्येते । नीचस्थितेः सप्ताहानन्तरं स्पष्टचन्द्रो मध्यमचन्द्रात् $६^{\circ} १७'$ अंशादिकेन अग्रे भवति, उच्चस्थितौ मध्यमचन्द्रो विस्पष्टचन्द्रादभिन्नो भवति । तत्पश्चाद् मध्यमचन्द्रः स्पष्टचन्द्रस्याग्रे चलति । नीचस्थानस्य सप्ताहपूर्वं स स्पष्टचन्द्रस्य $६^{\circ} १७'$ अंशादिकेन अग्रे दृश्यते । नीचस्थाने च द्वावभिन्नौ भवतः ।

तृतीयोऽध्यायः

७३

अस्य समीकरणं निम्नम्—

$$\text{चन्द्रमन्दफलं} = \frac{\theta \text{ ज्या } nt}{2} [8 - 40 \text{ कोज्या } nt] + \frac{1}{3} \theta^3 \text{ ज्या } 3 nt^3$$

(२) व्युत्तिफलम् (Evection)

मन्दफले काले काले परिवर्तनानि दृश्यन्ते । कदाचिदिदं गणितागतमानादधिकम्, कदाचिच्चाल्पम् । चन्द्रस्य मध्यममन्दफलं $6^{\circ} 16'$ मितमस्ति । मध्यममन्दफले व्युत्तिफलं संकल्य विकल्य वा मध्यस्पष्टचन्द्रयोरन्तरं लभ्यते । व्युत्तिफलं कदाचिदपि $5^{\circ} 3'$ अंशादिकादल्पम्, $7^{\circ} 31'$ अंशादिकादधिकं न भवति । अस्य मानमपेक्ष्यते—

(क) नीचात् चन्द्रस्य दूरत्वम्

(ख) भुवः सूर्याद् दूरत्वम्

(ग) उल्केन्द्रितायाः परिवर्तनम्

(घ) नीचभोगांशानां परिवर्तनम् ।

व्युत्तिफलस्य महत्तममानं $74'$ कला अस्ति । अस्य समीकरणं निम्नम्—

$$\text{व्युत्तिफलम्} = 74' \text{ ज्या } (2 E - O)$$

[अत्र E = इनान्तरम् = मध्यमचन्द्रस्य O नीचात् कोणीयान्तरम् ।]व्युत्तिफलस्य आवृत्तिकालः 31.71 दिनानि ।

(३) वार्षिकसमीकरणम् (Annual Equation)

भूः (भुवा सह चन्द्रः) सूर्याद् नानाकालेषु दूरत्वे वर्तते, अत एव सूर्यश्चन्द्रं नानाकालेषु नानामात्रया आकर्षति । भूनीचस्थाने भुवा सह चन्द्रः सूर्यस्य समीपतमः, अत एव तदा सूर्यस्तं सर्वाधिकमात्रया आकर्षति । भूच्चस्थाने भुवा सह चन्द्रः सूर्याद् दूरतरः, अत एव तदा सूर्यस्तं सर्वालपमात्रया आकर्षति । अत एव भूनीचसमीपवर्तिषण्मासेषु कक्षावृत्ते चन्द्रस्य गतिर्मध्यमगतेरल्पा, भूच्चसमीपवर्तिषण्मासेषु कक्षावृत्ते चन्द्रस्य गतिर्मध्यमगतेरधिका दृश्यते । समीकरणमेवम्—

$$\text{चन्द्रस्य स्पष्टभोगांशाः} = \text{मध्यमभोगांशाः} - (11' 16'') \text{ ज्या } \theta$$

[अत्र θ = भूनीचात् सूर्यस्य कोणीयान्तरम् ।]

एवं वार्षिकसमीकरणजनितविकारो भूनीचे भूच्चे च शून्यमितो भवति ।

(४) 'वेरिगेशन' (Variation) पाक्षिकसंस्कारः

सूर्यो भुवं चन्द्रश्च आकर्षति । आकर्षणञ्च वस्तुदूरत्वापेक्षि । अत एव नानाकालेषु स


१. E = उल्केन्द्रिता nt = चन्द्रस्य मध्यमकेन्द्रम् (चन्द्रोच्चं मध्यमचन्द्रम्)

१०

७४

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

नानामात्रया चन्द्रमाकर्षति । अमावस्यायां चन्द्रो भुवोऽपेक्षया सूर्यस्य समीपतरः । अत एव



पाश्चात्यसंस्कारः

तदा सूर्यश्चन्द्रमधिकमाकर्षति, भूचन्द्रयोरन्तरञ्च वर्धते । पूर्णिमायां भूचन्द्रापेक्षया सूर्यस्य समीपतरा वर्तते । अत एव तदा सूर्यो भुवमधिकमाकर्षति, भूचन्द्रयोरन्तरञ्च वर्धते । अष्टम्याञ्च सूर्यात् चन्द्रस्य भुवश्च दूरत्वं समम् । एवं शुक्लपक्षस्य पूर्वाधे गतिर्मन्दतां भजते, उत्तराधे च त्वरतां भजते, कृष्णपक्षस्य पूर्वाधे मन्दतां लभते, उत्तराधे च त्वरतां लभते । विकारोऽयं ३९' ज्या २ E-तुल्यः (अत्र E=इनान्तरम्) ।

(५) बीजसंस्कारः


उपरि चत्वारो मुख्यसंस्कारा दत्ताः, परन्तु तैः संस्कृतायां स्थित्यामपि बीजसंस्कारः प्रयुज्यते ।

एवं चन्द्रस्थितिगणना अतिदुष्करा, 'हैन्सन'-'ब्राउन'-महोदयाभ्यां सारिणीभिरेव क्रियते ।

३'८ आप्लावाः

३.८१ कारणम्

समुद्रे प्रतिदिनं द्विवारमाप्लावो दृश्यते । आप्लावानां हेतुश्चन्द्रकिरणा एवेति प्राचीनकालात् प्रसिद्धिः । परं सर्वप्रथमं न्यूटनमहोदयेन स्वगुरुत्वाकर्षणसिद्धान्तसमर्थनार्थमाप्लावानां विशेषाध्ययनं कृतम् । आप्लावन्याख्यायाः सुबोधकरणाय कल्प्यते यत् पृथिवी पूर्णतया गोलकारा,



आप्लावानां हेतुः चन्द्राकर्षणमैव

१. द्रष्टव्यं 'चन्द्रगणना'पुस्तकं हिन्दीभाषायां डा०गोरखप्रसादकृतम् ।


तृतीयोऽध्यायः

७५

तस्या उपरि गहनाः समुद्राश्च सन्ति । चन्द्रः क-भागस्य समुद्रजलं त-भागस्य भूपृष्ठापेक्षया अधिकमार्कषति, थ-भागस्य भूपृष्ठश्च ख-भागस्य समुद्रजलापेक्षया अधिकमार्कषति । अनेन समुद्रा दीर्घवृत्ताकारा भवन्ति । दीर्घवृत्ताकारत्वात् समुद्रे आप्लावा दृश्यन्ते । पुनश्च च-स्थाने यदि आप्लाव उच्चोऽस्ति, तर्हि प्रायेण द्वादशहोरानन्तरं च-स्थानं (चित्रे च-स्थानं) प्राप्स्यति, तत्र च द्वितीयमाप्लावं लप्स्यते । आप्लावोऽयं पूर्वाप्लावाद् निम्नो भविष्यति ।

३.८२ अत्युच्चाप्लावा, उच्चाप्लावाश्च

यथा चन्द्रार्कषणेन आप्लावा भवन्ति तथैव सूर्यार्कषणेन । सूर्यस्य दूरत्वं चन्द्रदूरत्वापेक्षया अतिदीर्घम्, अत एव सूर्यस्यार्कषणं चन्द्रार्कषणापेक्षयात्यल्पम्, केवलं चन्द्रार्कषणस्य $\frac{१}{११}$ अंश-मितम् । पूर्णिमायाममावस्यायाञ्च सूर्यचन्द्रावेकस्यामेव दिशायां तिष्ठतः, अत एव द्वयोरार्कषणयो-र्योगश्चन्द्रार्कषणस्य $(\frac{१}{११} + \frac{१}{११}) = \frac{२}{११}$ गुणितो भवति । अष्टम्यां तु सूर्यचन्द्रयोः कोणीयान्तरं




नवत्यंशमितम्, अत एव द्वयोरार्कषणयोर्योगः चन्द्रार्कषणस्य $(\frac{१}{११} - \frac{१}{११}) = \frac{१}{११}$ भागमितो भवति । अत एव पूर्णिमायाममावस्यायाञ्च अत्युच्चाप्लावा भवन्ति, अष्टम्यां तु उच्चाप्लावा भवन्ति । अत्युच्चाप्लावेषु उच्चाप्लावापेक्षया $(\frac{१}{११} \div \frac{१}{११} = \frac{१}{१} = १ = ५ =) २\frac{३}{५}$ गुणित उच्छ्रयो दृश्यते समुद्रतरङ्गाणाम् । समुद्रतरङ्गाणामयमुच्छ्रयश्चन्द्रस्य भुवो दूरत्वापेक्षी, अत एव चन्द्रे नीचे तिष्ठति, अत्युच्चाप्लावेषु सर्वाधिक उच्छ्रयो दृश्यते ।


३.६ चन्द्रस्य उत्पत्तिः

‘डारविन’महोदयस्य मतेन पुरा चन्द्रः पृथिव्या एवैको भाग आसीत्, अर्थाद् भूचन्द्रयोरेकः पिण्ड आसीत् । तदा तापक्रमोऽत्युच्च आसीत्, पिण्डश्च द्रवीभूतपदार्थमयः । शनैः शनैश्च भ्रमणवेगात् पिण्डो दीर्घवृत्ताकारपिण्डोऽभवत् । सूर्यार्कषणादस्मिन् पिण्डेऽत्यु-च्चाप्लावा अजायन्त । एतैरुच्चाप्लावैः पिण्डस्याकारः प्रथमं तृतीयचित्रदर्शिताकारवत्, तत-

अतुर्थचित्रदर्शिताकारवत्, अन्ततः पिण्डः पृथिव्याः पृथग्भवत् । तदा चन्द्रो भुवः समीपं



चन्द्रोत्पत्तिः



(१०००० क्रोशार्धदूरत्वे) आसीत्, तयोश्चाक्षभ्रमणकालः ५-होरामित आसीत् ।

विशेषद्रष्टव्यानि

चन्द्रकलानां हानिवृद्धौ सूर्याधीने इति^१ निश्चितं मतमासीत् पूर्वाचार्याणाम् । तेषां ग्रन्थेषु कलामानं चन्द्रोदयास्तकालानयनं शृङ्गोन्नतिमानञ्च विस्तरेण शृङ्गोन्नत्यधिकारे गण्यते । यथा कलामानमेव गण्यते—

सूर्योनशीतगोलिप्ताः शुक्लं नवशतोद्भृताः ।

चन्द्रविम्बाङ्गुलाभ्यस्तं हृतं द्वादशभिः स्फुटम् ॥ (सूर्यसिद्धान्ते, १०-९)

चन्द्रग्रहणाध्यायेषु चन्द्रविम्बव्यासयोजनानि गण्यन्ते । राहुकेतु द्वयोः क्रान्तिवृत्त-चन्द्र-कक्षावृत्तसंपातयोर्विद्येते इति तेषां ज्ञानमासीत् । श्रीपतिकृतसिद्धान्तशेखरे सप्तदशोऽध्याये राहु-निराकरणं (राहुः कोऽपि राक्षसो नेति) क्रियते । तयोर्वक्रगतिरपि प्रसिद्धासीत् ।

चन्द्रस्थितिनिर्णयार्थमधुना ४० संस्काराः क्रियन्ते । एषां मुख्याः पञ्च एव । एषां मन्दफलसंस्कारः प्राचीनज्योतिर्विदां सुविदित आसीत् । मुञ्जालेन स्वीकृतौ द्वावन्यौ संस्कारौ, यौ आधुनिकानां च्युतिसंस्कारपाक्षिकसंस्कारसमौ दृश्येते । नित्यानन्देनापि पाक्षिकसंस्कार उररीकृत आसीत् । चन्द्रशेखरसामन्तेनापि स्वतन्त्ररूपेण वेधैस्त्रयाणां संस्काराणामावश्यकता दृष्टा । ते आधुनिकानां 'च्युतिसंस्कार'- 'वार्षिकसमीकरणसंस्कार'- 'पाक्षिकसंस्कारेभ्योऽभिन्ना एव ॥

१. भास्कराचार्येणोक्तम्—

तरणिकिरणसङ्गादेः पीयूषपिण्डो दिनकरदिशि चन्द्रश्चन्द्रिकाभिश्चकास्ति ।

तदितरदिशि बालाकुन्तलश्यामलश्रीर्घट इव निजमूर्तिच्छायायैवातपस्थः ॥

चतुर्थोऽध्यायः

[शशिदिवाकरयोर्ग्रहपीडनं प्राकृतजनानां सुतरामाश्चर्यविषयः । कथमेतदित्यत्र द्रष्टव्यम्]

ग्रहणम् आच्छादनं संक्रमणञ्च


खगोलीयपिण्डस्य दृश्यत्वे द्वितीयखगोलीयपिण्डकृतव्यवधानं ज्योतिर्विद्भिर्ग्रहणमुच्यते । ग्रहणानि द्विविधानि—प्रथमविधे आच्छादकपिण्डः दर्शक-आच्छाद्यपिण्ड-मध्ये आपतति, आच्छादकपिण्डस्य मध्यवर्तित्वाद् आच्छाद्यपिण्डस्य दृश्यत्वे पूर्णतया आंशिकरूपेण वा व्याघातो भवति । द्वितीयविधे आच्छादकपिण्डः सूर्य-आच्छाद्यपिण्डमध्ये आपतति । आच्छाद्य-पिण्डः खलु दृश्यते, परन्तु व्यवधानरूपाच्छादकपिण्डस्य मध्यवर्तित्वाद् रविकरनिकरा न प्राप्नुवन्त्याच्छाद्यपिण्डतलम्, सूर्यकिरणभावे च सम्मुखं वर्तमानोऽपि पिण्डोऽप्रकाशितत्वाद् न दृश्यते । प्रथमविधे सूर्यग्रहणं चन्द्रनक्षत्राच्छादनं बुधशुक्रयोः सूर्यसंक्रमणं द्विकनक्षत्रस्य नक्षत्रयोरदृश्यत्वञ्च गण्यन्ते । द्वितीयविधे चन्द्रस्य गुरोरुपग्रहाणाञ्च ग्रहणानि गण्यन्ते ।

४.१ ग्रहणाध्ययने प्रयुक्ताः प्रकाशनियमाः

प्रकाशकिरणानामध्ययनं भौतिकशास्त्रे द्विविधम्—रेखागणितीयसिद्धान्तानामध्ययनम्, भौतिकसिद्धान्तानामध्ययनञ्च । रेखागणितीयप्रकाशविज्ञाने प्रकाशकिरणानां गतिः, तत्सम्बन्ध-नियमाश्च निश्चीयन्ते; भौतिकप्रकाशविज्ञाने च प्रकाशस्य भौतिकगुणाः (भौतिकस्वरूपं वा) निश्चीयन्ते । ग्रहणाध्ययने रेखागणितीयप्रकाशविज्ञानस्य पदे पदे आवश्यकतानुभूयते, अत एव संक्षेपेण प्रमुखा नियमा अधो दीयन्ते ।

(१) प्रकाशकिरणाः सदैव सरलरेखायां गच्छन्ति

प्रकाशकिरणानां गतिः सर्वदा सरलरेखायां भवति । अन्धकारपूर्णक्षेत्रे यदि सूर्यरश्मयः कपाटच्छिद्रेण आयान्ति, तर्हि रजःकणैः प्रकाशमार्गः स्पष्टतो दृष्टिगोचरो भवति । मार्गोऽयं सरल-




रेखा, अत एव किरणाः सरलरेखायामागच्छन्ति (प्रयोगोऽयमतिसरलः, अवश्यञ्च करणीयः) ।


सूचीछिद्रकैमरायन्त्रेणापि सरलरेखागमनं सिद्धयति। सूचीछिद्रकैमरायन्त्रे सर्वदा विपरीतच्छाया दृश्यते ।

(२) छाया निर्मितिः

(अ) किरणानां समूहः किरणपुञ्जः कथ्यते । यदि किरणाः कस्माच्चिद् बिन्दोः



(बिन्दुविशेषात्) अपसार्यमाणा दृश्यन्ते, तर्हि किरणपुञ्जोऽपसृतकिरणपुञ्जः प्रोच्यते । यदि च किरणा बिन्दुविशेषे संसरन्ति, तर्हि संसृतकिरणपुञ्जः प्रोच्यते ।



चतुर्थोऽध्यायः

७६

(आ) दीप्तवस्तुनः प्रत्येकबिन्दोः किरणा अपसरन्ति । यदि दीप्तवस्तु अतिदूरवर्ति, तर्हि किरणाः समानान्तरा भवन्ति ।

(इ) दीप्तबिन्दुनिःसृतेऽपसृतकिरणपुञ्जे यदि कोऽपि पदार्थो व्यवधानरूपेणायाति, तर्हि तस्य पदार्थस्य छाया अपसृता असीमिता च भवति (द्रष्टव्यं ७८ पृष्ठस्थं द्वितीयं चित्रम्) ।

(ई) दीप्तवस्तुनिःसृतकिरणपुञ्जे यदि कोऽपि पदार्थो व्यवधानरूपेणापतति, तर्हि तस्य पदार्थस्य द्वे छाये भवतः—प्रथमा अल्पा घनतरा च, द्वितीया च दीर्घा परं विरलतरा । प्रथमा प्रच्छाया कथ्यते, द्वितीया च उपच्छाया कथ्यते । (द्रष्टव्यमत्रत्यं चित्रम्) ।

(उ) दीप्तवस्तुनो लघुतरस्य पदार्थस्य छायापि द्विविधा । प्रच्छाया संसृता सूचीमुखा, उपच्छाया च अपसृता ।


(३) सौरमण्डले ग्रहाणामुपग्रहाणाञ्च छाया

सौरमण्डलीयानां सर्वेषां ग्रहाणामुपग्रहाणाञ्च छाया महाकाशे निर्मीयते । सूर्याल्लघुत्वात्तेषां संसृता तमोमयी सूचीरूपा छाया भवति, सूच्यग्रभागश्च सदैव सूर्याद् दूरतरभागे वर्तते । एषा छाया तावददृश्या यावन्न कश्चित्पिण्डस्तस्यामापतति, आपत्य च स्वतलं तमोमयं न करोति । यतश्चन्द्रो भूश्च सौरमण्डले पिण्डौ । चन्द्रस्य छाया भुवि पतति, भुवश्च छाया चन्द्रे पतति; सूर्यचन्द्रग्रहणे चैवं भवतः ।


४.२ चन्द्रग्रहणम्

४.२१ कारणम्

भूरेको ग्रह एव, क्रान्तिवृत्ते च सा सूर्यं परितो भ्रमति । अत एव तमोमयी सूच्याकारा भुवश्छाया (भूमा) सूर्यविपरीतदिशायां सूर्यबिम्बात् षड्भान्तरे सदैव पतति । यदि कदाचित् स्वकक्षायां परिभ्रमन् चन्द्रस्तां भूमासूचीं प्रविशति, चन्द्रबिम्बस्य सूर्यकिरणोपलब्ध्यभावात्तत्र प्रकाशहीनत्वं जायते, तदेव लोके चन्द्रग्रहणमुच्यते । यतश्चन्द्रग्रहणावसरे चन्द्रो भूमायां प्रविशति, भूमा च सर्वदा सूर्यबिम्बकेन्द्रात् षड्भान्तरे वर्तते, अत एव चन्द्रस्यापि सूर्यबिम्बकेन्द्रात् षड्भान्तरे स्थितिरावश्यकी । ईदृशी षड्भान्तरे स्थितिः पूर्णिमान्त एव भवति, अत एव पौर्णमास्यामेव चन्द्रग्रहणं भवति ।



परन्तु प्रतिपौर्णमास्यन्ते ग्रहणं न दृश्यते । अत्र चन्द्रपरिक्रमणमार्गस्य क्रान्तिवृत्तात् प्रवणता (चन्द्रकक्षाणमनम्) एव हेतुः । भूमा सर्वदा क्रान्तिवृत्ते भ्रमति, परन्तु चन्द्रो यस्मिन् वृत्ते भ्रमति तस्य क्रान्तिवृत्तात् कोणीयान्तरं $5^{\circ} 9'$ अंशादिकमितमस्ति । चन्द्रकक्षायां चन्द्रो मासार्धे क्रान्तिवृत्तमुत्तरेण, मासार्धे च क्रान्तिवृत्तं दक्षिणेन भ्रमति, द्विवारञ्च प्रतिमासं क्रान्तिवृत्तमतिक्रामति । अनुच्छेदे ३.७१ तमे वर्णितं यत् चन्द्रकक्षा-क्रान्तिवृत्तयोः सम्पातौ राहुकेतू ।



चतुर्थोऽध्यायः

८१

यतश्चन्द्रग्रहणावसरे चन्द्रो भूभायां प्रविशति, भूभा च सर्वदा क्रान्तिवृत्ते वर्तते, अत एव चन्द्रस्यापि क्रान्तिवृत्ते उपस्थितिरावश्यकी । चन्द्रस्य क्रान्तिवृत्ते स्थितिः राहुकेत्वोर्भवति, अत एव चन्द्रग्रहणं तदैव भवति यदा चन्द्रो राहुकेत्वोस्तिष्ठति ।

एवं चन्द्रग्रहणं तदैव भवति यदा—

(१) पूर्णिमा वर्तते,

(२) चन्द्रश्च राहुकेत्वोः, राहुकेत्वोः समीपे वा भवति ।

४.२२ चन्द्रग्रहणभेदाः


यदि चन्द्रः स्वक्षायां परिभ्रमन् भूभासूचीमेवं प्रविशति यत्तस्य पूर्णं मण्डलं तमोमय्यां छायायां वर्तते, तर्हि पूर्णचन्द्रग्रहणं कथ्यते । यदि स केवलमांशिकरूपेण प्रविशति, अर्थादतिक्रमणे सदैव कश्चिद् भागः प्रकाशवान् एव वर्तते, तर्हि खण्डचन्द्रग्रहणं कथ्यते ।


(द्रष्टव्यं चित्रं ८० तमे पृष्ठे)

४.२३ भूभायामतिक्रमणम्

यदा चन्द्रग्रहणं भवति तदा चन्द्रो भ्रमन् शनैः शनैः भूभाया उपच्छायायां प्रविशति । उपच्छायायां चन्द्रालोको धूमिलो भवति, परन्तु कः — समीपभागागताः किरणाः पर्याप्तं चन्द्रं प्रकाशयन्ति; ग्रहणस्य आभासमात्रमपि न विद्यते । ग्रहणं तदैव

भूभायां प्रविशति





प्रतीयते यदा चन्द्रः प्रच्छा-
यायां प्रविशति । शनैः शनै-
श्चन्द्रस्य कश्चिद् भागस्तमो-
मयो भवति, ततस्तमोवृत्तं
वर्धते । पूर्णग्रहणे पूर्णतया
चन्द्रो लुप्तो भवति । ततः
कश्चिद् भागः प्रकाशतां
याति । चन्द्रः प्रच्छायाया
निर्गत्य उपच्छायायामायाति,
पुनश्छायाया वह्निर्निगच्छति ।

४.२४ चन्द्रकक्षायां भूभा- व्यासानयनम्

अत्र सूर्यकेन्द्रः 'सू',
भूकेन्द्रः 'भू', चन्द्रकेन्द्रः
च, सन्ति । भूमासूर्यग्रं
अस्थाने वर्तते । चन्द्रकक्षायां
भूभाव्यासः च_१, च_२, भूभा-
व्यासार्धश्च च_३ त दृश्यते ।
∠ खकभू-कोणः सूर्यस्य लम्बनं
ल_१ अस्ति । खच_१भू-
कोणश्चन्द्रस्य क्षैतिजलम्बनं
ल_२ अस्ति । सूर्यस्य बिम्ब-
व्यासार्धः क भू सू-कोणः वि_१
अस्ति । अत्र भूभाव्यासार्धस्य
मानं निश्चेतव्यम् ।

कल्प्यते च_१ भू त
कोणः (भूभाव्यासार्धः)
∞ अस्ति ।

क भू अ-त्रिभुजे
वह्निःकोणः क भू सू = अन्तः-
कोणद्वययोगः
= ∠ अ क भू + ∠ क अ भू

१. पूर्णग्रहणेऽपि चन्द्रः किञ्चिद् धूमिलः पाटलितवर्णकश्च दृश्यते । सूर्यास्ते सूर्योदये वा क्षितिज-
लग्ने सूर्येऽपि चन्द्रग्रहणदर्शनं भवति । वायुमण्डले प्रकाशकिरणानां वर्तनादिदं सर्वं भवति ।

चतुर्थोऽध्यायः

८३

अर्थात् $\text{त्रि}_1 = \text{ल}_1 + \theta$ च_१ भू अ-त्रिमुजे बहिःकोणः कच_१ भू = अन्तःकोणद्वययोगः

$$= \angle \text{च}_1 \text{ अ भू} + \angle \text{च}_1 \text{ भू अ}$$

अर्थात् $\text{ल}_2 = \theta + \alpha$ अत एव $\theta = \text{त्रि}_1 - \text{ल}_1$ (प्रथमसमीकरणात्)

$$= \text{ल}_2 - \alpha \text{ (द्वितीयसमीकरणात्)}$$

अत एव $\text{त्रि}_1 - \text{ल}_1 = \text{ल}_2 - \alpha$ अर्थात् $\alpha = \text{ल}_2 + \text{ल}_1 - \text{त्रि}_1$ सामान्यतया $\text{ल}_1 = ०^{\circ} ८' ८''$

$$\text{ल}_2 = ५७^{\circ} २' ७''$$

$$\text{त्रि}_1 = १५^{\circ} ५९' ६३''$$

अत एव $\alpha = ४१^{\circ} १०'' \div ९$ अत एव $\alpha = \text{भूमाव्यासः} = ८२^{\circ} २१'' + ८$
(इदमेव कर्तव्यमासीत्)

४.२५ भूमादैर्घ्यम्

भूमादैर्घ्यं चित्रे 'भूअ' अस्ति । 'भूअ' अस्य मानमेवं निश्चयिते—

$$\text{वृत्तीयमाने ज्ञातमेव यत् } \frac{\text{भूमाव्यासार्धः}}{\text{भूमादैर्घ्यम्}} = \frac{\theta'' \text{ (विकलमाने)}}{२०६२६५''}$$

$$\text{अर्थाद् भूमादैर्घ्यम्} = \frac{\text{भूमाव्यासार्धः} \times २०६२६५''}{\theta'' \text{ (विकलमाने)}}$$

उपरिवर्त्यनुच्छेदस्य प्रथमसमीकरणात्

$$\begin{aligned} \theta &= \text{त्रि}_1 - \text{ल}_1 = १५^{\circ} ५९' ६३'' - ८'' ८' \\ &= ९५९'' ६३ - ८'' ८' \\ &= ९५०'' ८' \end{aligned}$$

$$\text{अत एव भूमादैर्घ्यम्} = \frac{४००० \times २०६२६५}{९५०८}$$

$$= ८६७८०० \text{ क्रोशार्धानि ।}$$

४.२६ ग्रहणस्थितिकालः

चन्द्र एकस्यां होरायां $३२^{\circ} ५६''$ कोणीयान्तरमुल्लङ्घयति, अत एव भूमाया उल्लङ्घनं स प्रायो होरात्रये करोति । भूमायां पूर्णग्रहणे पूर्णग्रहणस्थितिकालः $\frac{२\alpha - ३१'}{३२^{\circ} ५६''} = १\frac{३}{४}$ होरामितः ।भूमादैर्घ्यं $८,६७,८००$ क्रोशार्धानि । चन्द्रस्य भुवो दूरत्वं केवलं $२,४०,०००$ क्रोश-१. उपच्छायाया व्यासमानं गणनया $२ (\text{ल}_1 + \text{ल}_2 + \text{त्रि}_1) = १४६' २२'' ५$
मितमागच्छति ।

धानि, अत एव असम्भवमिदं यत् चन्द्रकक्षा भूमाया बहिर्भवेत् । अत एव राहुकेतुसमीपवर्ति-
पौर्णमास्यां चन्द्रग्रहणमवश्यं दृश्यते ।

४.३ सूर्यग्रहणम्

४.३१ कारणम्

निजकक्षायां भ्रमतश्चन्द्रस्य तमोमयी सूच्याकारा छाया सूर्यप्रतिकूलदिशायां सदैव पतति । यदि कदाचिद् भूश्चन्द्रभायामापतति, तर्हि चन्द्रो भूपृष्ठस्यदर्शकसूर्यमध्ये व्यवधानरूपेण तिष्ठति । सूर्यश्च तदा न दृश्यते व्यवधानभावात्, यथा मेघावृतः सूर्यो न दृश्यते । ईदृशमदर्शनं सूर्यस्य सूर्यग्रहणमुच्यते । यतः सूर्यग्रहणावसरे चन्द्रो भू-सूर्य-मध्ये तिष्ठति, ईदृशी च स्थितिरेवावस्थायां भवति, अत एवाभावस्यायामेव सूर्यग्रहणं भवति ।

परन्तु प्रत्येकस्याममावस्थायां ग्रहणं न दृश्यते । अत्र चन्द्रग्रहण इव चन्द्रकक्षायाः कक्षा-
णमनमेव कारणम् । सूर्यग्रहणमत एव तदैव सम्भवं यदा चन्द्रो राहुकेत्वोस्तिष्ठति ।


एवं सूर्यग्रहणं तदैव सम्भवम्, यदा—

(१) अमावस्या तिथिर्वर्तते ।


(२) चन्द्रश्च राहुकेत्वोः, राहुकेत्वोः समीपं वा तिष्ठति ।

४.३२ सूर्यग्रहणभेदाः

सूर्यग्रहणे चन्द्रबिम्बमाच्छादकम्, सूर्यबिम्बं चाच्छाद्यम् । साधारणोऽनुभवो जनानां
यदाच्छादनमाच्छादकबिम्बव्यासम् आच्छाद्यबिम्बव्यासञ्च अपेक्षते ।
पूर्णग्रहणं वलयाकार- आच्छादकस्य आच्छाद्यादधिकत्वे (आच्छाद्यसमत्वेऽपि) एकसूत्र-
ग्रहणञ्च वर्तित्वे च पूर्णाच्छादनं भवति । आच्छादकस्य आच्छाद्यादल्पत्वे
एकसूत्रवर्तित्वे च आच्छाद्यबिम्बमध्यं तु आच्छाद्यते, परन्तु बिम्ब-
मध्याप्रकाशितभागाद् बहिर्भागः प्रकाशते वलयाकाररूपेण ।



पूर्णग्रहणम्



वलयाकार-
ग्रहणम्

चन्द्रबिम्बव्यासः ३३' २२''
कलादिकमितात् २८' ४८'' कला-
दिकमितो दृश्यते । सूर्यबिम्बव्यासश्च
३२' ३६'' मितात् ३१' ३२''
मितपर्यन्तं दृश्यते । अत एव चन्द्र-
बिम्बव्यासः सूर्यबिम्बात् कदाचिद्
अधिकः, कदाचित् समः, कदाचि-
दल्पो विद्यते ।

पूर्णग्रहणम्—पूर्णग्रहणे सूर्यस्य बिम्बं पूणतया चन्द्रबिम्बेनाच्छाद्यते । चन्द्रे नीचे तिष्ठती-
दृशी स्थितिर्भवति ।

वलयाकारग्रहणम्—वलयाकारग्रहणे विपुलसूर्यबिम्बमध्ये श्यामं वृत्ताकारचन्द्रबिम्बं
दृश्यते । तदमित उज्ज्वलपूर्यबिम्बं भाति । चन्द्रे उच्चे तिष्ठतीदृशी स्थितिर्भवति ।

चतुर्थोऽध्यायः


८५

खण्डग्रहणम्—पूर्णग्रहणे वलयाकारग्रहणे च सूर्यकेन्द्र-चन्द्रकेन्द्र-लग्ना रेखैव भूपृष्ठस्थ-दर्शक-सूर्यरेखा । परन्तु वीदशी दशा सर्वदा न भवति । प्रायः सूर्यचन्द्रलग्नरेखायाः भूपृष्ठस्थ-दर्शक-केन्द्र-लग्नरेखा भिन्ना दृश्यते । अत एव चन्द्रविम्बं सूर्यस्य भागं स्पृष्ट्वा निर्गच्छति, खण्डग्रहणञ्च भवति । सर्वेषां पूर्णग्रहणानां वलयाकारग्रहणानां च प्रारम्भा अन्ताश्च खण्डरूपेणैव भवन्ति ।


ग्रहणाभावः

यदि सूर्यचन्द्रलग्नरेखातो भूपृष्ठ-सूर्यलग्नरेखा पर्याप्ता भिन्ना, तर्हि सूर्यग्रहणं न भवति ।
(द्रष्टव्यान्यथाश्चित्राणि)—


सूर्यग्रहणभेदाः




पूर्णग्रहणम्



वलयाकारग्रहणम्




खण्डग्रहणम्



ग्रहणाभावः

४.३३ चन्द्रभाया अतिक्रमणम्


सूर्यग्रहणावसरे चन्द्रस्य उपच्छाया प्रच्छायापूर्वं भुवि पतति । उपच्छायायां भूपृष्ठस्थमनुजः सूर्यस्य खण्डग्रहणं पश्यति । पुनः शनैः शनैः प्रच्छाया भुवि पतति । प्रच्छायापतने पूर्णग्रहणं



भवति, दिवैव पूर्णान्धकारो दृश्यते, नक्षत्राण्याकाशेऽवलोक्यन्ते, पक्षिणो रवं कुर्वन्तः स्वनीडेषु प्रविशन्ति, पशवोऽसमये रात्रिमालोक्य व्याकुला भवन्ति । परन्तु तमिस्त्रेयं क्षणिका । प्रच्छाया झटिति भुवमुल्लङ्घयति । उपच्छायायां पुनः खण्डग्रहणं दृश्यते । तत उपच्छायापि भुवमुल्लङ्घयति । ग्रहणस्य मोक्षो भवति ।

पूर्णसूर्यग्रहणस्य ज्योतिर्विद्यायामतिमहत्ता वर्तते । विज्ञानविदो दूरदेशेभ्यस्तत्र सम्मिलिता भवन्ति, यत्र पूर्णग्रहणं दृश्यमानं भवति । तत्र क्षणिकान्धकारे सूर्यवर्णमण्डलस्य सूर्यप्रभामण्डलस्य च वैज्ञानिकपरीक्षणानि क्रियन्ते । सापेक्षवादस्य (‘आइन्स्टाईन’महोदयमतस्य) सत्यता-स्थापनं क्रियते ।

४.३४ चन्द्रभायास्य चन्द्रभादैर्घ्यस्य चानयनम्



चन्द्रभादैर्घ्यं चित्रे च अ अस्ति । चित्रे क सू अ-त्रिभुजं ख चं अ-त्रिभुजं परस्परं सामानत्रिभुजे, अत एव

$$\frac{\text{क सू}}{\text{ख चं}} = \frac{\text{अ सू}}{\text{अ चं}} \quad \text{अर्थात्} \quad \frac{\text{सूर्यव्यासार्धः}}{\text{चन्द्रव्यासार्धः}} = \frac{\text{अ सू}}{\text{अ चं}}$$

अ सू च अचं-चंसू-योगतुल्यः, अर्थात् असू = अचं + चंसू

$$\text{अत एव } \frac{\text{सूर्यव्यासार्धः}}{\text{चन्द्रव्यासार्धः}} = \frac{\text{अ सू}}{\text{अ चं}} = \frac{\text{अ चं + चं सू}}{\text{अ चं}}$$


अर्थात् (अ चं) (सूर्यव्यासार्धः) = (अ चं) (चन्द्रव्यासार्धः) + (चंसू) (चन्द्रव्यासार्धः)

अर्थात् (अ चं) (सूर्यव्यासार्धः) - (अ चं) (चन्द्रव्यासार्धः) = (चं सू) (चन्द्रव्यासार्धः)

अर्थात् (अ चं) (सूर्यव्यासार्धः - चन्द्रव्यासार्धः) = (चं सू) (चन्द्रव्यासार्धः)

$$\text{अर्थाद् अ चं (= चन्द्रभादैर्घ्यम्)} = \frac{\text{चन्द्रसूर्यान्तरं} \times \text{चन्द्रव्यासार्धः}}{\text{सूर्यव्यासार्धः} - \text{चन्द्रव्यासार्धः}}$$

चन्द्रकक्षाया व्यासमानानयनम्



§. तमे दत्ते चित्रे यथा चिह्नानि तथा अत्र 'सू' क ख भू अ विद्यन्ते । चन्द्रकक्षाया व्यासार्धस्य आनयनमत्र कर्तव्यम् । अत्र $\frac{च_1 च_2}{२}$ इष्टमानम् । कल्प्यते इदं B-मितम् ।

च, भू अ-त्रिभुजात् $B = l_2 + \theta''$

क भू अ- त्रिभुजात् त्रि_१ = ल_१ + θ अर्थात् θ = त्रि_१ / ल_१

अत एव $B = l_2 + \theta = l_2 + (l_1 - l_2)$

$$= \text{बि}_1 + \text{ल}_2 - \text{ल}_1$$

सामान्यतया $\ell_9 = 0' 41''.4$

$$L_2 = 49' 21.6$$

$$\text{चि}_9 = १५' ५९''.६३$$

अत एव $B = 72'48''.33$

अत एव $2B = \text{सूर्यग्रहणावसरे चन्द्रकक्षाव्यासः} = 183' 48'' \cdot 66$

चन्द्रसूर्यान्तरं चन्द्रस्य भुवश्च स्थितिमपेक्षते, अत एव परिवर्तनशीलम् । भुवः सूर्यस्य सर्वाधिकदूरत्वं ९,४४,००,००० क्रोशार्धानि, अल्पतमदूरत्वञ्च ९,१४,००,००० क्रोशार्धानि । चन्द्रस्य भुवः सर्वाधिकदूरत्वं २,६६,००० क्रोशार्धानि, अल्पतमदूरत्वञ्च २,२१,००० क्रोशार्धानि ।

अत एव सर्वाधिकसूर्यचन्द्रान्तरं ९,४४,००,०००—२,२१,०००=९,४१,७९,००० क्रोशार्धानि,
अल्पतमसूर्यचन्द्रान्तरं ९,१४,००,०००—२,५६,०००=९,११,४४,००० क्रोशार्धानि ।

चन्द्रव्यासार्धमानं १०८० क्रोशार्धानि, सूर्यव्यासार्धमानञ्च ४,३२,००० क्रोशार्धानि ।

अत एव—

$$\frac{\text{चन्द्रव्यासार्धः}}{\text{सूर्यव्यासार्धः—चन्द्रव्यासार्धः}} = \frac{१०८०}{४३०९२९} = \frac{३}{११९७}$$

$$\text{एवं सर्वाधिकचन्द्रसूर्यान्तरे चन्द्रभादैर्घ्यम्} = \frac{९,४१,७९,००० \times ३}{११९७} \\ = २,३६,०७१ \text{ क्रोशार्धानि}$$

$$\text{एवञ्च सर्वालपचन्द्रसूर्यान्तरे चन्द्रभादैर्घ्यम्} = \frac{९,११,४४,००० \times ३}{११९७} \\ = २,२८,४३१ \text{ क्रोशार्धानि}$$

एवं सर्वाधिकचन्द्रसूर्यान्तरे भुवश्चन्द्रदूरत्वं २,२१,००० क्रोशार्धानि, चन्द्रभादैर्घ्यं २३६०७१ क्रोशार्धानि, सर्वालपचन्द्रसूर्यान्तरे भुवश्चन्द्रदूरत्वं २,५६,००० क्रोशार्धानि, चन्द्रभादैर्घ्यं २,२८,४३१ क्रोशार्धानि

प्रथमावस्थायां चन्द्रभा भुवि २३६०७१—२२१०००=१५०७१ क्रोशार्धान्यऽन्तः प्रविशति, पूर्णग्रहणञ्च दृश्यते ।

द्वितीयावस्थायां चन्द्रभा भुवः २५६०००—२२८४३१=२७५६९ क्रोशार्धानि दूरं बहिर्वर्तते, वलयाकारग्रहणञ्च दृश्यते ।

४.४ सूर्यचन्द्रग्रहणानि

४.४१ सूर्यग्रहण-चन्द्रग्रहणयोस्तुलना

दृश्यताविषयकतुलना

चन्द्रग्रहणं भुवोऽप्रकाशितगोलार्धस्य प्रत्येकभागाद् दृश्यते । सूर्यग्रहणं भुवः प्रकाशित-गोलार्धस्य तस्मादेव भागाद् दृश्यते य उपच्छायायां प्रच्छायायां वा पतति । ईदृशो भागः पर्याप्तं संकुचितः, अत एव चन्द्रग्रहणानि सूर्यग्रहणापेक्षयाऽधिकसंख्यायां दृश्यन्ते, यद्यपि तान्यल्प-संख्यायां भवन्ति ।

ग्रहणसंख्याविषयकतुलना

चन्द्रग्रहणे चन्द्रकक्षाया व्यासः ($२\alpha = ८२'$) सूर्यग्रहणे चन्द्रकक्षाव्यासाद् ($२B = १४४'$) अल्पः, अत एव चन्द्रग्रहणानां सम्भावना सूर्यग्रहणसम्भावनाया अल्पीयसी । अत एव सूर्यग्रहणानां संख्या चन्द्रग्रहणानां संख्याया अधिकतरा भवति (एकस्मिन् ग्रहणचक्रे १४ सूर्य-ग्रहणानि, २९ चन्द्रग्रहणानि च भवन्ति) ।

ग्रहणस्थितिकालविषयकतुलना

चन्द्रग्रहणे भूभाया व्यासस्य चन्द्रकक्षायां वास्तविकमानं ५७०० क्रोशार्धानि भवति, अतश्चन्द्रो भूमां प्रायो होरात्रये उल्लङ्घयति । सूर्यग्रहणे च चन्द्रभायाः (प्रच्छायायाः) भुवि

चतुर्थोऽध्यायः

८६

वास्तविकव्यासः १६७ क्रोशार्धमितः, अत एव प्रच्छाया अष्ट-मिनटेभ्यः पूर्वमेव पृथिवीतल-
मुल्लङ्घयति । एवं पूर्णचन्द्रग्रहणस्य स्थितिकालोऽधिकः, पूर्णसूर्यग्रहणस्य स्थितिकालो न्यूनः ।

४.४२ ग्रहणसम्भावना

चन्द्रग्रहणसम्भवः


भूभा क्रान्तिवृत्ते भ्रमति,
चन्द्रस्तु स्वकक्षायां भ्रमति ।
कल्प्यते त-स्थित्यां ग्रहणस्पर्श-
स्थितिः । यतः स्पर्शारम्भो भवति,
अतः—

आ क + क अ = अ आ

अर्थाद् भूभा व्यासार्धः + चन्द्रबिम्ब-
व्यासार्धः = अ आ

पूर्वं ज्ञातमिदं यद् भूभा-
व्यासार्धः $\alpha = ४१' १०'' ९$ चन्द्र-
बिम्बव्यासार्धः $= १५' ३२'' ५८$

अत एव अ आ $= ४१' १०'' ९ +$
 $१५' ३२'' ५८ = ५६' ४३''$



त - १ स्थितिः

कल्प्यते थ-स्थित्यां पूर्ण-
ग्रहणत्वारम्भः । अत्र—

आ' क' - अ' क' = आ' अ'


अर्थाद् भूभा व्यासार्धः —

चन्द्रबिम्बव्यासार्धः = आ' अ'

अर्थात् $४१' १०'' ९ -$ $१५' ३२'' ५८ = २५' ३८''$

अत एव ग्रहणं तदैव सम्भवं

यदा चन्द्रकेन्द्र-बिम्बकेन्द्रान्तरं

(चन्द्रस्य शरः) $५६' ४३''$ मितम्, $५६' ४३''$ मितदल्पंवा । पूर्णग्रहणे इदमन्तरं $२५'$ $३८''$ मितमथवा न्यूनं भवति ।

थ - १ स्थिति

१. अ आ = ल_१ + ल_२ - बि_१ + बि_२ सामान्यमानानि ल_१ = ८८' बि_१ = १६' १८'' महत्तममानम्

ल_२ = २७' = १२' ४६'' अल्पतममानम्

२. अ' आ' = ल_१ + ल_२ - बि_१ - बि_२ कक्षाण्मनम् = ए = २° २०' महत्तममानम् बि_२ =

$१६' ४१''$ महत्तममानम् = $४° २७'$ अल्पतममानम् = $१४' २४''$ अल्पतममानम् ।

१२

राहुकेत्वोर्निम्नतमसान्निध्यम्

राहुकेत्वोः कियति दूरे सूर्यस्तिष्ठेद् यदा चन्द्रग्रहणं भवेत् ? इति प्रश्नस्योत्तरे 'प्रधाना ग्रहणविषयकसीमा', 'गौणी ग्रहणविषयकसीमा' च निश्चीयेते । चन्द्रग्रहणे प्रधाना ग्रहणविषयकसीमा १२°५' मिता, गौणी ग्रहणविषयकसीमा च ९°३०' मिता । सूर्यराहोः सूर्यकेत्वोर्वा अन्तरं यदि प्रधानायां सीम्नि, तर्हि चन्द्रग्रहणस्य सम्भावनामात्रं विद्यते । यदि गौण्यां सीम्नि, तर्हि चन्द्रग्रहणस्य निश्चयेन भवितव्यता विद्यते ।

सूर्यग्रहणसम्भवः सीमा च

यथा पूर्वं चन्द्रग्रहणसम्भवो निश्चितः, तथैव सूर्यग्रहणसम्भवो निश्चीयेते । सूर्यग्रहणं तदैव सम्भवं यदि चन्द्रकेन्द्र-भूभाविम्बकेन्द्रान्तरं = चन्द्रविम्बव्यासार्धः + चन्द्रलम्बनम्

$$\begin{aligned} & \text{—सूर्यविम्बव्यासार्धः—सूर्यलम्बनम्} \\ & (\text{त्रि}_2 + \text{ल}_2 - \text{त्रि}_1 - \text{ल}_1) \\ & = ८८' \text{ (मध्यमानम्)} \end{aligned}$$

पूर्णसूर्यग्रहणं तदैव सम्भवं यदा—

$$\text{चन्द्रकेन्द्र-भूभाविम्बकेन्द्रान्तरं} = \text{चन्द्रलम्बनं} + \text{सूर्यविम्बव्यासार्धः} - \text{चन्द्रविम्बव्यासार्धः} - \text{सूर्यलम्बनम्}$$

$$\begin{aligned} & = \text{ल}_2 + \text{त्रि}_1 - \text{त्रि}_2 - \text{ल}_1 \\ & = ५८' \text{ (मध्यमानम्)} \end{aligned}$$

सूर्यग्रहणे 'प्रधाना ग्रहणविषयकसीमा' १८°३१' मिता, 'गौणी ग्रहणविषयकसीमा' च १५°२१' मिता । अत एव सूर्यराहोः सूर्यकेत्वोर्वा अन्तरं यदि प्रधानायां सीम्नि (अर्थात् १८°३१' मितादल्पम्), तर्हि सूर्यग्रहणस्य सम्भावना विद्यते । यदि गौण्यां सीम्नि (अर्थात् १५°२१' मितादल्पम्), तर्हि निश्चयेन भवितव्यता वर्तते ।

४.४३ एकस्मिन् वर्षे ग्रहणानां संख्या

$$\text{चान्द्रमासे } २९\frac{१}{२} \text{ दिनानि भवन्ति, अत एव पूर्णिमाया अमावस्यापर्यन्तं } \frac{२९\frac{१}{२}}{२}$$

= १४°७५ दिनानि भवन्ति । सूर्यश्च राहुं पुनः ३४६.६ दिनैः प्राप्नोति, अत एवैकस्मिन् पक्षे (चान्द्रपक्षे) $\frac{३६० \times १४.७५}{३४६.६} = १५^{\circ}१८'$ गच्छति । इमां चन्द्रगतिम्, इमां सूर्यगतिञ्च, विभिन्ना ग्रहणविषयकसीमाश्च विचार्य ज्योतिर्गणकैर्ग्रहणानां संख्या निश्चीयते । एकस्मिन् वर्षे द्वे सूर्यग्रहणे अवश्यं भवतः । ग्रहणानामधिकतमा संख्या च सप्त अस्ति—पञ्च सूर्यग्रहणानि, द्वे चन्द्रग्रहणे; अथवा चत्वारि सूर्यग्रहणानि, त्रीणि च चन्द्रग्रहणानि ।

४.४४ ग्रहणावृत्तिचक्रम् (सैरोस)

चान्द्रमासे २९ ५३ दिनानि भवन्ति, राहोश्च युतिकालः ३४६.६२ दिनानि, अत एव ६५८५ दिनानां पश्चाद् राहुः केतुश्चन्द्रः सूर्यश्च सर्वे परस्परं पूर्ववद् भविष्यन्ति । यतः—

$$\text{चन्द्रस्य } २२३ \text{ भगणाः} = ६५८५.३२ \text{ दिनानि}$$

$$\text{राहोश्च } १९ \text{ भगणाः} = ६५८५.७८ \text{ दिनानि}$$

एवं ६५८५ = १८ व.११. दिनानां पश्चात् पूर्ववद् ग्रहणानि भविष्यन्ति ।

अग्रे दीयते सारिणी ग्रहणावृत्तिचक्रद्वयान्तर्वर्तिग्रहणानाम् । एकस्मिन् ग्रहणावृत्तिचक्रे

चतुर्थोऽध्यायः

६१

४१ सूर्यग्रहणानि २९ चन्द्रग्रहणानि च भवन्ति । सारिण्या स्पष्टीभविष्यति यत् प्रत्येकस्मिन् षष्ठे मासे ग्रहणानुकूलकालो भवति ।

४.४४ ग्रहणानां सारिणी

विस्ताब्दः	चन्द्रस्य	उपराहु	सूर्यस्य	चन्द्रस्य	उपकेतु	सूर्यस्य
१९३२	मार्च २२		मार्च ७	सितम्बर १४		अगस्त ३१
१९३३			फरवरी २४			अगस्त २१
१९३४	जनवरी ३०		फरवरी १४	जुलाई २६		अगस्त १०
१९३५	जनवरी १९		{ जनवरी ५ फरवरी ३ दिसम्बर २५ }	जुलाई १६		{ जून ३० जुलाई ३० }
१९३६	जनवरी ८		दिसम्बर १३	जुलाई ४		जून १९
१९३७	नवम्बर १८		दिसम्बर २			जून ८
१९३८	नवम्बर ७		नवम्बर २२	मई १४		मई २९
१९३९	अक्टूबर २८		अक्टूबर १२	मई ३		अप्रैल १९
१९४०			अक्टूबर १			अप्रैल ७
१९४१	सितम्बर ५		सितम्बर २१	मार्च १३		मार्च २७
१९४२	अगस्त २६		{ अगस्त १२ सितम्बर १० }	मार्च ३		मार्च १६
१९४३	अगस्त १५		अगस्त १	फरवरी २०		फरवरी ४
१९४४			जुलाई २०			जनवरी २५
१९४५	जून २५		जुलाई ९	दिसम्बर १९		जनवरी १४
१९४६	जून १४		{ मई ३० जून २९ }	दिसम्बर ८		{ जनवरी ३ नवम्बर २३ }
१९४७	जून ३		मई २०			नवम्बर १२
१९४८	अप्रैल २३		मई ९			नवम्बर १
१९४९	अप्रैल १३		अप्रैल २८	अक्टूबर ७		अक्टूबर २१
१९५०	अप्रैल २		मार्च १८	सितम्बर २६		सितम्बर १२
१९५१			मार्च ७			सितम्बर १
१९५२	फरवरी ११		फरवरी २५	अगस्त ५		अगस्त २०
१९५३	जनवरी २९		फरवरी १४	जुलाई २६		{ जुलाई ११ अगस्त ९ }
१९५४	जनवरी १९		{ जनवरी ५ दिसम्बर २५ }	जुलाई १६		जून ३०
१९५५	नवम्बर २९		दिसम्बर १४			जून २०
१९५६	नवम्बर १८		दिसम्बर २	मई २४		जून ८

६२


अर्वाचीन ज्योतिर्विज्ञानम्

ख्रिस्ताब्दः	चन्द्रस्य	उपराहु	सूर्यस्य	चन्द्रस्य	उपकेतु	सूर्यस्य
१९५७	नवम्बर ७		अक्टूबर २३	मई १३		अप्रैल २९
१९५८			अक्टूबर १२			अप्रैल १९
१९५९			अक्टूबर २	मार्च २४		अप्रैल ८
१९६०	सितम्बर ५		सितम्बर २०	मार्च १३		मार्च २७
१९६१	अगस्त २६		अगस्त ११	मार्च २		फरवरी १५
१९६२			जुलाई ३१			फरवरी ५
१९६३	जुलाई ६		जुलाई २०	दिसम्बर ३०		जनवरी २५
१९६४	जून २५		{ जून १० } { जुलाई ६ }	दिसम्बर १९		{ जनवरी १४ } { दिसम्बर ४ }
१९६५	जून १४		मई ३०			नवम्बर २३
१९६६			मई २०			नवम्बर १२
१९६७	अप्रैल २४		मई ९	अक्टूबर १८		नवम्बर २
१९६८	अप्रैल १३		मार्च २८	अक्टूबर ६		सितम्बर २२

४.५ आच्छादनं संक्रमणञ्च

४.५१ आच्छादनम्

चन्द्रः पूर्वदिशां भ्रमन् प्रायेण देदीप्यमाननक्षत्राणां पुर आगच्छति, नक्षत्रं चाच्छादयति । एवंभूतो नक्षत्रलोप आच्छादनं कथ्यते । 'नाटिकल'पञ्चाङ्गे मुख्यानामाच्छादनानां गणनादयः पूर्वं दत्ता भवन्ति । सूर्यग्रहणवत् सर्वत्राच्छादनानि न दृश्यन्ते, विभिन्नस्थानेषु च विभिन्नकालेषु दृश्यन्ते ।



ज्योतिर्गणिते आच्छादनानि परममहत्त्वपूर्णानि । आच्छादनानां वेधैः (१) चन्द्रस्य विषुवांशा रेखांशाश्च, (२) पार्थिवरेखांशाः, (३) चन्द्रस्य कक्षावृत्तम्, (४) सूर्यलम्बनम्, (५) नक्षत्राणां ग्रहाणाञ्च विम्बव्यासाश्च सूक्ष्मातिसूक्ष्मं निर्णयन्ते ।

४.५२ बुधशुक्रयोः संक्रमणानि

ग्रहणवद् विद्यते एकोऽन्यो दृग्विषयः । साधारणतो लघुग्रहौ (बुधशुक्रौ) सूर्यविम्बस्य उपर्यधो वा कक्षायां भ्रमतः, कक्षाणमनत्वात् । परन्तु यदि पृथिवी तयोः क्रान्तिसम्पाते

विद्यते, तर्हि तौ सूर्यविम्बस्य संक्रमणं कुर्वन्तौ अवलोक्येते, अर्थात् तौ बिन्दुरूपेण गच्छन्तौ दृश्येते । इदं (चन्द्रकृतसूर्यग्रहणमिव) ग्रहणं नोच्यते, यतो बुधविम्बं शुक्रविम्बं वात्यल्पमितम्, न तेन सूर्याच्छादनं सम्भवम् । अत एव सूर्यमण्डले केवलं सूर्यव्यासस्य $\frac{1}{10}$ भाग-व्यासमितकमेकं श्यामवर्णं विम्बं तीव्रगत्या चलद् दृश्यते । (द्रष्टव्यं § ७०.१९ तमे दत्तं फोटोचित्रम्)

बुधसंक्रमणस्य शुक्रसंक्रमणस्य दिनाङ्का विवरणं च दास्यन्ते § ७०.१९ § ७०.२६ इत्यत्र ।

विशेषद्रष्टव्यानि

छायानिर्माणविषयका भौतिकशास्त्रनियमाः प्राचीनज्योतिर्विदां विदिता आसन्निति न कोऽपि सन्देहः । तैस्सुररीकृता गणनापद्धतिरेवात्र प्रत्यक्षं प्रमाणम् । अधो दीयते ग्रहणसिद्धान्त-वर्णनं भास्कराचार्यस्यैव शब्दैः—

“इदानीं ग्रहणे छाद्यच्छादकत्वं प्रतिपादयति । भूमा विधुग्रहणे विधुं छादयति (§ ४०.२१) रविग्रहणे तु रविं विधुश्छादयति (§ ४०.३१)..... अर्कादधश्चन्द्रकक्षा । यथा मेघोऽधःस्थः पश्चाद्भागादागत्य रविं छादयति । एवं चन्द्रोऽपि शीघ्रगतिवत्वात् पश्चाद्भागादागत्य रविं छादयति । ततः पश्चात् स्पर्शः (§ ४०.३१) ।

“चन्द्रो हि विमण्डले भ्रमति, क्रान्तिमण्डलस्य विमण्डलस्य च यः संपातस्तस्य पातसंज्ञा । स पातो मीनान्ताद्विलोमं गच्छति (§ ३०.७१)..... । रवेरग्रतो भार्धान्तरे क्रान्तिवृत्ते भूमा भ्रमति । अतः पौर्णमास्यन्ते भूमाचन्द्रौ समौ भवतः । किन्तु याम्योत्तरमन्तरं विक्षेपतुल्यं भवति । स विक्षेपश्छाद्याच्छादकविम्बमध्ययोरन्तरम् (§ ४०.४२) ।..... । यदा यावता मानैक्या-र्धादूर्ध्वं तावच्छाद्यविम्बे छादकविम्बं प्रविशति । अत उक्तं ‘तत् स्थगितप्रमाणम्’ इति । तत् स्थगितं छाद्यविम्बादधिकं यदा भवति तदा सर्वग्रहणं भवति (§ ४०.२२)” (सिद्धान्त-शिरोमणिस्थः—चन्द्रग्रहणाधिकारः, सूर्यग्रहणाधिकारः, गोलध्यायश्च) इति ।

तत्रैव भूमाव्यासमानादीन्यपि कृतानि ।

सूर्यग्रहण-चन्द्रग्रहण-तुलनापि तेन कृता—“चन्द्रग्रहे तु लम्बननत्योरभावः, यतः समकल-काले भूमा चन्द्रे लगति । तथा छन्नं सर्वे विदेशान्तरस्था अपि नतमपि तं चन्द्रं समं पश्यन्ति” इति ।

पञ्चमोऽध्यायः

सूर्यः

“सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च” [ऋ० स० १।११५।१]

[“सूर्यः कियद्दूरे वर्तते ? कियत्तस्य परिमाणम् ? कुतस्तस्य प्रकाशतापौ” इत्यादीन्यत्र व्याख्यायन्ते]

५.१ सूर्यस्य भुवो दूरत्वम्

सूर्यस्य दूरत्वमतिदीर्घं ९,२९,००,००० क्रोशार्धमितम् । अस्याभासमात्रमनेन कथनेन भविष्यति यद् यदि कोऽपि जनः प्रतिघटिकम् २४ क्रोशार्धानि रेल्यानेन गच्छेत् तर्हि प्रस्थानस्य १७५ वर्षानन्तरं स सूर्यतलं प्राप्नुयात् । जगति सर्वाधिकवेगशालिवस्तु प्रकाशरश्मयो विद्युदरश्मयो वा, ते प्रतिसेकिण्डं १,८६,००० क्रोशार्धानि गच्छन्ति, परन्तु तेऽपि सूर्यात् ८ $\frac{१}{३}$ मिनटैर्भुवमागच्छन्ति ।

५.११ दूरत्वनिर्धारणम्


चन्द्रदूरत्वनिर्धारणे यो लम्बनविधिव्याख्यातः स न सफलीभवति सूर्यदूरत्वनिर्धारणे, यतः प्रथमं सूर्ये न विद्यते कोऽप्यचलो बिन्दुः (अथवा किमपि स्थिरचिह्नं यथा चन्द्रे चन्द्रकलङ्कः) यस्माद् लम्बनं निश्चेतव्यम्, द्वितीयञ्च सूर्योऽतिदूरवर्ती, तस्य लम्बनोपलब्धये बृहत्याधाररेखापेक्ष्यते, पृथिव्या व्यासश्च नाभीष्टाधाररेखा । अत एव लम्बनमुपायान्तरेण माप्यते ।

ज्योतिर्विद्विर्लम्बनानयनविधौ भुवः समीपतमाः खगोलीयपिण्डा इष्टाः—ते च शुक्रभौमैरोसाः । शुक्रोऽन्तर्ग्रहः, अत एव लघुयुतः समीपतमो भवति, परन्तु तदा तस्य सूर्यकिरणेषु लोपो भवति, तस्य वेधश्च न सुकरो भवति । केवलं तस्य सूर्यबिम्बे संक्रमणानि किञ्चित् प्रयुज्यन्ते । भौमस्य बहिर्ग्रहत्वात् षड्भान्तरे समीपतमत्वाद् रात्रौ च दृष्टिगोचरत्वाद् वेधोऽतिसरलः । तृतीय एरोस-नामकोऽवान्तरग्रहः काले काले भुवोऽतिसमीपमागच्छति । एभिस्त्रिभिः सूर्यस्य दूरत्वं वेधेन ज्ञायते । सन्त्यप्रत्यक्षविधयोऽपि यैः दूरत्वं निश्चीयते । एषां मार्गच्युति-डाउण्डर-सिद्धान्त-गणनादयः प्रमुखाः ।

५.१२ शुक्रसंक्रमणविधिः

काले काले शुक्रः सूर्यबिम्बे संक्रमणानि कुर्वन् दृश्यते । (द्रष्टव्योऽनुच्छेदः ७.२६-तमो यत्र संक्रमणतिथयोऽपि दत्ताः) । ख्रिस्ताब्दे १७६१-तमे, ख्रिस्ताब्दे १७६९ तमे च शुक्रसंक्रमणं निरीक्ष्य सूर्यलम्बनं ८.५७ विकलमितं निश्चितम् । पुनः १८७४-तमे ख्रिस्ताब्दे, १८८२-तमे ख्रिस्ताब्दे च ज्योतिर्विद्विर्महान्तः प्रयत्नाः कृता यथार्थलम्बनानयनार्थम्, परन्तु कदाचित् शुक्र-वायुमण्डलवशाद् वेधेषु भिन्नतादृश्यत ।

संक्रमणकाले शुक्रो भुवः समीपतममागत्य लघुयुतौ तिष्ठति, दूरत्वञ्चास्य सूर्यदूरत्वसंज्ञांशमितं भवति । अत एव शुक्रसंक्रमणस्य ईषत्स्थानभ्रंशः पर्याप्तं लम्बनं सृजति । भुवः क स्थानात्



शुक्रसंक्रमण-विधिः

शुक्रः सूर्यस्य निम्नतरभागे (आ स्थाने) दृश्यते, भुवः ख-स्थानात् तस्मिन्नेव समये सूर्यस्य उच्चतरभागे (अ-स्थाने) दृश्यते । शुक्रस्य युतिकालो ज्ञात एव, भुवः शुक्रस्य दूरत्वस्य सूर्यदूरत्वापेक्षया निष्पत्तिः $\left(\frac{\text{भुवः शुक्रस्य दूरत्वम्}}{\text{भुवः सूर्यस्य दूरत्वम्}} \right)$ अपि विदितपूर्वैव, अत एव गणनया (विस्तर-भयादत्र गणना न दत्ता) सूर्यदूरत्वं निश्चीयते ।

५.१३ भौमदूरत्व-विधिः

'केप्लर'महोदयस्य तृतीयनियमेन ग्रहाणां परस्परदूरत्वनिष्पत्तिर्ज्ञायते । अत्र यद्येकस्यापि ग्रहस्य दूरत्वं ज्ञातं भवति, तर्हि सर्वेषां ग्रहाणां सूर्यस्य वा दूरत्वानि ज्ञातानि भविष्यन्ति । भौमस्य दूरत्वं सर्वानुकूलप्रतियोगकालेषु (§ ७.३१) चन्द्रदूरत्वानयनविधिना ज्ञायते । भौमदूरत्वप्राप्त्यनन्तरं सूर्यस्यापि दूरत्वं लभ्यते ।

५.१४ एरोसदूरत्वविधिः

भौमलम्बनानयन एका बाधा दृश्यते । भौमस्य त्रिभ्रवत्त्वाद् लम्बनकोणनिर्णयो दुष्करो भवति । अत एव ज्योतिर्विदो बहुकालात् कस्यचिद् अल्पत्रिभ्रवतो ग्रहस्यान्वेषणे रता आसन् । ख्रिस्तीये १८९८-तमे तैरेक ईदृशो लघुत्रिभ्रवान् ग्रहो लब्धः । सोऽन्तर्ग्रह 'एरोस' नामकः (द्रष्टव्यः § ७.४२) । 'एरोस'स्य व्यासः केवलं १५ कोशार्धमितः । परिक्रमणक्षया उत्केन्द्रिता पर्याप्ता, अत एव काले काले भुवः सर्वाधिकं सामीप्यं भजते । १९३१-तमे ख्रिस्ताब्दे एरोसः भुवः केवलं १,६२,००,००० कोशार्धदूर आसीत् । (अस्य सर्वाल्पतमदूरत्वं १,३८,४०,००० कोशार्धानि) । सर्वे ज्योतिर्विदो लम्बननिर्धारणार्थमवसरस्यास्य प्रतीक्षां कुर्वन्तो महायोजनानि व्यधुः । वेधेन गणनया च सूर्यस्य लम्बनं ८.७९ विक्रममितं निश्चितम् । अनेन सूर्यस्य दूरत्वं ९,३०,०९,००० कोशार्धमितं लभ्यते ।

५.१५ भूचलनसिद्धान्तेन (मार्गच्युतिसिद्धान्तेन)

भूचलनसिद्धान्तेन भुवः परिक्रमणमार्गे वेगो ज्ञायते । गणनयायं १८ $\frac{१}{२}$ कोशार्धानि प्रतिसेकण्डं प्राप्यते । वर्षे ३,१५,६०,००० सेकण्डानि भवन्ति, अत एव वर्षे पृथिवी

पञ्चमोऽध्यायः

६७

३,१५,६०,००० × १८ $\frac{३}{४}$ क्रोशार्धानि गच्छत्याकाशे । यदि परिक्रमणमार्गो गोलाकारः, परिधिमानञ्चेयन्मात्रकं (३१५६०००० × ३ $\frac{७}{४}$ क्रोशार्धानि), तर्हि व्यासार्धः कियन्मात्रक इति त्रैराशिकेन ज्ञायते । इदं व्यासार्धमानम् = ३१५६०००० × ३ $\frac{७}{४}$ × ३ $\frac{७}{४}$

$$= ३१५६०००० \times \frac{३७}{४} \times \frac{७}{४}$$

$$= ९२८८६८१८$$

$$= ९२९००००० \text{ (आसन्नमूल्येन)}$$

क्रोशार्धानि ।

व्यासार्धमानमिदं सूर्यस्य भुवो दूरत्वम् ।

५.१६ डाप्लरसिद्धान्तेन

नक्षत्रस्यापसरणेनोपसरणेन वा रश्मिविश्लेषणचित्रे विभिन्नानि परिवर्तनानि दृश्यन्ते । यथा यथा नक्षत्रं दृक्सूत्रेऽस्माकं समीपमागच्छति तथा तथा रश्मिविश्लेषणे (वर्णच्छत्रे रेखा नीललोहितोत्तरं प्रति विचलन्ति, यथा यथा च नक्षत्रमस्माद् दूरीभवति तथा तथा रेखा उपरक्तं प्रति विचलन्ति । अनेन 'डाप्लरसिद्धान्तेन' 'स्पेंसरजोन्स' महोदयेन भुवः प्रदक्षिणागतिः १८ $\frac{३}{४}$ क्रोशार्धानि प्रतिसेकिण्डं निर्धारिता, पूर्ववत् च गणनया सूर्यस्य भुवो दूरत्वं प्रायः ९,२९,००,००० क्रोशार्धानि प्राप्यते ।

५.२ परिमाणादयः

५.२१ सूर्यस्य परिमाणम्


सूर्यस्य दूरत्वमानं लब्ध्वा, तस्य परिमाणानयनं सुसरलम् । वेधेन सूर्यस्य मध्यमविम्बमानं ३१' ५९" अस्ति । दूरत्वञ्च ९,२९,००,००० क्रोशार्धानि । अत एव अनुच्छेदः..... तमे प्रयुक्तविधिना सूर्यव्यासस्य मानं ८,६४,००० क्रोशार्धानि लभ्यते ।

५.२२ सूर्यस्य पिण्डमात्रा, घनत्वम्, गुरुत्वाकर्षणञ्च

'न्यूटन' महोदयस्याकर्षणसिद्धान्तेन सूर्यस्य पिण्डमात्राया मानं निश्चीयते ।

'न्यूटन' नियमेन

$$\frac{\text{सौरपिण्डमात्रा}}{\text{पार्थिवपिण्डमात्रा}} \times \frac{\text{पार्थिवव्यासार्धः}}{\text{सौरव्यासार्धः}} = \frac{\text{सौरगुरुत्वाकर्षणशक्तिः}}{\text{पार्थिवगुरुत्वाकर्षणशक्तिः}}$$



सूर्यस्य विशालत्वम् ।

१. द्रष्टव्यो § ११-४१२ तमः ।


१३

अत्र सौरपिण्डमात्रां विहायान्ये विदितपूर्वाः, अत एव सौरपिण्डमात्रा गणनया पार्थिव-पिण्डमात्रामानस्य ३,३२,००० गुणिता (५×१०२८ मनमिता) प्राप्यते ।

सूर्यस्य घनत्वं पार्थिवघनत्वस्य $५\frac{३}{४}$ गुणितम्, जलघनत्वस्य च $१\frac{३}{४}$ गुणितमस्ति । गुरुत्वाकर्षणशक्तिश्च पार्थिवगुरुत्वाकर्षणशक्तेः २७.९ गुणितास्ति ।

५.२३ अक्षभ्रमम्

सूर्योऽप्यक्षभ्रमणं करोतीति सूर्यलाञ्छनानां सूर्यबिम्बे चलनेन सिद्धयते । सूर्यलाञ्छनानि पश्चिमतः पूर्वं प्रति गच्छन्ति । यदि किमपि लाञ्छनमद्य सूर्यबिम्बमध्ये दृश्यते, तदेव




सप्ताहानन्तरं पूर्वबिम्बकोटिं लप्स्यते, ततः पश्चानन्तरमपरकोटौ प्रथमं दृश्यमानः सप्ताहानन्तरं पुनर्मध्यभागमागमिष्यति । एवमक्षभ्रमणकालस्यासन्नमानं २५ दिनानि लभ्यते ।

पञ्चमोऽध्यायः

६६

परन्तु सूर्य पृष्ठे सर्वत्राक्षभ्रमणकालः समो न, विषुवप्रदेशानां २४-६५ दिनानि, ३५-अक्षांशवर्तिभागानां २७ दिनानि, ध्रुवीयप्रदेशानाञ्च ३४ दिनान्यक्षभ्रमणकालो दृश्यते । वर्णच्छत्रे डायलरनियमगणितरेखाविचलनैरपि प्रायस्तदेवाक्षभ्रमणकालमानं लभ्यते ।

सूर्यस्य विषुवरेखायाः क्रान्तिसूत्रात् प्रवणता सतांशमिता, अत एव लाञ्छनानि कदाचिद्



विभिन्नकालेषु विभिन्नकोणैर्दृश्यते सूर्यः

ऋतुमार्गेण, कदाचिच्च दीर्घवृत्ताकारमार्गेण भ्रमन्ति दृश्यन्ते । जूनमासस्य ६-दिनाङ्के दिसम्बर-मासस्य च ६-दिनाङ्के तानि ऋतुरेखायां भ्रमन्ति । मार्चमासस्य प्रथमदिनाङ्के, सितम्बरमासस्य च पञ्चदशदिनाङ्के तानि दीर्घवृत्ताकारमार्गेण भ्रमन्ति, इत्युपरिदत्तचित्रेण स्पष्टीभवति ।

५.३ सूर्यविधानम्

सूर्योऽत्युष्णवाष्पाणां विशालपिण्डोऽस्ति । वर्णनसौकर्यार्थमस्य पञ्चाङ्गानि क्रियन्ते—
(१) सूर्यमध्यभागः, (२) प्रकाशमण्डलम्, (३) प्रत्यादर्शकस्तरः, (४) वर्णमण्डलम्, (५) प्रभामण्डलञ्च ।

सूर्यमध्यभागो दृष्टपृष्ठदधो वर्तते । विवरणमस्य केवलं सैद्धान्तिकगणनया सम्भवम् । अस्य केन्द्रे तापक्रमः २,००,००,००० सेन्टीग्रेडमितो वर्तते । परमाणवः सर्वे छिन्नभिन्नरूपेण विद्यन्ते ।

प्रकाशमण्डलं दृश्यभागाः । अत्र कणचिह्नानि, श्यामवर्णसूर्यलाञ्छनानि च दृश्यन्ते । अंस्योपरि पारदर्शकवाष्पाणि वायुमण्डलरूपेण तिष्ठन्ति ।

प्रत्यादर्शकस्तरः प्रकाशमण्डलस्योपरि कतिपयशतक्रोशार्धोच्छ्रयपर्यन्तं विद्यते । अस्मात् स्तरात् सूर्यवर्णच्छत्रे श्यामा रेखा उत्पद्यन्ते ।

वर्णमण्डलं प्रत्यादर्शकस्तरस्योपरि वर्तते । शोणितवर्णकमिदं नैकसहस्रक्रोशार्धोच्छ्रयपर्यन्तं विद्यते । अस्मादुन्नतज्वालाशिखराण्युद्गच्छन्ति, यानि पूर्णसूर्यग्रहण एव (विशेषयन्त्रेणान्यदा वा) दृश्यन्ते ।


प्रभामण्डलं सूर्यस्य बहिस्तमो भागः । पूर्णसूर्यग्रहणेऽस्या मुक्ताशुक्लत्वमत्यन्तं शोभनीयं दृश्यते । प्रभामण्डलीयन्त्रेण ('कोरोनोग्राफ' यन्त्रेण) अन्यदापीदं दृश्यतां याति ।

५.३१ प्रकाशमण्डलम्

सूर्यस्य यो गोलकारो भागोऽस्माभिर्दृश्यते स प्रकाशमण्डलमुच्यते । अयं सूर्यपृष्ठं सूर्यतलं वापि कथ्यते । अस्योपरि पारदर्शकवाष्पाणि सूर्यवायुमण्डलरूपेण तिष्ठन्ति, अस्माच्चाधो नास्मद्दृष्टिः प्रविशति । अस्माद् भागाद् मुख्यतया सूर्यप्रकाश उद्गच्छति, अनेनायं भागः प्रकाशमण्डलं प्रोच्यते । प्रकाशमण्डलमिदं शतक्रोशार्धाल्पविस्तीर्णम् । अस्य पर्यन्तप्रदेशेषु प्रकाशे किञ्चिन्मान्यं रक्तवर्णकत्वञ्च दृश्यते ।

५.३११ कणचिह्नानि

दूरदर्शकेन सूर्यस्य प्रकाशमण्डलं पूर्णतया श्वेतौज्ज्वल्यवन्न दृश्यते, यत्र तत्र श्यामलकणचिह्नानि श्यामलज्वाञ्छनानि च वर्तन्ते । एतानि कणचिह्नानि वस्तुतोऽत्युष्णप्रदेशाः सन्ति । एषां तापक्रमः सामान्यपृष्ठतापक्रमात् शतसेन्टीग्रेडाधिको वर्तते । प्रायः प्रत्येकं चिह्नं ७००-क्रोशार्धविस्तीर्णं गोलकारं दीर्घवृत्ताकारं वा दृश्यते । एषां जीवनमतिक्षणिकं जलबुद्बुदवत् प्रतीयते ।



प्रकाशमण्डले कणाः [यरकिज्ञ-वेधशाला]

५.३१२ सूर्यलाञ्छनानि


चन्द्रे कलङ्को वर्तत इति साधारणोऽनुभवो जनानाम्, परन्तु सूर्येऽपि लाञ्छनानि वर्तन्ते इत्यद्भुतो विषयः । परन्तु सूर्यलाञ्छनानि चन्द्रलाञ्छनानोव न स्थायीनि । एतानि नैकाकीनि दृश्यन्ते, सर्वदा समूहरूपेणैव लभ्यन्ते । यदि क्वचिदेकाकि लाञ्छनं दर्शनीयतां याति,

पञ्चमोऽध्यायः

१०१

तन्नूनमेव विनाशप्राप्तानां लाञ्छनानामवशेषमात्रम् । लाञ्छनसमूहे प्रायो द्वे विशाललाञ्छने, नैकानि लघुलाञ्छनानि विद्यन्ते । विशाललाञ्छनयोरेकमग्रे चलति द्वितीयञ्च सर्वेषां पश्चात्, अनयोरग्रचारि-पश्चचारिलाञ्छनयोर्मध्ये नैकानि लघुचिह्नानि चलन्ति ।

लाञ्छनानां परिमाणमत्यधिकमपि दृश्यते । एकस्मिन् लाञ्छने विंशति-पञ्चविंशति-संख्याकाः पृथिव्योऽपि प्रवेष्टुं योग्या भवन्ति (द्रष्टव्यं फोटोचित्रे लाञ्छनतुलनायां पृथिव्याः परिमाणम् ।) अचिरात् पूर्वं १५४६-तमे ख्रिस्ताब्दे जनवरीमासस्य २९ दिनाङ्के दृष्टस्यैकस्य लाञ्छनस्य परिमाणं लम्बत्वदिशायां १०,००० क्रोशार्धानि, वितानदिशायाञ्च ६०,००० क्रोशा-



सूर्यलाञ्छनानि

धान्यासीत् । यस्मिन् समूहे लाञ्छनमिदमविद्यत, तस्य लम्बत्वं २,००,००० क्रोशार्धान्यासीत् । १९४७-तमे ख्रिस्ताब्दे दृष्टस्य लाञ्छनसमूहस्यापि परिमाणमीदृशमासीत् ।


लाञ्छनानि प्रायो गोलाकाराणि । तेषां श्यामवर्णका मध्यभागाः प्रच्छायप्रदेशाः कथ्यन्ते । प्रच्छायप्रदेशान् परितः किञ्चिद् ईषत् श्यामला उपच्छायप्रदेशा वर्तन्ते । प्रायः कतिपयानां प्रच्छायप्रदेशानामेकैवोपच्छाया दृश्यते । यदा कदाप्युपच्छायां परितो वलयाकारप्रदेशा अवलोक्यन्ते, ये प्रकाशमण्डलादप्युज्ज्वलतराः । अत्रेदमवधारणीयं यदेतानि लाञ्छनानि प्रकाशमण्डलभूमिकायां श्यामलानि दृश्यन्ते, वस्तुतस्तान्यद्यावधिसृष्टकृत्रिमप्रकाशसाधनेभ्योऽत्यधिकमुष्णानि प्रकाशमानानि च सन्ति ।

लाञ्छनानि क्षणिकान्येव । कतिपयानां जीवनं केवलं द्वित्रदिनानि, कतिपयानामेकमासं मासद्वयं वा (अर्थात् तान्येकवारं द्विवारं वा पूर्णपरिक्रमणं कुर्वन्ति), परन्तु प्रायस्तेषां जीवनं

त्रिचतुर्मासाधिकं न । लोपक्रमस्तु—प्रथममग्रचारिविशाललाञ्छन-पश्चचारिविशाललाञ्छन-मध्यवर्तिलघुलाञ्छनानि, ततः पश्चचारिविशाललाञ्छनभङ्गजनितलघुलाञ्छनानि, ततोऽन्ते अग्र-चारिविशाललाञ्छनमित्येवं लुप्यन्ते । लाञ्छनानि शीघ्रगत्या वर्धन्ते, मन्दगत्या च लुप्यन्ते ।

५.३१३ सूर्यलाञ्छनचक्रम्

कस्मिंश्चिद् वर्षे लाञ्छनानां संख्या त्वेतावत्यधिका भवति यत् सर्वदा सूर्यप्रकाशमण्डले नैके लाञ्छनसमूहा दर्शने लभ्यन्ते, कस्मिंश्चिद् वर्षे चैतावत्यल्पा भवति यत् कतिपयानि दिवसान्येकमपि लाञ्छनमदर्शयित्वा व्यतीतानि भवन्ति । विज्ञानविद्भिरेषां वार्षिकी गणना कृता, तथा च क्रम एको लब्धः—प्रायः ११.२ वर्षानन्तरं लाञ्छनानां सर्वाधिका बहुलता दृश्यते । इदं सूर्यलाञ्छनचक्रं कथ्यते । निम्नं दीयते सूर्यलाञ्छनसंख्याया रेखाचित्रं येन सूर्यलाञ्छन-चक्रस्य सत्ता समर्थ्यते—



५.३१४ सूर्यलाञ्छनस्य वर्णचक्रम्

सूर्यलाञ्छनस्य वर्णचक्रं सूर्यवर्णचक्राद् भिन्नं दृश्यते । वर्णचक्रविश्लेषणेन निष्कर्षद्वयं लभ्यते—(१) सूर्यलाञ्छनानां तापक्रमः प्रकाशमण्डलतापक्रमाद् निम्नः । $४३००^{\circ}K$ —पर्यन्तं एषां तापः । (२) सूर्यलाञ्छनेषु चुम्बकीयक्षेत्राणि वर्तन्ते ।


५.३१५ सूर्यलाञ्छनानां चुम्बकीयक्षेत्रवत्त्वम्

‘जीमन’महोदयेन वर्णचक्राणां परीक्षणेन ज्ञातं यत् सकलचुम्बकीयक्षेत्रोलङ्घयितुं प्रकाश-किरणानां वर्णचक्रे रेखा द्विधा त्रिधा वा भिन्ना भवन्ति, अर्थाद् ऊर्ध्वधरतस्तासु रेखासु

पञ्चमोऽध्यायः

१०३

दन्तुरत्वमायाति । रेखाणां दन्तुरत्वस्य गणनया चुम्बकीयक्षेत्रस्य व्यवस्था ज्ञायते । सूर्यविषुवरेखा-



'जीमन'-रेखादन्तुरत्वम्

वर्तिसूर्यलाञ्छनानां वर्णच्छत्रेषु दन्तुरत्वमीदृशं दृश्यते, अत एव सूर्यलाञ्छनानां चुम्बकीयक्षेत्रवत्त्वं सिध्यते (उपरि दत्तं वर्णच्छत्रस्य फोटोचित्रं द्रष्टव्यम्) ।

सूर्यलाञ्छनानां चुम्बकीयक्षेत्रवत्त्वं निम्नलिखिततथैरपि सिध्यते—

(१) सूर्यलाञ्छनदर्शनैः सह पार्थिवचुम्बकीयविक्षोभा दृश्यन्ते । सूर्यलाञ्छनानां दर्शनेन सह पार्थिवचुम्बकीयविक्षोभाणां सम्बन्धो 'माउण्डर'महोदयेन सुस्थापितः ।

(अ) यदि सूर्यलाञ्छनानां संख्या विपुला, विक्षोभाणां संख्यापि विपुला, यद्यल्पा तर्हि विक्षोभाणां संख्याप्यल्पा ।


(आ) पार्थिवविक्षोभाणामावृत्तिकालः २७.३ दिनानि, सूर्यलाञ्छनानामपि युत्तिकालः २७.३ दिनानि ।

(इ) सूर्यलाञ्छनस्य प्रथमदर्शनस्य ३० होरानन्तरं विक्षोभा भवन्ति । अत एव सूर्याद् विक्षोभजनिताः सूर्यलाञ्छनसहोदरा विद्युत्कणा अनन्ताकाशमुलङ्घय भूवायुमण्डलं ३० होरायां प्राप्नुवन्तीति प्रतीयते ।

(ई) चुम्बकीयविक्षोभा अधिकतरं वसन्तसम्पाते शारदसम्पाते च भवन्ति, वसन्तसम्पाते शरत्सम्पाते च पृथिव्या लम्बसूत्रे सूर्यस्य विषुवरेखावर्तिप्रदेशाः सन्ति (द्रष्टव्यं §-५-२३ तमे दत्तं चित्रम्), तत्र च सूर्यलाञ्छनेषु चुम्बकक्षेत्राणि लभ्यन्ते ।

(२) सूर्यलाञ्छनदर्शनसमकाले आयणमण्डले परिवर्तनानि दृश्यन्ते । § २-५१ तमे व्याख्यातं यत् पृथिव्या वायुमण्डलस्योच्चतमः स्तर आयणमण्डलमस्ति । आयणमण्डलस्यापि द्वौ स्तरौ—E-स्तरः, F-स्तरश्च । E-स्तरस्योच्छ्रयः ६० क्रोशार्धमितः । अत्र आक्सीजन-बाष्पस्य व्यूहाणवो भिन्ना भवन्ति (अर्थात्तेषां विद्युत्कणा आयणाश्च स्वच्छन्दा भवन्ति), F-स्तरस्योच्छ्रयः १३० क्रोशार्धमितः, अत्र आक्सीजनबाष्पस्य परमाणवो नाइट्रोजनबाष्पस्य व्यूहाणवश्च भिन्ना भवन्ति । उच्चतरङ्गदैर्घ्यवन्तो रेडियोतरङ्गाः २०० क्रोशार्धोच्छ्रयात् ३०० क्रोशार्धोच्छ्रयाद्वा प्रत्यावर्तन्ते । सूर्यलाञ्छनदर्शनेन सहायणमण्डले घनत्ववृद्धिर्दृश्यते, घनत्व-वृद्ध्या रेडियोतरङ्गा इष्टोच्छ्रयं न गच्छन्ति, निम्नोच्छ्रयादेव परावर्तनाद् भूमण्डले सुदूरं न गच्छन्ति, दूरवर्तिरेडियोयन्त्रेषु ध्वनिविषयेऽस्पष्टता आयाति ।

(३) उत्तरीयध्रुवसमीपवर्तिदेशेषु 'अरोरा' (ध्रुवप्रकाशः) दृश्यते । ध्रुवप्रकाशदर्शन-
मपि सूर्यलाञ्छनसमकालिकमेव । ध्रुवप्रकाश आकाशे रात्रौ दृष्टः प्रकाशविशेषः । अयञ्चाकाशे
नृत्यन् नवानि रूपाणि च धारयन् दर्शनेऽद्भुतो भवति । (अधो दीयेते द्वे फोटोचित्रे
ध्रुवप्रकाशस्य)—




ध्रुवप्रकाशचित्रे

५.३२ वर्णमण्डलम्

सूर्यस्य प्रकाशमण्डलं सूर्यपृष्ठं सूर्यतलं वापि कथ्यते । अस्योपरि पारदर्शकवाष्पाणि सूर्य-
वायुमण्डलरूपेण तिष्ठन्ति, अस्माच्चाधो नास्मद्दृष्टिः प्रविशति । अस्योपरि प्रत्यादर्शक-
स्तरो विद्यते, प्रत्यादर्शकस्तरस्योपरि च वर्णमण्डलं विद्यते, यस्योपस्थितेः सूर्यस्य रक्तवर्णकोन्नत-
ज्वालाशिखराणि दृश्यन्ते ।

५.३२१ वर्णच्छत्रं सूर्यस्य

सर्वप्रथमं १६९५ ख्रिस्ताब्दे न्यूटनमहोदयेन त्रिपार्श्वमध्यगतसूर्यकिरणानामिन्द्रधनुर्वद्
वर्णच्छत्रमदृश्यत । ततः शतकैकानन्तरं १८०२-तमे ख्रिस्ताब्दे 'बुल्स्टन'महोदयेन दृष्टं यद्
यदि किरणा एकं संकीर्णविवरमतीत्य त्रिपार्श्वमुलङ्घयन्ति तर्हि सौरवर्णच्छत्रे वर्णमेलनायां
श्यामरेखा दृश्यन्ते । परन्तु सर्वप्रथममासां रेखाणां नामकरणं स्थानादिनिर्णयञ्च 'फ्राउनहौफर'-
महोदय एव कृतवान् । एता रेखास्तन्नामानुसारं 'फ्राउनहौफर-रेखाः' कथ्यन्ते ।




फ्राउनहौफर-रेखाः

पञ्चमोऽध्यायः

१०५

एता रेखाः सूर्यवायुमण्डलवर्तिवाष्पाणामुपस्थितेर्भवन्तीति हेतुः 'फ्राउनहौफर' महोदयस्या-
ज्ञात आसीत् । एवं निम्नसारिण्याः प्रथमस्तम्भश्च द्वितीयस्तम्भश्च 'फ्राउनहौफर' महोदयेन



सूर्यवर्णचलनम्

दत्तौ, तृतीयश्चतुर्थश्चाधुनिकविज्ञानविदामेव कर्म । तृतीयस्तम्भे रेखाणां तरङ्गदैर्घ्यं दत्तम्,
चतुर्थ च रेखाणां हेतुः ।

फ्राउनहौफर-वर्णम्	तरङ्गदैर्घ्यम्	स्वरूपम्	अभिज्ञानम्
A	७५९४	मेखला	वायुमण्डले आक्सीजनम्
a	७२३०	मेखला	वायुमण्डले जलीयवाष्पम्
B	६८६७	मेखला	वायुमण्डले आक्सीजनम्
C	६५६३	रक्तवर्णे रेखा	सूर्यस्थहाइड्रोजनम् (H α)
D	५८९३	पीतवर्णे द्विकरेखाः	सूर्यस्थसोडियमम्
E	५२७०	नैका रचना रेखाः	लौहं कैल्शियमम्
b	५१८४	हरिद्वर्णे रेखाः	मैग्नेसियमम्
F	४८६१	नीलहरिद्वर्णे रेखा	सूर्यस्थहाइड्रोजनम् (H B)
G	४३०८	नील-नीललोहिते रेखाः	कार्बन-हाइड्रोजनयौगिकाः
H	३९६९	नीललोहिते रेखा	कैल्शियमम् (आयणीकृतम्)
K	३९३४	" "	" "

५.३२२ सूर्यस्य रासायनिकतत्त्वानि

रसायनशास्त्रे ९६ संख्याकानि तत्त्वानि प्रसिद्धानि । एषां ६१ संख्याकानि सूर्ये
निर्विवादतया अभिज्ञातानि, पञ्चानामुपस्थितिश्च सम्भवा वर्तते । तथापि परीक्षणविधेः परिष्कारेण
सर्वाणि तत्त्वानि सूर्ये द्रक्ष्यन्त इति सम्भवमेव ।

५.३२३ सूर्यरश्मिविश्लेषकयन्त्रम्


सूर्येष्टे कानि कानि तत्त्वानि, कियन्मात्रया च वर्तन्त इति निश्चयः सूर्यरश्मिविश्लेषक-
यन्त्रेण क्रियते । दूरदर्शकप्राप्तसूर्यविम्बस्याभीष्टाः किरणाः संकीर्णविवरमतीत्य त्रिपाश्वर्मुल्लङ्घ्य

१. तरङ्गदैर्घ्यमित्सूचकप्रमाणकेण माप्यते । प्रमाणकस्यास्य नाम 'एंग्स्ट्राम' अस्ति ।

एंग्स्ट्रामः १००००००००० सेन्टीमीटरसमः ।

चैकस्मिन् पटले पतन्ति । तस्मिन्नेव पटले युगपत् सूर्यवर्णच्छत्रस्य दृष्टतत्त्वस्य रेखाऽपि संकीर्ण-
विवरमुल्लङ्घ्य पतति । एवं तत्त्वविशेषस्य प्रकाशकिरणेषु सूर्यस्य फोटोचित्रं गृह्यते । अत्र नील-
लोहितोत्तरवर्णस्य कैल्शियम-(K) रेखा, रक्तवर्णस्य हाइड्रोजनरेखा ($H\alpha$) वा प्रायः प्रयुज्यते ।

सूर्यरश्मिविश्लेषकगृहीतफोटोचित्रे वर्णमण्डले श्वेतचिह्नानि श्यामचिह्नानि च दृश्यन्ते ।
एतानि चिह्नानि आंग्लभाषायां *floculi*-नाम्ना प्रसिद्धानि । उष्णतरवाष्पाणां पिण्डाः श्वेतचिह्नैः,
शीततरवाष्पाणां पिण्डाश्च श्यामचिह्नैः फोटोचित्रे प्रदर्शिता भवन्ति । 'कैल्शियम'चिह्नानि प्रायः
उज्ज्वलानि लाञ्छनसमूहानां समीपे दृश्यन्ते । अधः कैल्शियमरेखायां गृहीतं सूर्यस्य फोटोचित्रम्,
एकं साधारणं फोटोचित्रं चेत्युभे दत्ते ।




रश्मिविश्लेषकगृहीतचित्रम्

साधारणफोटोचित्रम्

[माउण्टविल्सन-वेधशाला]

५.३२४ सौरलोलज्वालाः

सूर्यलाञ्छनसमूहस्य प्रारम्भिकावस्थायां तस्य समीपे भयङ्करा लोलज्वाला दृश्यन्ते ।



साधारणफोटोचित्रम्

हाइड्रोजनफोटोचित्रे

पञ्चमोऽध्यायः

१०७

सूर्यरश्मिविश्लेषकयुक्तदूरदर्शके एता वर्णमण्डलेऽत्यन्तमुज्ज्वलाः प्रदेशाः प्रतीयन्ते । एता अकस्मात् सरमसमुत्पतन्ति, होरैककाले च शान्ता भवन्ति । लोलज्वालास्तीव्रान् नीललोहितोत्तरकिरणान् विकिरन्ति, एते किरणाश्च ५.३१५ तमेऽनुच्छेदे वर्णितान् रेडियोविघ्नादीन् कुर्वन्ति ।

५.३२५ सूर्योन्नतज्वालाशिखराणि

हाइड्रोजनसूर्यरश्मिविश्लेषकगृहीतफोटोचित्रे प्रायः श्यामवर्णकानि दीर्घाणि चिह्नानि



सूर्योन्नतज्वालाशिखरम् (१)



सूर्योन्नतज्वालाशिखरम् (२)


१०८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

दृश्यन्ते, यानि सूर्यस्याक्षभ्रमणात् सूर्यत्रिभ्रसामीप्यं प्राप्याकाशस्य भूमिकायामुज्ज्वलानि सन्ति । एतानि सूर्योन्नतज्वालाशिखराणि कथ्यन्ते । एतानि शोणितवर्णकानि पूर्णसूर्यग्रहणेऽतिसुन्दरं प्रतीयन्ते । [अद्युना 'कोरोना-ग्राफ' यन्त्रेणान्यदापि दृश्यन्ते (यन्त्रस्य विवरणार्थं द्रष्टव्यः §)] एषां फोटोचित्रद्वयं १०७ पृष्ठे द्रष्टव्यम् ।

एषां विविधा भेदाः, विविधानि रूपाणि च दृश्यन्ते । 'माउण्टविल्सन' वेधशालाया-
मेतानि षड्वर्गेषु स्थापितानि—

- (१) सक्रियाणि सूर्योन्नतज्वालाशिखराणि सामान्यतया दृश्यन्ते ।
- (२) उत्क्षेपात्मकानि ,, विरलतया दृश्यन्ते ।
- (३) सूर्यलाञ्छनविषयकाणि ,, सूर्यलाञ्छनेन सम्बद्धानि सन्ति ।



सूर्योन्नतज्वालाशिखराणि

[माउण्टविल्सन-वेधशाला]

पञ्चमोऽध्यायः


१०६

(४) घूर्णप्रभञ्जनानि	„	घूर्ण्यमानस्तम्भा इव दृश्यन्ते ।
(५) निष्क्रियाणि	„	पूर्णतया शान्तानि दृश्यन्ते ।
(६) प्रभामण्डलीयानि	„	क्षणिकानि प्रभामण्डले दृश्यन्ते ।

५.३३ प्रभामण्डलम्

सूर्यस्य बाह्यतममतिविरलमावरणं प्रभामण्डलं कथ्यते । अस्य सूर्यग्रष्टादुच्छ्रयः कतिपय-
लक्षक्रोशमितः, तथाप्यल्पप्रकाशवत्त्वाद् दर्शनमस्य दुर्लभम् । प्रकाशोऽस्य पूर्णचन्द्रप्रकाशादपि
न्यूनः, अत एव सूर्यप्रकाशे सदैवादृश्यो वर्तते । केवलं पूर्णसूर्यग्रहणे (कोरोनाग्राफयन्त्रेण
त्वन्यदापि) स्वसौन्दर्यं विवृणोति । अस्यान्तर्भागः पीतवर्णकः, बहिर्भागश्च मुक्तावत् शुक्लः ।

प्रभामण्डलस्य बहिर्भागः सूर्यलाञ्छनस्य एकादशवर्षीयचक्रे विभिन्नरूपाणि प्रदर्शयति ।



यदा सूर्यलाञ्छनानां संख्या महत्तमा वर्तते तदा कमलदलमण्डलवद् दृश्यते (द्रष्टव्यमत्रत्यं
फोटोचित्रम्) ।

परन्तु सूर्यलाञ्छनानामल्पतमसंख्याकाले ध्रुवप्रदेशयोर्वहिर्भागो निम्नः, विषुवप्रदेशेषु च केतुवदिदं निःसृतं भवति (द्रष्टव्यमधः स्थापितं फोटोचित्रम्) ।



५४ सूर्यस्य प्रकाशस्तापश्च

५.४१ प्रकाशचिकिरणम्

सूर्यस्य भास्वरत्वकोटिः (f.u.) — २६.७२ — मित्ता । अर्थात् प्रथमकोटिकनक्षत्रभास्वरत्वापेक्षया १,२२,१८,००,००,००० गुणकमस्य भास्वरत्वम् । अयं ५,००,००० पूर्णचन्द्रवत्, ९००,००० शुक्रवच्चाभाति । सूर्यस्य प्रत्येकस्माद् वर्गैकसेन्टीमीटरमितक्षेत्रात् ५०,००० दीपशिखानां प्रकाश इव प्रकाशो निस्सरति ।

५.४२ तापविकिरणम्

सूर्यः सततं महाकाशे तापं विकिरति । अस्य विकीर्णतापस्य लघुभाग एव पृथिव्या ग्रहैर्वा गृह्यते, शेषभागो महाकाशे विलीयते । पृथिव्यागतभागस्यापि भूयिष्ठोऽंशो वायुमण्डलेन शोष्यते, अल्पभाग एव भूपृष्ठमागच्छति, तथापि वयं सूर्यतापस्य प्रखरत्वं ग्रीष्मे भृशमनुभवामः । अस्य भूपृष्ठागततापस्य मात्रानिर्धारणमतिदुष्करम् । तापमात्रागणनार्थं सौरस्थिराङ्को निश्चीयते ।

५.४२१ सौरस्थिराङ्कः

सौरस्थिराङ्कः सूर्यतापस्य सा मात्रा ('कैलोरी'-प्रमाणकेन) या वर्गैकसेंटीमीटरमितभू-पृष्ठभागेन मिनटैककाले लभ्यते; यदि (१) सूर्यकिरणा ऋजुतया पतेयुः, (२) वायुमण्डलं न विद्येत, (३) पृथिवी च सूर्याद् मध्यमदूरत्वे स्यात् । स्थिराङ्कनिर्णये विद्येते द्वे प्रक्रिये—प्रथमया वर्गैकसेंटीमीटरमितभूपृष्ठभागलब्धतापमात्रा माप्यते, द्वितीयया च वायुमण्डलकृततापशोषणं माप्यते ।

प्रथमा प्रक्रियैवम्—दृश्यन्ते कतिपये पदार्थाः, ये तापं पूर्णतया शोषयन्ति । तापशोषणात्तेषु तापो जायते, स च तापमापकयन्त्रेण माप्यते, अनेन च तापविकिरणमात्रा निश्चीयते । अत्र 'पेरिहेलियोमीटर'नामकं यन्त्रं विशेषतया तापविकिरणमात्रामापने समर्थं रचितं ज्योतिर्विद्भिः ।


द्वितीया प्रक्रियैवम्—तापमात्रा दिवसस्य विभिन्नकाले माप्यते । वायुमण्डलोल्लङ्घनं सूर्योदये सूर्यास्ते च सर्वाधिकम्, मध्याह्ने चाल्पतमम्; अत एव विभिन्नकालीन-लब्धतापमात्रा-गणनया तुलनात्मकविधिना वायुमण्डलोल्लङ्घनजनिततापशोषणं स्पष्टीभवति । अत्र 'डैग्ली'महोदयेन सर्वाधिकसूक्ष्मतया परीक्षणानि कृतानि; विशेषतः स्वरचितेन 'स्पेक्ट्रोवोलोमीटर'यन्त्रेण १४,८८७ फिटोच्छ्रयशालि-'माउण्ट-ह्विगनी'पर्वतशृङ्गे वायुमण्डलकृततापशोषणनिश्चयो विहितः ।

एवं द्वाभ्यां प्रक्रियाभ्यां निर्णीतः सौरस्थिराङ्कः १.०३ 'कैलोरी'मितो लभ्यते ।

५.४२२ सूर्ये तापविकिरणमात्रा

सूर्यकेन्द्राद् भूकेन्द्रस्य दूरत्वं ९, २९,००,००० क्रोशार्धानि । भूपृष्ठे यदि वर्गैकसेंटी-मीटरमितक्षेत्रे प्रतिमिनटं १.०३ 'कैलोरी'-मितस्त(पलाभः), तर्हि सूर्यपृष्ठे वर्गैकसेंटीमीटरमितभागे प्रतिमिनटं कियानिति गणितेनैवं गण्यते ।

सूर्यस्य व्यासार्धः ४,३२,००० क्रोशार्धमितः, अत एव सूर्यपृष्ठस्य सूर्यकेन्द्राद् दूरत्वं



४३२,००० क्रोशार्धानि । सूर्यकेन्द्रात् पृथिवीपृष्ठस्य दूरत्वं प्रायः ९,२९,००,००० क्रोशार्धानि । यतश्च पृष्ठविस्तारो व्यासार्धावर्गपेक्षी, अत एव

$$\frac{\text{क}}{\text{एकं सेंटीमीटरम्}} = \frac{(\text{अ}_1)^2}{(\text{अ}_2)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{अर्थात् क} &= \frac{(४३२०००)^2}{(९३००००००)^2} \\ &= \frac{१}{४६०००} \quad (\text{आसन्नमानं}) \text{ वर्गसेंटीमीटराणि,} \end{aligned}$$

$$\text{यतः क-वर्गसेंटीमीटरं सूर्यपृष्ठे} = १ \text{ वर्गसेंटीमीटरं भूपृष्ठे}$$

$$\begin{aligned} \text{अतः एव क-वर्गसेंटीमीटरेषु सूर्यपृष्ठे तापः} &= \text{भूपृष्ठस्य वर्गैकसेंटीमीटरे तापलाभः} \\ &= १.९३ \text{ कैलोरीमितः} \end{aligned}$$

$$\text{अत एव १-वर्ग सेंटीमीटरे सूर्यपृष्ठे तापः} = \frac{१.९३}{\text{क}} \text{ कैलोरीमितः}$$

$$= १.९३ \times ४६०००$$

$$= ८९००० \text{ 'कैलोरी'मितः प्रतिमिनटम्}$$

$$= ९ \text{ अश्वबलसमशक्तिः}$$

एवं सम्पूर्णात् सूर्यपृष्ठात् प्रतिसेकिण्डं ५×१०^{२३} अश्वबलसमशक्तिर्विकीर्यते । अस्य महातापविकिरणस्य केवलं $\frac{१}{२,२०,००,००,०००}$ अंशो भूपृष्ठेन लभ्यते, तथापि लाभोऽयं $५०,००,०००$ अश्वबलशक्तिसमः प्रतिवर्गक्रोशार्धे प्रतिमिनटम् । अस्याः सूर्यतापशक्तेर्नियन्त्रणाय

पञ्चमोऽध्यायः

११३

विज्ञानविद्विहरनेके प्रयत्नाः कृताः, परन्तु केवलं लघुकार्यसञ्चालनमेव सूर्यतापशक्त्या अद्यपर्यन्तं कृतम् ।^१

५.४३ सूर्यस्य तापक्रमः

तापविकिरणनियमैः पदार्थस्य तापविकिरणं लब्ध्वा तापक्रमस्य मापनं नातिदुष्करम् । नियमानां विवरणबोधाय भौतिकशास्त्रस्य पर्याप्तं ज्ञानस्यापेक्षा वर्तते, तथापि किञ्चिन्मात्रं प्रदर्श्यते—

(१) स्टेफेन-नियमः । अत्र सूत्रं निम्नलिखितमस्ति—

$$\text{तापशक्तिः} = ५.६७२ \times १०^{-५} \times (\text{तापक्रमः})^४$$

[तापक्रमो निरपेक्षमापके] $\times$

अनेन यदि पदार्थस्य तापक्रमो द्विगुणीभवति, तापशक्तिश्च १६ गुणिता भवति ।

(२) वीन-नियमः । यदि महत्तमतापविकिरणे तरङ्गदैर्घ्यं y अस्ति, तर्हि

$$y = \frac{०.२८९७}{\text{तापक्रमः}} \quad (\text{निरपेक्षमापके})$$

(३) प्लेन्क-नियमः । अत्र कस्मिंश्चिदपि तापक्रमे, कस्मिंश्चिदपि च तरङ्गदैर्घ्ये तापविकिरणमापनं शक्यम् । (सूत्रमतिदुर्बोधत्वाद्वा न दत्तम्)

सूर्यतापक्रम एभिर्नियमैर्माप्यते । स्टेफेन-नियमेन $५९८०^{\circ} \text{ K}^{\circ}$ मितः^२, वीननियमेन ६१००° K -मितः, प्लेन्कनियमेन च ६००° K -मितोऽस्ति । तापक्रमोऽयं विम्बमध्यभागे लभ्यते, परन्तु विभिन्नभागेषु विभिन्नास्तापक्रमा लभ्यन्ते (सर्वेषां मध्यमानं ५७५०° K -मितमस्ति) । वर्णमण्डलस्य निम्नभागे ४५००° K -मितः, प्रभामण्डले ३०००° K -मितः, सूर्यलाञ्छनस्य प्रच्छाद्यभागे च ४६००° K -मितः तापक्रमा भवन्ति । सूर्यकेन्द्रस्य तापक्रमो महत्तमः $२०,००,०००^{\circ} \text{ K}$ -मितः ।

५.४४ तापविकिरणस्य समस्या

सूर्यः कोटिसहस्रकालतः प्रतिसेकिण्डं ५×१०^{२३} अश्वबलसमशक्तिं विकिरति, अत एव प्रश्नोऽयं स्वाभाविको यत् कुतः स लभते शक्तिम् ? अत्र द्वे मते प्रश्नस्यास्योत्तरं दत्तः—

(१) परमाणूनां गर्भे महती शक्तिर्निहितास्ति । 'साइक्लोट्रोन' यन्त्रेणाल्पमात्रायाम्, परमाणु'व्रम'पातेन चात्यधिकमात्रायामीदृशो शक्तिर्लभ्यते । परन्तु सूर्यपृष्ठे तापाधिक्याद्

१. द्रष्टव्या 'धर्मयुग'नामपत्रिका १९५६ तमे ख्रिस्ताब्दे १-फरवरीमासस्य, यत्र नैकानि चित्राणि दत्तानि सूर्यतापनियन्त्रणस्य ।

२. K -चिह्नं निरपेक्षतापमापकविधौ स्थाप्यते । निरपेक्षतापप्रमापकलब्धतापक्रमे २७३° संयुज्य सेन्टीग्रेडप्रमापके तापक्रमो लभ्यते । अर्थात् उदाहरणार्थं $१५^{\circ} \text{ K} = १५ \times २७३ = २८८०^{\circ} \text{ सेन्टीग्रेडम्} ।$

निरन्तरं परमाणुभङ्गाः स्वतो भवन्ति, असीमिता च शक्तिः प्रतिसेकिण्डं निस्सरति । सूर्यं हाइड्रोजनवाष्पं पर्याप्तमात्रया लभ्यते । हाइड्रोजनपरमाणवो हेलियमपरमाणवो भवन्ति, अत्यधिकाश्च शक्तिं जनयन्ति ।^१

(२) भौतिकशास्त्रे पिण्डमात्रा शक्तिश्च पर्यायवाचिनौ शब्दौ । अत एव शक्तिविकिरणात् पिण्डमात्राहानिरवश्यम्भाविनी । सापेक्षवादेन गण्यते यत् 'ग्राम'-एकमितपिण्डमात्राया हानेः २,२०,००,००,००,००,०००-कैलोरीमितशक्तिर्निस्सरति । अनेन नियमेन प्रति सेकिण्डं ४,००,००,००,००० 'टन'मितपिण्डमात्राहानिर्भवति । अनुपातोऽयं दृश्यते भयावहः, परन्तु अनेनैवानुपातेन १०,००,००,००,००,००० वर्षेषु ७% पिण्डमात्राया हानिर्भवति ।

१. साधारणतया गुरुभारकाणां परमाणूनां भङ्गेन महती शक्तिर्निस्सरति, यथा यूरेनियम-परमाणु-बम । परन्तु हाइड्रोजनविषये विपरीता प्रक्रिया दृश्यते । हाइड्रोजन-परमाणुः परमलघुभारकः । यदिः स परमाणुसंयोजनेन हेलियम-परमाणुर्भवति, तर्हि तस्मान् संयोजनप्रक्रियायां शक्तिर्निस्सरति—यथा हाइड्रोजन-‘बम’पाते ।

षष्ठोऽध्यायः

ग्रहाः

(ग्रहविषयकसिद्धान्ताः)

['किमस्मत्पृथिव्येव सूर्यं परिक्रामति, अन्येऽपि वा पिण्डाः' इति जिज्ञासयातिप्राचीन-ज्योतिर्विदस्तादृशान् पञ्च अब्राधुः । तेषां तादृक्षाणाञ्चात्र सामान्यं वर्णनम् ।]

६.१ ग्रहनक्षत्रयोर्भेदः

निशायां यावदाकाशस्यावलोकनं क्रियते, तावत्तत्र नीलाम्बरे रत्नानीव नैकप्रकाशविन्दवो दृश्यन्ते । प्राकृतजनैस्ते नक्षत्राणीत्युच्यन्ते, परन्तु न ते तथा । सर्वे प्रकाशविन्दवो नक्षत्राणि न । नक्षत्राणां मध्ये ग्रहा अपि वर्तन्ते, ये सामान्यतया नक्षत्रपुञ्जानां मध्ये स्थानपरिवर्तनेन स्वग्रहत्वं सूचयन्ति । ज्योतिर्विद्भिर्निर्मे भेदका ग्रहनक्षत्रयोः प्राप्ताः—

(१) सर्वप्रथमन्तु ग्रहाश्चलाः प्रकाशविन्दवः (आंग्लभाषायां ग्रहेभ्यो यः Planet शब्दः प्रयुज्यते, तस्य व्युत्पत्त्यर्थः 'चलः' एव), नक्षत्राणि चाचलानि । यद्यद्य कोऽपि ग्रहो मेघराशौ दृश्यते, कालान्तरे स एव वृषराशौ भविष्यति, अर्थाद् ग्रहस्य विषुवांशाः क्रान्त्यंशाश्च चलाः । नक्षत्राणि सदैवैकस्मिन्नेव राशौ तिष्ठन्ति, तेषां विषुवांशाः क्रान्त्यंशाश्च स्थिराः ।

(२) नक्षत्राणि सूर्य इव स्वतन्त्रपिण्डाः, तानि प्रायेण सूर्यसमानि सूर्याद् दीर्घतराणि वा । ग्रहाः सूर्यमण्डलस्याङ्गरूपाः, सूर्याद् अल्पपरिमाणकाः, सूर्याधीनाश्च; सूर्यं परितः परि-भ्रमणशीलत्वात् ।

(३) नक्षत्राणि निजौज्ज्वल्येन प्रकाशतां यान्ति, तानि सूर्य इव प्रकाशरूपाणि । ग्रहाश्च चन्द्र इव प्रकाशहीनपिण्डाः । तेषामुपरि ये सूर्यग्रहमयः पतन्ति, ते एव तान् अस्मान् प्रदर्शयन्ति ।

(४) ग्रहाणां प्रकाशः स्थिरौज्ज्वल्येन भाति, परन्तु नक्षत्राणि कम्पप्रभया प्रकाशन्ते ।

(५) दूरदर्शकयन्त्रेण ग्रहाणां किञ्चिच्चक्राकारबिम्बं दृश्यते, परन्तु नक्षत्राणि महाभि-वर्धनशक्तिकैर्दूरदर्शकयन्त्रैरपि केवलं देदीप्यमानविन्दव इव दृश्यन्ते ।

(६) नक्षत्राणि सूर्य इव ज्वलनशीलपिण्डाः, ग्रहास्तु चन्द्र इव उष्णत्वहीना अतिशीतलाः (शनिगुरु प्रायेण हिममयावेव) । तेषु यस्तापक्रमो लभ्यते तस्य कारणं सा तापशक्तिरेव, या सूर्यात् तैः प्राप्ता ।

६.२ ग्रहाणां संख्या

सौरपरिवारे सन्ति सदस्यरूपेण ग्रहाः, तेषामुपग्रहाः, धूमकेतव उल्कापिण्डाश्च । एषां मध्ये ग्रहा मुख्याः प्राचीनकालतः स्वीकृतसत्ताकाः । यूरोपदेशेषु प्राचीनकाले मध्ययुगे च ते

सप्तसंख्याका आसन् । तदा 'भूः स्थिरा' इति सर्वेषां सम्मतिरासीत् । अत एव सा ग्रहेभ्यो व्यतिरिक्तैव गणिता ज्योतिर्विद्भिः । सूर्यचन्द्रौ तदा ग्रहाणां मध्ये गणितावास्ताम् । अन्ये च ग्रहा बुधशुक्रभौमगुरुशनय आसन् । भारतीयानामप्येवमेव गणनासीत् ।

कापनिकसमहोदयेन भुवः सूर्यमभितो भ्रमणं प्रतिपादितम्, सूर्यश्च केन्द्रे स्थापितः । ततो भुवो ग्रहत्वं चन्द्रस्य च तस्योपग्रहत्वं निश्चितम् । तदाप्रभृति बुधशुक्रभौमगुरुशनयो ग्रहा इति प्रसिद्धिः ।

खिस्ताब्दे १७८१-तमे शनिकक्षाबहिः स्थित एको नूतनग्रह उपलब्धो 'हर्शल' महोदयेन । तस्य नाम 'हर्शलः' अथवा 'युरेनसः' अस्ति । देववाण्यां वरुणनाम्नोपज्ञातोऽयम् । तदनन्तरं खिस्ताब्दे १८४६-तमे 'लेविरिए' महोदयेन वरुणकक्षाबहिःस्थितोऽन्यो ग्रहो दृष्टः, तस्य नाम च 'नेपच्यून' कृतम् । गीर्वाणवाण्यामयमिन्द्रनाम्ना प्रसिद्धः । अचिरात्पूर्वमेव खिस्ताब्दे १९३०-तमे 'लॉवेल' महोदयेन 'प्लूटो' ग्रह इन्द्रकक्षाया बहिरुपलब्धः, संस्कृतभाषायां स एव 'कुवेर' नाम्ना प्रथितः । एवमधुना नवसंख्याका ग्रहाः—बुधशुक्रभौमगुरुशन-वरुणेन्द्रकुबेराः ।

६.२१ ग्रहाणां संक्षिप्तं सामान्यवर्णनम्

बुधः—यदा कदा सान्ध्यालोके दृश्यते क्षितिजस्य समीपे प्रातःकाले पूर्वदिशि, सायंकाले च पश्चिमदिशि ।

शुक्रः—अतिभासुरो ग्रहोऽयं दिवापि कदाचिद् नेत्रगोचरतां याति । सामान्यतया प्रातःकाले पूर्वक्षितिजे, सायंकालेऽपरक्षितिजे चालोक्यते ।

भौमः—रक्तवर्णेनोपलक्ष्यते । भुवः समीपेऽतिभासुरः ।

गुरुः—आकारे भारे च बृहत्तमो ग्रहः, अतिभासुरश्च ।

शनिः—सुदूरवर्तितात् शनैः शनैश्चरति ।

वरुणः—सुदूरवर्ती षष्ठकोटिकनक्षत्रतुल्यः केवलं तीक्ष्णदृष्टिकेन जनेन दृश्यते ।

इन्द्रकुबेरौ—दूरदर्शकयन्त्रेणैव दर्शनीयतां भजेते ।

६.३ ग्रहाणां वर्गीकरणम्

सन्ति नैके प्रयासा ज्योतिर्विदां ग्रहवर्गीकरणविषये । प्रमुखवर्गीकरणानि दीयन्तेऽधः—

(१) लघुग्रहाः, प्रधानग्रहाश्च । बुधशुक्रौ लघुग्रहौ, भौमगुरुशनिवरुणेन्द्रकुबेराः प्रधानग्रहाः । लघुग्रहाणां कक्षा भूकक्षान्तर्गता, प्रधानग्रहाणां कक्षा च भूकक्षाबहिर्गता । अत एव लघुग्रहाणां दैनन्दिनी गतिः पृथिव्यपेक्षया शीघ्रा, प्रधानग्रहाणां मन्दा ।

१. भारतीयकलितज्योतिर्विद्यायां यो नवग्रहाणामुल्लेखस्तस्मिन् सूर्यचन्द्रबुधशुक्रभौम-गुरुशनयः सराहुकेतुकाः सन्ति ।

(२) अन्तर्ग्रहाः, बहिर्ग्रहाः । बुधशुक्रभौमा अन्तर्ग्रहाः, गुरुशनिवरुणेन्द्रकुबेरा बहिर्ग्रहाः । अन्तर्ग्रहा भुवो लघीयांसः, बहिर्ग्रहाश्च गरीयांसः । अन्तर्ग्रहा अवान्तरग्रहाणामेकस्मिन् पक्षे, बहिर्ग्रहाश्चापरे पक्षे ।

(३) पार्थिवग्रहाः, मुख्यग्रहाः । बुधशुक्रभौमकुबेराः पार्थिवग्रहा भुवोऽल्पीयांसः, मुख्यग्रहा भुवो महीयांसः ।

६.३१ प्रमुखग्रहाणां परिक्रमणे सामान्यम्

यदि तिष्ठेत् कोऽपि जनः सौरपरिवाराद् बहिः कस्मिन्नपि नक्षत्रे, पश्येत् स सौरपरिवारस्य प्रमुखग्रहाणां परिक्रमणे नियमविशेषान् ।

(१) तेषां कक्षाः प्रायेण वृत्ताकाराः । यद्यपि सर्वेषां ग्रहाणां कक्षा दीर्घवृत्ताकारा, तथापि तेषामुत्केन्द्रिताऽत्यल्पमिता, आकाराश्चात एव वृत्ताकाराः । केवलं कुबेरबुधयो-रुत्केन्द्रिता पर्याप्ता ।

(२) तेषां कक्षाः प्रायेणैकस्मिन्नेव तले, अर्थात् समतले एव सर्वे ग्रहा भ्रमन्ति । कुबेरं विहाय सर्वे राशिके एव भ्रमन्ति, अर्थात् तेषां कक्षाणमनमष्टांशाल्पमेव ।

(३) ते सर्वे पश्चिमतः पूर्वं भ्रमन्ति । पश्चिमतः पूर्वगमनमृजुगतिः कथ्यते ।

६.४ ग्रहाणां सूर्याद् दूरत्वम्

सौरपरिवारस्य केन्द्रे सूर्यः सर्वेषां ग्रहाणां परिचालक इव तिष्ठति । सर्वे ग्रहा गुरुत्वाकर्षण-रूपरज्ज्वा सूर्यं परितो भ्रमन्ति विभिन्नदूरत्वे । सूर्याद् ग्रहस्य दूरत्वं मन्दकर्णः कथ्यते । कक्षाया दीर्घवृत्ताकारत्वाद् मन्दकर्णो न सदा समः । सर्वमन्दकर्णानां मध्यममानं तस्य ग्रहस्य मध्यमकर्ण उच्यते । सामान्यपदावल्यां सूर्याद् मध्यमदूरत्वं मध्यमकर्णः ।

‘बोडे’नियमः^१

सूर्यस्य समीपतमो ग्रहो बुधः, तदनन्तरं शुक्रभौमगुरुशनिवरुणेन्द्रा उत्तरोत्तरं दूरतराः, कुबेरश्च दूरतमो ग्रहः । एषां दूरत्वकण्ठस्थीकरणाय (कण्ठस्थीकरणसौकर्याय) ‘बोडे’-महोदयेन ख्रिस्ताब्दे १७७२-तम एकं सूत्रं निर्धारितम् । तेन दूरत्वक्रमानुसारं शनिपर्यन्तं ग्रहा लिखिताः^२, पुनस्तेषामधस्तात् ०, ३, ६, १२ अंकाः (अत्र ३, ६, १२ आदयो गुणोत्तरश्रेण्यां सन्ति) लिखितव्याः । तेषु ४ मितं संकलय्य दशभिर्विभज्य दूरत्वं लभ्यते । अत्र पृथिव्याः सूर्याद् दूरत्वमेकमितम् । तेनैवानुपातेनान्येषां ग्रहाणां दूरत्वं ज्ञेयम् । अग्रे ‘बोडे’नियमेन दूरत्वक्रमो दीयते, अन्तिमपङ्क्त्यां द्वितीयदशमलवस्थानपर्यन्तं वास्तविकमध्यमकर्णा दत्ताः ।

१. अत्रेदं त्ववधारणीयं यद् बोडेनियमः कठस्थीकरणाय रचितं सूत्रमात्रम् ।


२. यदा ‘बोडे’महोदयेन सूत्रं निर्धारितं तदा शनिपर्यन्तमेव ग्रहा विदिता आसन् ।

बुधः	शुक्रः	भूः	भौमः	—	गुरुः	शनिः
०	३	६	१२	२४	४८	९६
४	४	४	४	४	४	४
४	७	१०	१६	२८	५२	१००
बोडेनियमेन दूरत्वम् ४	७	१००	१०६	२०८	५०२	१०००
वास्तविकदूरत्वम् ३९	७२	१०००	१०५२		५०२०	९५४

यदा बोडेमहोदये-
नेदं सूत्रं रचितं तदासीत्
तस्मिन् एकोऽपवादः ।
भौमगुरुमध्यान्तरे २.८
मितस्थाने नासीत् कश्चिद्
ग्रहः । ख्रिस्ताब्दे १७८१-
तमे संवत्सरे वरुणोपलब्धे-
रनन्तरं बोडे-नियमस्या-
तिप्रसिद्धिर्जाता, यद् नूतन-
ग्रहोऽयं शनिकक्षावहिः-
स्थितोऽपि 'बोडे'नियमा-
गते १९.६ मिते स्थान
एव दृष्टः । अत एव २.८
मितस्थाने ज्योतिर्विज्ञि-
रेको महान् प्रयत्नः कृतः ।
प्रयत्नश्च सफलोऽभवत् ।
ख्रिस्ताब्दे १८०१-तमे
यदा 'पिआजी' महोदयेना-
कस्मात्तत्रको ग्रहो
दृष्टः । तस्य ग्रहस्य नाम
'सेरेस' कृतम् । पश्चाद्
अत्र सहस्राधिका लघुग्रहाः
प्राप्ताः, ते सर्वे त्ववान्तर-
ग्रहनाम्ना प्रसिद्धाः ।

इदन्त्ववधारणीयं यद्
बोडे-नियमो न सफलत्वं
मुपयाति इन्द्रकुवेर-
दूरत्वयोः, बुधशुक्रयोर्मध्ये
च न वर्तते द्वित्वम् ।

सौरमण्डलम्



षष्ठोऽध्यायः

११६

६.५१ भगणकालः (परिक्रमणकालः)

ग्रहेण भमण्डलपरिभ्रमणे किंवा सूर्ये परितः पूर्णपरिभ्रमणे यः कालोऽतिक्रम्यते, स तस्य भगणकालः परिक्रमणकालो वा । भगणकाल एव नाक्षत्रकालो ग्रहस्य । भगणकालः कक्षादैर्घ्याधीनः । यदि कक्षावृत्तं लघु, भगणकालोऽपि लघुः । यदि कक्षावृत्तं बृहत्, भगणकालोऽपि दीर्घः । भगणकाल-मध्यमदूरत्व-सम्बन्धः केपलरस्य आकर्षणशास्त्रीयतृतीयनियमेन नियतः । तेन नियमेन

$$\frac{(\text{ग्रहस्य मध्यमदूरत्वं})^3}{(\text{ग्रहस्य परिक्रमणकालः})^2} = \text{स्थिरः राशिः ।}$$

बुधस्य परिक्रमणकालः सर्वाधिकल्पकालिकः । बुधः ८८ दिनान्येव सूर्ये परितो भ्रमति । कुवेरस्य भगणकालः सर्वाधिकदीर्घकालिकः, स प्रायः २४८ वर्षेषु सूर्यस्य परिक्रमणं करोति ।

६.५२ युतिकालः

यद्यत्र कोऽपि ग्रहो (यथा भौमः) भूपृष्ठस्थपुरुषेण सूर्यस्य षड्भान्तरे वेधेन दृश्यते, तदा यावत्कालानन्तरं (भौमः) ग्रहः पुनर्भूपृष्ठस्थपुरुषेण षड्भान्तरे दृश्यते, तावत्कालावधिः (ग्रहस्य भौमस्य) युतिकाल उच्यते । एवं युतिकालः सूर्यग्रहयुत्यन्तरम् ।

युतिकालो ग्रहस्य भुवश्च भगणकालाधीनः । युतिकालानयने निम्ननियमः—

$$\begin{aligned} \text{प्रधानग्रहयुतिकालानयनम्} &= \frac{1}{\text{ग्रहयुतिकालः}} = \frac{1}{\text{भूपरिक्रमणकालः}} - \frac{1}{\text{ग्रहपरिक्रमणकालः}} \\ \text{लघुग्रहयुतिकालानयनम्} &= \frac{1}{\text{ग्रहयुतिकालः}} = \frac{1}{\text{ग्रहपरिक्रमणकालः}} - \frac{1}{\text{भूपरिक्रमणकालः}} \end{aligned}$$


६.६१ लघुग्रहाणां दृष्टिः कलाश्च

लघुग्रहाणां चन्द्रस्येव कलानां वृद्धिक्षयौ स्तः । वृद्धिक्षयप्रक्रिया ग्रहस्य इनान्तर-परिवर्तनाज्जायते । इनान्तरं भूपृष्ठस्थपुरुषस्य विभिन्नकाले ग्रहदृक्सूत्र-सूर्यदृक्सूत्र-कल्पितकोणः, अर्थात् सूर्य-भू-ग्रह-कोणः । चित्रे सू-भू-ग्र_५ ग्रहस्य ग्र_५ अवस्थायामिनान्तरम् ।

लघुग्रहाणां परिक्रमणकालो वर्षाद् (भूभगणकालाद्) अल्पः, अत एव ते भुवोऽपेक्षया शीघ्रगामिनः, सूर्यस्थानात् कदाचित्पूर्वं, कदाचित् पश्चिमे दृश्यन्ते ।

दृष्टिः

यदा लघुग्रहः सूर्यभुवोर्मध्य आपतति तदा लघुयुतिः कथ्यते । यदा सूर्यो लघुग्रहभुवोर्मध्य आपतति तदा प्रधानयुतिः कथ्यते । इनान्तरं सूर्यभूरेखया ग्रहभूरेखया समुत्पन्नः कोणः, अस्य



लघु ग दृश्य दृष्टि

६६२ प्रधानग्रहाणां दृष्टिः कलाश्च

प्रधानग्रहाणां परिक्रमणकालो वर्षाधिकः, अत एव ते सूर्यपेक्षया आकाशे पूर्वदिशि मन्दतरं भ्रमन्त इव दृश्यन्ते। भूश्च काले काले तानतिक्रामति। तेषामिनान्तरं लघु-ग्रहाणामिव न सीमितम्, प्रत्युत तस्य मानं शून्यात् षड्भर्षयन्तं लभ्यते।


दृष्टिः

यदा भूः सूर्यग्रहयोर्मध्य आपतति तदा षड्भान्तरं (प्रतियोगः) भवति। यदा सूर्यो भूग्रहयोर्मध्ये पतति तदा युतिः कथ्यते। यदा कोणः सूर्य-भू-ग्रहः समकोणमितस्तदा त्रिभान्तरं (वृत्त-पादः) उच्यते।

महत्तमं मानं परमेणान्तरम्।
परमेणान्तरे कोणः सूर्य-भू=९०°।
शुक्रस्य परमेणान्तरं ४८°, बुधस्य २८° मितमस्ति।

कलाः

लघुयुतौ लघुग्रहो न दृश्यते, तत्र तस्य अमावस्या-लघुग्रहस्य अप्रकाशितभागस्य अस्माकं सम्मुखवर्तित्वात्। प्रधानयुतौ लघुग्रहः पूर्णतो दृश्यते, तत्र तस्य पूर्णाः कलाः-पूर्णप्रकाशितभागस्य अस्माकं सम्मुखवर्तित्वात्। परमेणान्तरे चाष्टमीशकलं दृश्यते। लघुयुति-परमेणान्तरमध्ये सशृङ्ग-कलां वहति ग्रहः, परमेणान्तर-प्रधानयुतिमध्ये एकादशी कलां भजते ग्रहः।



प्रधान ग दृश्य दृष्टिः, कलाश्च।

$$१ \text{ परमेणान्तरमेवं निश्चीयते-परमेणान्तरम्} = \frac{\text{ग्रहस्य महत्तममन्दकर्णः}}{\text{भुजोऽल्पतमो मन्दकर्णः}}$$

षष्ठोऽध्यायः

१२१

कलाः


पङ्मान्तरे युतौ च ग्रहस्य पूर्णकलाः, पूर्णप्रकाशितभागस्य भूसम्मुखत्वात् । त्रिभान्तरे किञ्चित् कलाक्षयः, तथापि त्रयोदशीकलावद् दृश्यते ग्रहः । अयं कलाक्षयोऽपि केवलं भौमस्य, अन्येषां तु सुदूरवर्तित्वात् सदैव पूर्णाः कला विद्यन्ते । अमा न विद्यते प्रधानग्रहाणाम् ।

६.७ ग्रहाणां गतिः


नक्षत्राणां भूमिकायां ग्रहाणां विचित्रा गतिर्दृश्यते । कदाचित्ते नक्षत्रमण्डलानां मध्ये पूर्वदिशं गच्छन्तो दृश्यन्ते, कदाचित् पश्चिमदिशं गच्छन्तः । कदाचिच्च ते स्थिरा इव प्रतिभान्ति । एवं तेषां गतित्रयम्—वक्रा, स्थिरा, ऋज्वी च ।

६.७१ ऋज्वी गतिः

यथा यथा भूमिजकक्षायां चिह्नाङ्कितदिशायां सूर्यं परितो भ्रमति, तथा तथा व्यत्यासेन सूर्यो विपरीतदिशायां भ्रमन्निव दृश्यते । सूर्य-भू-रेखा घटिकासूचिकाभ्रमणस्य प्रतिकूलदिशायां



भू-पक्षिक्रमणम्



ऋज्वीगतिः

घटिका-भ्रमणम्

भ्रमति, गतिश्च ऋज्वी गतिरुच्यते । अत एव ज्योतिर्विन्दिनिश्चितं यद् यदि ग्रह-भू-रेखा घटिका-सूचिका-प्रतिकूलभ्रमणं कुर्वन्ती प्रतीयते, तर्हि ग्रहस्य गतिः ऋज्वी; यदि च ग्रह-भू-रेखा घटिका-नुकूलभ्रमणं कुर्वन्ती प्रतीयते, तर्हि ग्रहस्य गतिर्वक्रा ।

ऋजुगत्यां क्षेत्रांशा उत्तरोत्तरं वृद्धिं लभन्ते, वक्रगत्याञ्च तेषां हासो दृश्यते ।



६.७२ लघुग्रहस्य चक्रगतेर्व्याख्या

लघुग्रहस्य (बुधस्य शुक्रस्य वा) कक्षावृत्तं भूकक्षावृत्ताद् लघुतरम्, अत एव तस्य गति-भुवो गतेर्द्व्युत्तरा । यदि लघुग्रहो बुधोऽथ लघुयुतौ स्थितः (प्रथमचित्रे त्वद्यतनीया स्थितिः 'भू' 'बु' अस्ति), बुध-भू-रेखा द्वितीयचित्रे भू बु अस्ति । श्वो भूः स्वकक्षायां भू १ स्थाने भविष्यति, बुधश्च बु १ स्थाने । बुधभूरेखा द्वितीयचित्रे बु १, भु, भविष्यति । शनैः शनैः भूः स्वकक्षायां भू २ भू ३ भू ४ भू ५ स्थानेषु भविष्यति, बुधश्च बु २ बु ३ बु ४ बु ५ स्थानेषु । बुध-भू-रेखा द्वितीयचित्रे बु २ भू, बु ३ भू, बु ४ भू, बु ५ भू भविष्यति । पूर्वानुच्छेदे वर्णितं यद् ग्रहगतेर्वक्रता ऋजुता वा आनुक्रमिकग्रहभूरेखाणां परिवर्तनस्य दिशया निश्चीयते । अत एव द्वितीयचित्रे लिखिता रेखैवास्माकं विचारविषयः । भूबु-भूबु १-रेखयोः भूबु १-रेखाया घटिकासूचिका-

१२२

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

नुकूलदिशायां परिवर्तनमस्ति, एवमेव भूबु_१-भूबु_२-रेखयोः भूबु_२-रेखायाः । अत एव ग्रहस्य गतिः बुबु_१-मध्ये बु_१-बु_२-मध्ये च वक्रा । भूबु_२-भूबु_३-रेखयोः भूबु_३-रेखाया घटिका-सूचिकाप्रतिकूलदिशायां परिवर्तनमस्ति, एवमेव भूबु_३-भूबु_४-रेखयोः भूबु_४-भूबु_५-रेखयोः क्रमशः भूबु_४-भूबु_५-रेखयोः । अत एव ग्रहस्य गतिः बु_२-बु_५ मध्ये ऋज्वी अस्ति ।




लगुग्रहस्य वक्रगतेर्व्याख्या


६.७२२ प्रधानग्रहस्य वक्रगतेर्व्याख्या

प्रधानग्रहस्य (भौमगुरुशन्यादीनां) कक्षावृत्तं भू-कक्षावृत्ताद् बृहत्तरम्, अत एव तस्य गतिर्भुवो गतेर्मन्दतरा । यदि भौमः प्रधानग्रहोऽयं प्रतियोगे स्थितः, प्रथमचित्रेऽद्यतनीया

प्रधानग्रहस्य वक्रगतेर्व्याख्या



भौमस्य प्रतीयमाना गतिः




स्थितिः क्रमशः 'भू' 'भौ' अस्ति, भौम भू-रेखा द्वितीयचित्रे भू भौ अस्ति । श्वो भूः स्वकक्षायां भू_१ स्थाने भविष्यति, भौमश्च भौ_१ स्थाने । भौम भू-रेखा द्वितीयचित्रे भौ_१ भू भविष्यति । शनैः शनैः भूः स्वकक्षायां भू_२ भू_३ भू_४ भू_५ स्थानेषु भविष्यति, भौमश्च भौ_२ भौ_३ भौ_४ भौ_५ स्थानेषु । भौम-भू-रेखा च द्वितीयचित्रे क्रमशः भौ_२ भू, भौ_३ भू, भौ_४ भू, भौ_५ भू भविष्यति । पूर्वानुच्छेदवद् द्वितीयचित्रे लिखिता रेखा एव विचार्याः । भूमौ-भूमौ_१-रेखयोः भू-भौ_१ रेखाया घटिकासूचिकानुकूलदिशायां परिवर्तनमस्ति, एवमेव भूमौ_१-भूमौ_२ रेखयोः भूमौ_२-रेखायाः । अत एव ग्रहस्य गतिः भौ भौ_१-मध्ये भौ_१ भौ_२-मध्ये च वक्रा । भूमौ_२ भूमौ_३-रेखयोः भूमौ_३-रेखा घटिकासूचिकाप्रतिकूलदिशायां परिवर्तनमस्ति, एवमेव भूमौ_३-भूमौ_४-रेखयोः, भूमौ_४ भूमौ_५-रेखयोः क्रमशः भू भौ_४-रेखायाः, भू_५ भौ-रेखायाः । अत एव ग्रहस्य गतिः भौ_२-भौ_५ मध्ये ऋज्वी अस्ति ।

६७२३ स्थिरबिन्दवः


प्रधानग्रहस्य

प्रधानग्रहस्य भ्रमणमधुना प्रधानयुतितो विचार्यते । प्रधानयुतेः पश्चाद् ग्रहो नक्षत्राणां भूमिकायां पूर्वदिशायां चलति, विषुवांशाश्चास्य क्रमशो वर्धन्ते । किञ्चित्कालानन्तरं वृत्तपादानन्तरं

ग्रहकक्षासु स्थिरबिन्दवः



क → रव नक्षत्राणि
क-रव-स्य स्थाने स्थिरबिन्दुः



तस्य प्रतीयमाना गतिर्मन्दा मन्दतरा च भवति । तत एकस्मिन् बिन्दुविशेषे गतिः शून्यमिता भवति, ग्रहश्च कतिपयदिवसैः स्थिरो दृश्यते । बिन्दुविशेषोऽयं 'स्थिरबिन्दु' इत्युच्यते । स्थिरबिन्दोः

पश्चाद् ग्रहो नक्षत्राणां भूमिकायां पश्चिमदिशायां चलति, विषुवांशाश्चास्य कमशो हीयन्ते । प्रतियोगे वक्रभ्रमणस्य मध्यं भवति । तत एकोऽन्यो त्रिन्दुरागच्छति यत्र वक्रगमनं समाप्तं भवति, ग्रहश्चाचलो दृश्यते । अयं त्रिन्दुरपि स्थिरत्रिन्दुरुच्यते (एवं ग्रहपरिक्रमणमार्गे एकस्मिन् युतिकाले द्वौ स्थिरत्रिन्दू भवतः) । ततो ग्रहः पूर्वदिशायां चलति, विषुवांशाश्च वर्धन्ते ।

लघुग्रहस्य


लघुग्रहस्य गतिः पूर्ववत् । प्रथमस्थिरत्रिन्दुः परमेणान्तरस्य पश्चाद् भवति । लघुयुतौ वक्रभ्रमणस्य मध्यं भवति । (द्रष्टव्यं १२३ पृष्ठस्थं चित्रम्) ।

६.८ ग्रहगतिविषयकसिद्धान्ताः

यूरोपीयदेशेष्वधुनिकसिद्धान्तस्य पूर्वमनेके सिद्धान्ताः काले काले प्रचलिता आसन् । ग्रहाः खगोले निजगत्यापि चलन्ति (नक्षत्राणि केवलं खगोलेन सह चलन्ति, खगोलश्च पूर्वतः पश्चिमं गच्छति) इति प्रत्यक्षमासीत् सर्वेषाम् । परं यदि तेषां भूकेन्द्रिकवृत्तेषु भ्रमणं स्वीकृतं स्यात्तर्हि तेषां वक्रगतिः (द्रष्टव्यः पूर्वानुच्छेदः) अव्याख्याता भवेत् । अत एव विभिन्न-ज्योतिर्विद्भिर्विभिन्नसिद्धान्तेन गतिर्व्याख्याता । अत्र 'टालेमी'सिद्धान्तोऽतिप्रसिद्ध आसीत् ।

६.८१ 'टालेमी'सिद्धान्तः

टालेमीमहोदयस्य मतं १४०-तमे ख्रिस्ताब्दे सर्वप्रथमं प्रचलितमभवत्, प्रायश्चतुर्दश-




टालेमी - सञ्चलन-सौरपरिवारः

षष्ठोऽध्यायः

१२५

शतकैः सम्मानित एवाभवत् । टालेमीमहोदयस्य मतेन पृथिवी ह्यचला, सूर्यादयस्तां परितो भ्रमन्ति । प्रत्येकं ग्रहस्य त्वेकं मध्यवृत्तमस्ति, परन्तु ग्रहो मध्यवृत्ते न भ्रमति । स एकस्मिन् वृत्ते (मन्दोच्चाख्ये) भ्रमति, वृत्तस्य केन्द्रञ्च मध्यवृत्ते भ्रमति । सूर्यचन्द्रयोर्मन्दोच्चं वृत्तं न वर्तते । शुक्रबुधयोरेव मध्यवृत्ते सूर्यस्य मध्यवृत्तान्तरवर्तिनी । तयोर्मन्दोच्चवृत्तकेन्द्रस्य परिभ्रमणकालः सूर्यपरिभ्रमणकालसमो वर्षैकमितः, परन्तु तयोर्मन्दोच्चकेन्द्रे एवं भ्रमतो यत् ते भूसूर्यरेखायां तिष्ठतः । भौमगुरुशनीनां मध्यवृत्तानि सूर्यस्य मध्यवृत्ताद् बहिः सन्ति, परं तेषां ग्रहमन्दोच्चकेन्द्र-रेखा सदैव सूर्यभूरेखायाः समानान्तरा वर्तते ।

‘टालेमी’महोदयस्य मन्दोच्चवृत्तप्रधानमतेन ग्रहाणां वक्रगतिः सफलतया व्याख्यायते (द्रष्टव्यमधश्चित्रम्) । यथा यथा ग्रहाणां वेधेषु यथार्थता आगच्छत्, तथा तथा ‘टालेमी’-मते न्यूनता दृष्टा, तथा तथा च शीघ्रोच्चवृत्तादीनां कल्पना कृता । अधुना मतमिदं पूर्णतोऽधः कृतमाकर्षणसिद्धान्तमूलकव्याख्याया ।



वक्रगतिव्याख्या

६.२२ केप्लरनियमः

अधुना त्विदं सुनिश्चितमेव यत् सौरमण्डले मध्यस्थाने सूर्यो वर्तते, सर्वे ग्रहाश्च तमभितो भ्रमन्ति । तेषां परिभ्रमणहेतुराकर्षणशक्तिरेव । (आकर्षणशक्तैः सर्वपरिचितमुदाहरणं भुवो गुरुत्वाकर्षणशक्तिरस्ति, यया आकृष्टाः सर्वे पिण्डा उच्चस्थानादधो निपतन्ति) । ग्रहा रज्जुकोटिबद्ध-पिण्डा इव भ्रमन्ति । रज्जुः मध्यमकर्णमेव ।

ग्रहगतिविषयकनियमनिर्धारणे सर्वाधिकः सफलः ‘केप्लर’महोदयः । स ‘टाइखोब्राहे’-महोदयस्य वेधन-फलानि गणितिकविश्लेषणैः संस्कृत्य त्रीन् महत्त्वपूर्णनियमान् प्रत्यपादयत् ।

(१) प्रथमो नियमः—ग्रहाणां कक्षा दीर्घवृत्ताकाराः, सूर्यश्च अन्यतरनाभौ तिष्ठति ।^१

(२) द्वितीयो नियमः—स्वकक्षायां ग्रहस्यैवं गतिर्यद् ग्रह-कक्षा-केन्द्र-रेखा समकाले समक्षेत्राण्याक्रामति ।


(३) तृतीयो नियमः—परिक्रमणकालवर्गमानं मध्यमकर्णस्य (सूर्याद् मध्यमदूरत्वस्य) घनमानस्यानुपाति । अर्थात्

$$\frac{(\text{परिक्रमणकालः})^2}{(\text{मध्यमदूरत्वम्})^3} = \text{स्थिरो राशिः}$$

६.८३ ग्रहकक्षावृत्तस्य तत्त्वानि

महाकाशे ग्रहस्य स्थितिं ज्ञातुं 'ग्रहकक्षाञ्च निश्चेतुं' सप्ततत्त्वानामावश्यकता दृश्यते । एतानि तत्त्वानि सचिह्नानि दीयन्तेऽधस्तात्—

- (१) कक्षावृत्तस्य बृहदक्षार्धस्य मानम् (बृहदक्षः = मध्यमकर्णः) 'a'
- (२) कक्षावृत्तस्य उत्केन्द्रिता 'e'
- (३) कक्षातलस्य क्रान्तिवृत्ताद् नमनम् (= कक्षाणमनम्) 'i'
- (४) उत्तरसंपातस्य भोगांशाः 'A'
- (५) नीचस्य भोगांशाः 'W'
- (६) कालविशेषस्य स्थितिः (ध्रुवकांशाः) 'T'
- (७) परिक्रमणकालः 'P' अथवा मध्यमगतिः 'n'



ग्रहकक्षातत्त्वानि


१. द्रष्टव्यः § यत्र दीर्घवृत्तचरणा दत्ता

षष्ठोऽध्यायः

१२७

एषु तत्त्वेषु मध्ये प्रथमद्वितीयाभ्यां कक्षावृत्तस्याकारः परिमाणञ्च निश्चीयेते, तृतीयचतुर्थाभ्यां कक्षातलं निश्चीयते, पञ्चमेन कक्षातले बृहदक्षस्य दिशा निश्चीयते । षष्ठसप्तमाभ्यां कक्षावृत्ते तात्कालिकस्थितिग्रहस्य लभ्यते ।

१९५६ तमस्य ख्रिस्ताब्दस्य जनवरीमासस्य प्रथमदिनाङ्के यानि ग्रहकक्षातत्त्वानि तावन्त्र दीयन्ते ।



सूर्यस्थ परिवर्माणम्

६.८४ ग्रहकक्षावृत्ततत्त्वानि

	मध्यमदूरत्वम् 'क्ष' (भू = १)	मध्यमगतिः 'म' (विकलाः)
बुधः	०.३८७०९९	१४७३२.४२०
शुक्रः	०.७२३३३२	५७६७.६७०
भूः	१.००००००	३५४८.१९३
मौमः	१.५२३६९१	१८८६.५१९
गुरुः	५.२०२८०३	२९९.१२८
शनिः	९.५३८८४३	१२०.४५५
वरुणः	१९.१८१९६२	४२.२३५

१२८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

इन्द्रः	३००५७७३१			२१.५३२		
कुवेरः	३९.५१७७४			१४.२८३		
	उत्केन्द्रिता ०	कक्षाणमनम् (परमशरः) i			उच्चभोगांशाः	
बुधः	०.२०५६२५७	७°	००'	१४.१"	७६°	४६' १५.१"
शुक्रः	०.००६७९४०	३	२३	३९.१	१३०	५७ ०७.३
भूः	०.०१६७२७६	—	—	—	१०२	११ ०१.४
भौमः	०.०९३३६४४	१	५०	५९.८	३३५	१४ ५६.६
गुरुः	०.०४८४२८८	१	१८	२०.१	१३	३६ ४९.६
शनिः	० ०५५६९५६	२	२९	२४.३	९२	११ ०९.९
वरुणः	०.०४७१९८५	०	४६	२२.९	१६९	५६ ४५.८
इन्द्रः	०.००८५७१७	१	४६	२६.८	४४	१४ २०.६
कुवेरः	०.२४८६४३८	१७	०८	३८.४	३२३	१० ३०.२
	ध्रुवकाः T				संपातस्य भोगांशाः A	
बुधः	३°	३९'	३१.७१	४७°	४८'	३५.०"
शुक्रः	३५३°	३१	३२.९५	७६	१७	०१.०
भूः	१००°	०७	३८.५३	—	—	—
भौमः	२१३	०५	५७.५२	४९	१३	०५.५
गुरुः	१३८	२२	४४.५१	१००	००	१४.२
शनिः	२३१	४३	५१.४०	११३	१६	२१.२
वरुणः	१२४	०६	३०.८९	७३	४६	३३.१
इन्द्रः	२०८	०८	४७.९५	१३१	१७	४४.६
कुवेरः	१३७	३८	०८.००	१०९	३८	००.२

विशेषद्रष्टव्यानि

§ ६.१—§ ६.२ नक्षत्राणां भूमिकायां ग्रहाणां चलनमेकं प्रत्यक्षं भेदकमासीत् । तेषां संख्या पञ्च आसीदिति कदाचिद् ऋग्वेदस्य निम्नदत्तया ऋचा सूच्यते—

अभी ये पञ्चोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो-दिवः ।

देवत्रा नु प्रवाच्यं सध्रीचीना नि वावृतुर्वित्तं मे अस्य रोदसी ॥ (१-१०५-१०)

गुरोर्नाम तु स्फुटतया दृश्यते ऋग्वेदे—

बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो मही ज्योतिषः परमे व्योमन् । (४-५०-४)

शुक्रस्य नामान्तरो 'वेन' इति शब्दो विद्यते निम्नायामृचि—

अयं वेनश्चोदयत्यृश्निगर्भी ज्योतिर्जरायू रजसो विमाने । (१०-१२३)

अथर्वज्योतिषे तु स्पष्टतया ग्रहाणामुल्लेखो दृश्यते—

आदित्यः सोमो भौमश्च तथा बुधबृहस्पती ।

भार्गवः शनैश्चरश्चैव एते सप्त दिनाधिपाः ॥

षष्ठोऽध्यायः

१२६

राहुकेत्वोस्तु प्रथमा गणना याज्ञवल्क्यस्मृतौ लभ्यते—

सूर्यः सोमो महीपुत्रः सोमपुत्रो बृहस्पतिः ।

शुक्रः शनैश्चरो राहुः केतुश्चैव ग्रहाः स्मृताः ॥

(आचाराध्याये)

एते नवसंख्याका ग्रहा अद्यापि पूर्ववद् गण्यन्ते ।

§ ६४, ६५, ६८ ग्रहाणां भगणकालाः, भुवो दूरत्वानि, गतिविषयकनियमाः सर्वेषु सिद्धान्तग्रन्थेषु पठिताः सन्ति । भारतीयाः प्राचीनकालिका ज्योतिर्विदो गतिविषयकसिद्धान्ताभिज्ञा आसन्निति न कोऽपि सन्देहः । सिद्धान्तैः स्वीकृता गणनापद्धतिः टालेमीमहोदयेन स्वीकृतायाः पद्धतैः पर्याप्तं भिन्नेति सुविदितमेव । सिद्धान्तशिरोमणिदत्तभगणकालादय आधुनिकज्योतिषशास्त्रपठित-भगणकालादिभ्यो न भिन्नाः (बुधभगणकाले ००००८% मितमन्तरम्, भौमभगणकाले शुक्रभगण-काले च ०००१% मितमन्तरम्, गुरुभगणकाले च ०००८% मितमन्तरम् मया गणितम्) चन्द्र-शेखरसामन्तगणितभगणकालादयस्त्वभिन्ना एव मन्तव्याः ।

§ ६७ ग्रहाणां वक्रगतिः, ऋजुगतिरित्यादयो विदिता आसन् । सूर्यसिद्धान्ते त्वष्टा गतिरुक्ता—

वक्रानुवक्रा कुटिला मन्दा मन्दतरा समा ।

तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणामष्टधा गतिः ॥

(सूर्यसिद्धान्तपूर्व०)

महाभारतकालेऽपि वक्रगतिर्ज्ञातासीत् यथा—

प्रत्यागत्य पुनर्जिष्णुर्जघ्ने संसप्तकान् बहून् ।

वक्रातिवक्रगमनादङ्गारक इव ग्रहः ॥

(कर्णपर्व अ० २०)

सप्तमोऽध्यायः

ग्रहाः

[पूर्वाध्यायवर्णितसौरमण्डलग्रहाणामत्र विस्तरतो वर्णनम्]

७.१ बुधः

सूर्यस्य समीपतमो ग्रहो बुधः पुरातनकालत्परिचित आसीद् ज्योतिर्विदाम् । कक्षावृत्तं चास्य लघुतमम्, दैनिकगतिश्चात एव सर्वाधिका ग्रहाणाम् । परिमाणविषये मुख्यग्रहाणामयं लघुतमः, परन्तुत्केन्द्रितास्य पर्याप्ता ०.२-मिता । अस्यैवाक्षभ्रमणकालो भगणकालसमः ।

७.११ दर्शनम्

सूर्यातिसमीपवर्तित्वात् सूर्यरश्मयो बहुलतया परावर्तन्ते, ग्रहश्चात्युज्ज्वलः शून्यकोटिक-नक्षत्रमिव प्रकाशते । ज्योतिर्विद्भिर्दिवापि सूर्यकिरणान् यत्र विशेषेण प्रतिरोध्य, दूरदर्शकयन्त्रेण विलोक्यतेऽयम् । परन्तु सर्वत्रास्य दर्शनं न सुलभम् । प्रसिद्धो ज्योतिर्विद् 'कार्पनिकस' महोदयोऽस्य दर्शनेच्छया सह पञ्चत्वं गतः, यतस्तस्य निवासस्थाने क्षितिजं प्रातःकाले सन्ध्याकाले वा सदैव कुञ्जटिकापूर्णमेवासीत् । अयं ग्रहो यदा कदा दृश्यते, दर्शनमप्यल्पकालिकमेव, यतः सूर्यसमीप्या-दाकाशे सूर्यसमीपमेवास्य दर्शनं सम्भवम्, तच्च सूर्यकिरणौज्ज्वल्याद् दुष्करम् । अस्य सूर्यात्कोणी-यान्तरं १८-अंशाधिकम् २८-अंशाल्पम्, अत एव सूर्योदयात् किञ्चित्पूर्वमुदेति, सूर्यास्तात् किञ्चित् पश्चादस्तमेति ।

सूर्योदये कतिपयदिवसानि पश्चपरमेणान्तरकाले, सूर्यास्ते कतिपयदिवसानि पूर्वपरमेणान्तर-काले च दृश्यतेऽयम् । युतिकालस्य ११६ मितदिवसत्वाद् वर्षे त्रीणि पश्चपरमेणान्तराणि, त्रीणि च पूर्वपरमेणान्तराणि सम्भवानि, परन्तु सर्वेषु परमेणान्तरेषु न सर्वोचितप्रेक्षणीयता । क्रान्तिवृत्तं वसन्तर्तौ क्षितिजस्य समीपतमम्, शरदि क्षितिजाद् दूरतमम्, अत एव वसन्तर्तौ पूर्वपरमेणान्तरे पश्चिमदिशायां सूर्यास्तकाले, शरदृतौ पश्चपरमेणान्तरे पूर्वदिशायां सूर्योदयकाले ह्यस्य बुधस्य दर्शनमनुकूलतमं सुलभतमञ्च ।^१ तदा स-१.२ कोटिकनक्षत्रमिवाभाति ।

७.१२ परिक्रमणम्

बुधः सूर्यं परितः ८८ दिनेषु (०.२४०८५ वर्षभागे) परिभ्रमति, अर्थादस्य परिक्रमण-कालः ८८ दिनानि । दीर्घवृत्ताकारकक्षाया मध्यमकर्णः ३,६०,००,००० क्रोशार्धानि, सूर्यादस्य दूरत्वमल्पतमं २,८५,५०,००० क्रोशार्धानि, दीर्घतमदूरत्वञ्च ४,३३,५०,००० क्रोशार्धमितम् ।

१. १८५६-तमे ख्रिस्ताब्दे सर्वाधिकानुकूलप्रेक्षणीयता फरवरीमासस्य २१-तमे दिनाङ्के, दिसम्बरमासस्य २५-तमे दिनाङ्के च भवति स्म ।

सप्तमोऽध्यायः

१३१


दीर्घवृत्तस्योत्केन्द्रिता २०६ मित्ता । कक्षाया वेगः २३ क्रोशार्धानि प्रतिसेकिण्डमस्ति, नीचे वेगः ३६ क्रोशार्धानि प्रतिसेकिण्डं भवति । दृश्यविम्बव्यासस्य दीर्घतमं मानं १३" मितम्, अल्पतमं मानं ५" मितमस्ति । मध्यममानञ्च ६".६८ विकलामितमस्ति । वास्तविकव्यासश्च गणनया ३१९० क्रोशार्धमित आगच्छति ।

७.१३ दृष्टिः कलाश्च

युतिकालः ११६ दिनानि लभ्यते । लघुयुते २२-दिनानि पूर्वं पश्चाद् वा परमेणान्तरं भवति । परमेणान्तरस्य ३३-दिनानि पूर्वं पश्चाद् वा प्रधानयुतिर्दृश्यते । प्रधानयुतौ पूर्णाः कला लभ्यन्ते, परमेणान्तरयोरष्टमी कला । लघुयुतावमा वर्तते । यथा यथा बुधः सूर्यं परितो भ्रमति तथा तथा चान्द्रकला इव कलाः प्राप्नोति । यदायं प्रधानयुतौ तदा कलास्तु पूर्णाः, परन्तु दूरत्वं परमेणान्तरापेक्षयात्यधिकम्, अत एव भास्वरत्वं परमेणान्तरापेक्षया नाधिकम् । अत एव भास्वरत्वं ग्रहस्य कलानां न्यूनाधिकमात्राया नाधीनम् ।

७.१४ अक्षभ्रमणम्

बुधमण्डले कानिचन धूमिलचिह्नानि दृश्यतां यान्ति । एषामपरिवर्तनशीलत्वाच्चन्द्रस्येव (द्रष्टव्यः § ३.४) बुधस्याप्यक्षभ्रमणकालः परिक्रमणकालसम इति सिध्यति । अस्य



जून १७

जून ११

जून १२

१९३४-तमे ख्रिस्ताब्दे पूर्वपरमेणान्तरे बुधः

[लावेल-वेधशाला]

तथ्यस्य प्रमाणमचिरात्पूर्वं माउण्टविल्सन-वेधशालायामुपलब्धम् । अस्त्येकं सूक्ष्मतापमापकयन्त्रं

$$\begin{aligned}
 १. \frac{१}{\text{बुधयुतिकालः}} &= \frac{१}{\text{बुधभ्रमणकालः}} - \frac{१}{\text{पृथिवीभ्रमणकालः}} \\
 &= \frac{१}{८८} - \frac{१}{३६५} = ०.०११३६ - ०.००२७४ = ०.००८६२ \\
 \text{अत एव बुधयुतिकालः} &= \frac{१}{०.००८६२} = ११६ \text{ दिनानि ।}
 \end{aligned}$$

(‘थर्मोकपल’यन्त्रम्) येन नक्षत्राणामत्यल्पमात्रकतापोऽपि माप्यते, चन्द्रस्य ग्रहाणां चा प्रकाशित-भागानामपि तापो माप्यते । अनेन यन्त्रेणोपर्युक्ततथ्यस्य सत्यतास्थापनं क्रियते । बुधस्य सूर्या-प्रकाशितभागः किञ्चिन्मात्रमपि तापविकरणं न करोति । यदि कदाचिदपि तेन सूर्यप्रकाशकिरणाः लब्धाः, तर्हि किञ्चिन्मात्रं तापविकरणमवश्यं भवेत् ।

उत्केन्द्रितायाः पर्याप्तत्वाद् दृश्यताभेदा अस्य चन्द्रापेक्षया महीयांसः । रेखांशदृश्यताभेदाद् रेखांशेषु केवलं ३० प्रतिशतभागमदृष्टं वर्तते ।

७.१५ तापक्रमः

‘रेडियोमीट्रिक’परीक्षणैः (सूक्ष्मतापमापकयन्त्रैः) बुधस्य तापो माउण्डविस्सन-वेधशालायां मापितः । बुधस्य भागेषु मध्याह्नकालीनतापक्रमः ४४०° सेन्टीग्रेडमितः । तत्र सूर्यकिरणेषु सीसमपि द्रवीभविव्यति । अप्रकाशितभागस्य तापक्रमः प्रायेण-२७३° सेन्टीग्रेडमितः । तापक्रमस्यैता-वदाधिक्यं सूर्यसामीप्याद् वातावरणाभावाच्चास्ति ।

६.१६ वायुमण्डलम्

बुधे वायुमण्डलं न विद्यते । बुधस्य पिण्डमात्रा-पृथिव्याः पिण्डमात्रायाः $\frac{1}{4}$ भागमिता, गुरुत्वाकर्षणश्च पार्थिवगुरुत्वाकर्षणस्य $\frac{1}{3}$ भागमितम् । इदं स्वल्पं गुरुत्वाकर्षणं वायुमण्डलस्य वाष्पाणां बहिर्निस्सरणान्नियन्तुं न पर्याप्तम्, अत एव वाष्पाणि शनैः शनैर्महाकाशं गत्वा, वायुमण्डलं वाष्पशून्यम् अर्थाद् बुधं वायुमण्डलविहीनमकुर्वन् (वायुमण्डलहानिकारणार्थं द्रष्टव्यः § ३.५१) । बुधस्य परिक्षेपणस्य ०.७ मितो मानाङ्कोऽपि वायुमण्डलभावं स्थापयति । सूर्यं बुधसंक्रमणमपि प्रदर्शयत्युज्ज्वलवलयदर्शनत्वाद् वायुमण्डलभावम् । रश्मिविश्लेषक-यन्त्रेण गृहीते बुधस्य वर्णच्छत्रं सूर्यस्य वर्णच्छत्रं च सर्वथा सममेव, अर्थाद् बुधे नास्ति किमपि वायुमण्डलम्, यस्माद् भेदनेन बुधपरावर्तितसूर्यकिरणानां वर्णच्छत्रे कोऽपि भेदः स्यात् । एवं बुधस्य वायुमण्डलविहीनत्वं सुसिद्धं वर्तते ।

७.१७ बुधचन्द्रयोः समानता

बुधचन्द्रयोः पर्याप्ता समानता विद्यते । उभयत्र स्वल्प-परिक्षेपणशक्तिरस्ति, उभयत्राप्यक्षभ्रमणकाल-परिक्रमणकालसमत्वं वर्तते, उभयत्र च वायुमण्डलभावः । एवं प्रतीयते यद् बुधोऽपि चन्द्र इव बहुलतया पर्वतपूर्णः । तयोर्व्यासमानस्य, पिण्डमात्राया गुरुत्वाकर्षणस्य च समत्वं लभ्यते ।


७.१८ बुधनीचस्य च्युतिः

बुधकक्षाया बृहदक्षः प्रतिशतकं ५७० विकलागत्या पूर्वदिशां विचलति । विचलनमिदं कदाचिच्छुक्रादीनां विक्षेपशक्तिभिर्जायते । ‘लेवेरिए’महोदयेन १८४५-तमे ख्रिस्ताब्दे उपलब्धं यद् नीचबिन्दुगणितागता स्थितिर्वैधप्राप्तस्थित्या अग्रवर्तिनी । अतस्तेनानुमिता सूर्यबुधान्तगले कस्यचनाप्यलक्षितग्रहस्योपस्थितिः, परन्तु सूक्ष्मतया वेधनेनापि तत्र तद्दर्शनं नोपलब्धम् । अस्य

सप्तमोऽध्यायः

१३३

च्युती रहस्यपूर्णैवासीद् यावदचिरात्पूर्वम् 'आइस्टाईन' महोदयेन सापेक्षवादेनाप्यस्याः सृष्ट् कारणं व्याख्यातम् ।



७.१६ बुधस्य संक्रमणानि

साधारणतो लघुग्रहौ

(बुधशुक्रौ) लघुयुतौ सूर्यस्य किञ्चिद्

उपर्यधो वा कक्षायां भ्रमतः


कक्षाणमनत्वात्, परन्तु यदि

पृथिवी तयोः क्रान्तिसंपाते तिष्ठति

तर्हि तौ संक्रमणं कुर्वन्तौ दृश्येते,

बुधस्य सूर्यविम्बे संक्रमणम् [ग्रिनिच-वेधशाला]

अर्थात् सूर्यविम्बे तौ बिन्दुरूपेण गच्छन्तावलोक्ष्येते । इदं (चन्द्रकृतसूर्यग्रहणमिव) ग्रहणं नोच्यते, यतो बुधविम्बं शुक्रविम्बं वात्यल्पमितम्, न तेन सूर्याच्छादनं सम्भवम् । अत एव सूर्यमण्डले केवलं सूर्यव्यासस्य $\frac{1}{10}$ भागव्यासमितमेकं श्यामलं विम्बं तीव्रगत्या चलद् दृश्यते । (अवलोकनीयमत्रोपरि दत्तं चित्रम्) ।



पृथिवी बुधस्य क्रान्तिसंपातमध्यतो मईमासस्य सप्तमे दिनाङ्के, नवम्बरमासस्य नवमे दिनाङ्के च गच्छति । अत एव यदि लघुयुतिः ५-मईतः ११ मईपर्यन्तं ५ नवम्बरतः १५ नवम्बरपर्यन्तं वा भवति, तर्हि संक्रमणानि दृश्यन्ते । एकस्मिन् ख्रिस्तीयशतके प्रायेण त्रयोदश-संख्याकानि संक्रमणानि लभ्यन्ते । बुधसंक्रमणानि दूरदर्शकं विना दृष्टिपथं नावतरन्ति । अधो बुधसंक्रमणानां दिनाङ्का दीयन्ते—

दिनाङ्कः	मासः	ख्रिस्ताब्दः
१४	नवम्बर	१९०७
७	नवम्बर	१९१४
७	मई	१९२४

१. बुधकक्षाणमनं सप्तांशमितम् ।

दिनाङ्कः	मासः	ख्रिस्ताब्दः
९	नवम्बर	१९२७
११	नवम्बर	१९४०
१४	नवम्बर	१९५३
५	मई	१९५७
७	नवम्बर	१९६०
८	मई	१९७०
९	नवम्बर	१९७३
१२	नवम्बर	१९८६
५	नवम्बर	१९९३
१५	नवम्बर	१९९९

शुक्रः

बुधं विहाय शुक्रः सर्वेषां ग्रहाणां समीपतमः सूर्यस्य । पुरातनकालादयं परिचितः सर्वेषां सर्वत्र । सायंकालीन^१- प्रातःकालीन^२- तारकानाम्ना प्रसिद्धोऽयमासीद् ग्रीसदेशे पाश्चात्यदेशेषु च । ग्रहोऽयं सर्वाधिकौज्ज्वल्यवान् । अस्य चाक्षुषकोटिः—४.३ मित्ता (दृष्टव्यः §), परत्त्व-त्यन्तभास्वरत्वमेव विवरणानामध्ययने बाधकम् ।

७.२१ सूर्ये परितः परिक्रमणम्

शुक्रः सूर्ये परितः २२४.७ दिनेषु (७२३३ वर्षभागो वा) परिभ्रमति, अर्थादस्य परिक्रमणकालः २२४.७ दिनानि । अस्य दीर्घवृत्ताकारकक्षाया मध्यमकर्णः ६,७२,००,००० क्रोशार्धानि, उत्केन्द्रिता चास्य सौरमण्डले लघुतमा केवळं ०.००७ मित्ता । कक्षाणमनञ्च ३°२४' मितम् । दृश्यविम्बव्यासमानमेकादशविकलातः ६७ विकलापर्यन्तम् । वास्तविकव्यासश्च ७,६०० क्रोशार्धानि लभ्यते । कक्षायां वेगः प्रायः २२ क्रोशार्धानि प्रतिसेकिण्डमस्ति ।

७.२२ दृष्टिः कलाश्च

युतिकालः ५८४ दिनानि^३ । यतः पञ्च युतिकाला अष्टवर्षसमाः, अत एवाष्टवर्षानन्तरं शुक्रस्य पूर्ववद् रूपाणि दृश्यन्ते । लघुयुतेः ७१ दिनानि पूर्वं पश्चाद् वा परमेणान्तरं भवति । परमेणान्तरेऽस्य सूर्यात् कोणीयदूरत्वम् ४८ अंशमितं भवति । तदैव प्रेक्षणीयता सुलभा विद्यते, यतः शुक्रः सूर्यास्तात् पश्चात्, सूर्योदयात् पूर्वं वा होरात्रयपर्यन्तं दृश्यते ।^४

१. 'हेस्पेरस' नाम्ना—Euepos (Hesperus)

२. 'फास्फोरस-नाम्ना— $\theta\phi\sigma\phi\omicron\rho\varsigma$ (phosphorus)


३. $\frac{1}{\text{शुक्रयुतिकालः}} = \frac{1}{\text{शुक्रपरिक्रमणकालः}} = \frac{1}{\text{पृथिवीपरिक्रमणकालः}}$

४. ईदृशी स्थितिः १६६६-तमे ख्रिस्ताब्दे १२ अप्रैले ३१-अगस्ते वागच्छत् ।

सप्तमोऽध्यायः

१३५

चन्द्रस्य बुधस्य चैव शुक्रस्यापि कला दृश्यन्ते । तासां वेधेन सुलभदर्शनं यतः साधारण-
दूरदर्शकमपि कलानां न्यूनाधिक्यं प्रकटीकरोति । लघुयुतौ शुक्रः सशृङ्गकलां भजते, परन्तु शुक्रस्य लघुयुतौ समीप-
वर्तित्वात् सशृङ्गकला पर्याप्ता दीर्घाकारा दृश्यते (अवलोकनीयमत्र फोटोचित्रम् ।
प्रधानयुतौ पूर्णाः कला दृष्टिगोचरतां यान्ति, परन्तु प्रधानयुतौ भुवः सुदूर-
वर्तित्वात् पूर्णकला लघ्वी दृश्यते ।



एवं शुक्रस्य भास्वरत्वं कलाक्षय-
वृद्धिं दूरत्वं चापेक्षते । प्रधानयुतौ
सकलाः कला दृश्यन्ते, परं तदा शुक्रस्य
भुवो दूरत्वं १६,००,००,०० क्रोशार्ध-
मितम् । सुदूरवर्तितेयं सकलकलोद्भूता-

शुक्रस्य विभिन्नाः कलाः [लावेल-वेधशाला]

धिकभास्वरत्वं निष्कलीकरोति । लघुयुतौ च कला शृङ्गाकारा, परं भुवो दूरत्वं केवलं २,६०,००,
००० क्रोशार्धानि । सामान्यगणितेन गणितं यत् शुक्रस्य परमभास्वरत्वं लघुयुतेः ३६ दिनानि पूर्वं
पश्चाद् वा भवति; तदा त्विनान्तरं ३९°, कला च पञ्चमीचन्द्रकलावत् । तदा शुक्रस्य भास्वरत्वं
भासुरतमनक्षत्रस्य लुब्धकस्य भास्वरत्वाद् द्वादशगुणितम् । तदा दिवापि शुक्रः सूर्यस्य समीपं
दृश्यते यदि तस्य रवेः स्थानं पूर्वविदितं भवेत् ।^१

शुक्रस्य भास्वरत्वकोटिः—४.३ मितम् । अयं भुवः समीपतमवर्तित्वात्, बृहद्विम्बवत्त्वात्,
सूर्यसमीप्यात्, वायुमण्डलभावाच्च बहुप्रकाशवान् प्रतीयते । वायुमण्डलस्योपस्थितेः ५९ प्रति-
शतकिरणाः परावर्तन्तेऽस्य तलात् ।

शुक्रस्य लघुयुतिप्रधानयुत्यादीनां दिनाङ्काः


प्रधानयुतिः	१ सितम्बर १९५५	१४ अप्रैल १९५७
पूर्वपरमेणान्तरं (सांध्यनक्षत्रम्)	१२ अप्रैल १९५६	१८ नवम्बर १९५७
लघुयुतिः	२२ जून १९५६	२८ जनवरी १९५८
पश्चपरमेणान्तरं (प्रातर्नक्षत्रम्)	३१ अगस्त १९५६	९ अप्रैल १९५८

७.२३ अक्षभ्रमणम्

अतिभास्वरत्वात् सान्ध्यप्रकाशे प्रभातवेलायां सायंवेलायां वा शुक्रावलोकनं सर्वोत्तमम्,
तथापि तस्य पृष्ठे कानिचनानि चिह्नानि न दृश्यन्ते । सशृङ्गशुक्रे कानिचिच्चिह्नानि महाप्रयत्नैः

१. १९५६ तमे ख्रिस्ताब्दे मईमासस्य १६-दिनाङ्के, जुलाईमासस्य च २६-तमे दिनाङ्के
शुक्रस्य परमभास्वरत्वमभवत् ।

वेधेन दृश्यतां यान्ति, परन्तु काले काले परिवर्तनशीलानि तानि वायुमण्डलोद्भूता विकारा एव



शुक्रस्य नीललोहितोत्तरकिरणेषु गृहीतछायाचित्राणि
शुक्रपृष्ठचिह्नानि—[माउण्ट-विल्सन-वेधशाला]

प्रतीयन्ते । (द्रष्टव्यं फोटोचित्रम्)

चिह्नाभावे शुक्रस्याक्षभ्रमणकालनिर्धारणमतिदुष्करम् । अद्याप्यत्र वर्तते मतवैभिन्न्यं
हो मि, हो मि
विद्वत्सु । 'कैसिनी' महोदयेन २३ १५ 'श्रोटर' महोदयेन २३ २१ अक्षभ्रमणकालो निश्चितः ।
अधुना बहुमतमिदं यदक्षभ्रमणकालः ३०-दिनमितः । परन्तु समस्येयमधुनापि जटिलैव ।
रश्मिविश्लेषकयन्त्रैरपि भ्रमणकालनिर्णयार्थं प्रयत्नाः कृताः, परन्तु तेऽपि निष्फला जाताः ।

७.२४ शुक्रपृष्ठं वायुमण्डलञ्च

शुक्रस्य परिक्षेपणशक्तिः ०.५९ मिता । अचिरात् पूर्वपतितहिमस्यापि परिक्षेपिणी शक्तिः
०.५९ मिता । अत एवानुमीयते यद् ग्रहोऽयमधिकांशतया सम्पूर्णतया वा मेघावृतो धूमिलवायु-
मण्डलावृतो वा ।

शुक्रे वायुमण्डलं वर्तत इति निश्चितमेव । शुक्रो यदा सूर्यविम्बे संक्रमणं करोति तदा तस्य
स्यामलविम्बं परितः किञ्चिद्भास्वत्परिमण्डलं दृश्यते । संक्रमणकाले वेधेन निश्चीयते यत्
शुक्रवायुमण्डलस्य परिमाणं ५५ क्रोशार्धमितम् । परन्तु कानि कानि तत्त्वानि सन्ति तत्रेति न
कोऽपि निश्चयो जातः । वर्णच्छत्रेण 'कार्बनडाई-आक्साइड'स्योपस्थितिः सूच्यते, परन्तु
'ओषजनस्य' जलवाष्पस्य चिह्नान्यपि न विद्यन्ते ।

७.२५ तापक्रमः

प्रकाशितभागस्य तापक्रमः ५५° सेन्टीग्रेडमितः, अप्रकाशितभागस्य २०° सेन्टीग्रेडमितः ।
परन्तु 'कार्बनडाई-आक्साइड'वाष्पं तापक्रमं वर्धयति, अत एव शुक्रस्य पृष्ठे तापक्रमः शतसेन्टी-
ग्रेडाधिको भविष्यति । तत्र धूलिमयप्रभञ्जनाः सर्वदा चलन्तो दृश्यन्ते ।

सप्तमोऽध्यायः

१३७

७-२६ शुक्रस्य संक्रमणानि

बुधस्येव (§ ७-१९) शुक्रस्यापि संक्रमणानि सूर्यविम्बे दृश्यन्ते । पृथिवी शुक्रस्य क्रान्ति-संपातौ जूनमासस्य सप्तमदिनाङ्के, दिसम्बरमासस्य नवमदिनाङ्के चोल्लङ्घयति, अत एव लघुयुतिः ५-जूनतः ९-जूनपर्यन्तं, ७-दिसम्बरतः ११ दिसम्बरपर्यन्तं वा भवति, तर्हि शुक्रस्य संक्रमणमवलोक्यते । शुक्रसंक्रमणानि सूर्यदूरत्वनिर्धारणप्रक्रियायां महत्त्वपूर्णानि सन्ति (द्रष्टव्यः § ५-१२) । निम्नसारिण्यां १६०० ख्रिस्ताब्दतः २२०० ख्रिस्ताब्दपर्यन्तं दृश्यमानानां शुक्र-संक्रमणानां दिनाङ्का दीयन्ते—

दिनाङ्कः	कालान्तरम्
७ दिसम्बर १६३१	८ वर्षाः
४ दिसम्बर १६३९	१२१ $\frac{१}{२}$ ”
६ जून १७६१	८ ”
३ जून १७६९	१०५ $\frac{१}{२}$ ”
९ दिसम्बर १८७४	८ ”
६ दिसम्बर १८८२	१२१ ”
८ जून २००४	८ ”
६ जून २०१२	१०५ $\frac{१}{२}$ ”
१० दिसम्बर २११७	८ ”
८ दिसम्बर २१२५	

भौमः

बहिर्ग्रहाणामस्मत्समीपतमो भौमो रक्तवर्णत्वात् सरलतया नक्षत्राणां मध्येऽभिज्ञायते । अस्य कलाः प्रायेण तु पूर्णाः सन्ति, यदि कदाचिच्च कलाहानिर्भवति, तथापि चन्द्रस्य शुक्लपक्षीय-त्रयोदशीकला इव कला दृश्यन्ते । पुनश्च भौमस्य, अन्येषां बहिर्ग्रहाणां वा, इनान्तरं ०° अंशात् १८० अंशपर्यन्तं सम्भवम्, अत एव बहिर्ग्रहा भौमो वा निशायां सूर्यास्तात् सूर्योदयकालपर्यन्त-मवलोक्यन्ते ।


७-३१ सर्वानुकूलप्रेक्षणीयता

बहिर्ग्रहस्य सर्वानुकूलप्रेक्षणीयता षड्भान्तरे (प्रतियोगे) भवति, यतः षड्भान्तरे सोऽस्माकं समीपतमो वर्तते, रात्र्याश्च सर्वग्रहरेषु च दृश्यते । परन्तु प्रत्येकस्मिन् प्रतियोगे भौमस्य प्रेक्षणीयता नानुकूला, यतः प्रत्येकस्मिन् प्रतियोगे भौमस्य दूरत्वं न समम् । भौमस्य कक्षाया उत्केन्द्रिता पर्याप्ता ०.०९ मित्ता, नीचस्थभौमस्य सूर्याद् दूरत्वमुच्चस्थभौमस्य सूर्याद् दूरत्वात् पर्याप्तं भिन्नम् । एवं भौमस्य सर्वाधिकानुकूलप्रेक्षणीयता नीचसमीपवर्तिप्रतियोग एव भवति । अस्यां स्थित्यां भौमस्य भुवो दूरत्वं केवलं ३,५०,००,००० क्रोशार्धान्येव ।

१३८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

अत्र स्थापिते चित्रे विभिन्नप्रतियोगाः सूचिताः । १९५६ तमे ख्रिस्ताब्दे सितम्बरमास्य सप्तम-



भौमस्य प्रतियोगानां भुवर्किभिन्नानि दूरत्वानि

दिनाङ्के भौमस्य सर्वाधिकानुकूलप्रेक्षणीयताभवत् । तद्दिने भौमः सायनगणनया कुम्भराशौ स्थितः, विम्बव्यासश्च तस्य २५-विकलमित आसीत् ।

७.३२ परिक्रमणम्

भौमः सूर्ये परितः ६८७ दिनेषु (१०८०८९ वर्षेषु) परिभ्रमति । दीर्घवृत्तस्योत्केन्द्रिता पर्याप्ता ०९३३ मितस्ति । कक्षाणमनञ्च १°५१' मितमस्ति । युतिकालश्च सौरमण्डले दीर्घतमो ७८० दिनमितः ।

७.३३ अक्षभ्रमणम्

भौमपृष्ठे चिह्नानि वर्तन्ते, अतोऽक्षभ्रमणकालस्यानयनं न दुष्करम् । 'कैसिनी' महोदयेन हो मि से सः २४ ४० मितो निश्चितः, अधुना ज्योतिर्गणकैः २४ ३७ २२.५८-मितो निर्धारितः ।

[पृथिव्या अक्षभ्रमणकालो भौमस्याक्षभ्रमणकालेन किञ्चित्सम एव, अतो भूपृष्ठस्थपुरुषाय भौमपृष्ठचिह्नान्यतिमन्दगत्या पश्चभागं गच्छन्ति दृश्यन्ते, ३८ दिनैस्तानि पूर्वस्यानमेव लभन्ते । यूरोपीयदेशेषु गत २७५ वर्षाणां भौमचित्राणि लिखितानि प्राप्यन्ते, तेषां तुलनात्मकाध्ययनाद् अक्षभ्रमणकालः सरलतया आनीयते ।

अस्या भ्रुवनिम्नताया मानं पृथिव्या भ्रुवनिम्नतामानादधिकं ३/४ मितम् । अत एव भ्रुवौ २५ कोशार्धमितां निम्नतां भजेते ।

सप्तमोऽध्यायः


१३६

७.३४ भौमे ऋतवः

यथा पृथिव्या निरक्षरेखा क्रान्तिसूत्राद् २३ $\frac{1}{2}$ अंशमितं तिर्यक्, तथैव भौमस्य २४ $\frac{1}{2}$ अंशमितं तिर्यक् । अक्षतिर्यक्त्वाद् भौमध्रुवावपि पार्थिवध्रुवाविव क्रमेण सूर्याभिमुखतां भजेते । अस्माकमृतव इव तत्रापि ऋतवः सन्ति, परन्तु तेषां कालावधिः प्रायो द्विगुणितः । भौमकक्षाया उत्केन्द्रिता पर्याप्ता, अतः शैत्यौष्ण्ये सूर्यदूरत्वापेक्षिणी ।

मई ११

जून-२३



मई २९

जुलाई ३१

भौमे ऋतुजनितपरिवर्तनानि-(भौमतिथिः)

[लावेल-वेधशाला]

दक्षिणार्धे यदा शीतर्तुर्भवति तदा भौम उच्चस्थो वर्तते, यदा ग्रीष्मर्तुर्भवति तदा नीचस्थो वर्तते; उत्तरार्धे च विपरीतं भवति । अत एव दक्षिणार्धे शीतमात्रा, औष्ण्यमात्रा वात्यधिका । अनेन दक्षिणध्रुवे हिममयप्रदेशा अत्यधिकं हिममया भवन्ति, शीघ्रञ्च तत्र ग्रीष्मे ता हिमशिला द्रवन्ति । उपरि दत्तचित्रेणैदं स्पष्टं भविष्यति, यद्यपि तत्रेदमवधारणीयं यद् दूरदर्शकयन्त्रे दिशां व्यत्यासो भवति, अत एव फोटोचित्रे दक्षिणध्रुव उपरि भागे दृश्यते ।

७.३५ वायुमण्डलम्

भौमे वायुमण्डलमस्ति, परन्तु तत् पार्थिववायुमण्डलापेक्षया सुविरलम् । कदाचित्त्र आक्सीजनं नास्ति, यथास्माकं पर्वतश्रृङ्गेषु वायुर्विरलोऽल्पमात्रकञ्च आक्सीजनम् । तत्र 'कार्बन-डाइ-आक्साइड'वाष्पं पर्याप्तमात्रया वर्तते ।

वायुमण्डलभावस्य सन्ति नैकान्यत्र प्रमाणानि । मुख्यान्वेवाधो दीयन्ते—

(१) भौमस्य परिक्षेपणशक्तिः ०.१५ मितः । इयं चान्द्रपरिक्षेपणशक्तेर्बौधपरिक्षेपण-
शक्तेश्च प्रायेण द्विगुणिता, परन्तु शुक्रपरिक्षेपणशक्तेरल्पा । अत एव भौमे विरलं
वायुमण्डलमस्ति ।

(२) विरलाः श्वेताभमेवा यदा कदा दृश्यन्ते । वायुमण्डलं विना मेघानामुपस्थितिरसम्भवा ।





(३) ध्रुवप्रदेशे शीतकाले पतितो हिमराशिः क्षिप्रं वसन्ते द्रवीभवति । बाष्पाणां घनत्वाद्
हि हिमपातो भवति, वायुमण्डलं विना च बाष्पाणि न वर्तन्ते ।

(४) भौमे सूर्योदयानन्तरं पूर्वदिशायां भौमपृष्ठे श्वेतपट्टिकैका दृश्यते । सा च कदाचित्तुहिन-
जनिता कुञ्जटिकाजनिता वा, अत एव वायुमण्डलं तत्र निश्चयतो वर्तते ।

(५) काले काले भौमपृष्ठे वात्याश्चरन्त्यो दृश्यन्ते ।

(६) सान्ध्यप्रकाशोऽप्यत्रैकं प्रमाणम् । § २.५४-तमे व्याख्यातं यद् वायुमण्डलभावात्
सान्ध्यप्रकाशोऽस्माकं पृथिव्यां दृश्यते । दूरदर्शकयन्त्रेण भौमपृष्ठेऽपि सान्ध्यप्रकाशप्रकाशितक्षेत्राण्यव-
लोक्यन्ते, अत एव तत्रापि वायुमण्डलं वर्तते ।

(७) 'राइट'महोदयेन 'लिक'वेधशालायामनेकानि चित्राणि गृहीतानि 'कैमरा'यन्त्रे
विविधवर्णशोषकपटलानि स्थापयित्वा । नीललोहितोत्तरच्छायाचित्रे भौमविम्बमुपरक्तच्छाया-
नीललोहितोत्तरम् उपरक्तम्



भौमस्य नीललोहितोत्तरे उपरक्ते च छायाचित्रे
[लिक-वेधशाला]

सप्तमोऽध्यायः

१४१

चित्रागतविम्बान् किञ्चिद् बृहत्तरम्^१ (द्रष्टव्यमत्र १४० पृष्ठस्य फोटोचित्रम्), अत एव भौमे वायुमण्डलम् ।


७.३६ तापक्रमः

'रेडियो-मीट्रिक' पद्धत्या तापक्रमो माप्यते । विषुवप्रान्तेष्वपि मध्याह्ने तापक्रमः १२-सेन्टीग्रेडादाधिको न भवति । प्रातःकाले तापक्रमः -८५° सेन्टीग्रेडमितः । भौमवायुमण्डलमलि-विरलम्, अतो दिवसलब्धौष्ण्यं झटिति महाकाशे विलीयते । एवं तत्र दिवसाः शीतलाः, रजन्यश्चात्यन्तशीता यथास्माकं ध्रुवप्रदेशयोः ।

७.३७ पृष्ठचिह्नानि

भौमस्य ध्रुवप्रदेशयोः श्वेतचिह्नान्यवलोक्यन्ते । एतानि चिह्नानि शीतकालपतितहिमराशि-जनितानीति न कोऽपि सन्देहः । श्वेतचिह्नानि ऋत्वनुसारं वर्धन्ते हीयन्ते (द्रष्टव्यं § ७.३४-तमे दत्तं फोटोचित्रम्) च ।

हिमक्षेत्राणि विहाय दृश्यन्ते कश्चिद् हरितचिह्नानि, कश्चिद् रक्तचिह्नानि च । हरित-चिह्नानि प्रायः पृष्ठस्य ३ भागेषु विस्तृतानि, फोटोचित्रे च श्यामलानि दृश्यन्ते (द्रष्टव्यमधो दत्तं फोटोचित्रम्) । एतानि प्रायो दक्षिणगोलार्धे विद्यन्ते । रक्तचिह्नानि प्रायः पृष्ठार्धभागे विस्ती-



भौमस्य

फोटोचित्रम्

कलाचित्रम्


[लिङ्ग-वेधशाला]

र्णानि, फोटोचित्रे च श्वेताभानि दृश्यन्ते । एतानि च मुख्यतयोत्तरीयगोलार्धे विद्यन्ते । हरितचिह्नानि वस्तुतो जलप्रदेशाः, रक्तचिह्नानि च स्थलप्रदेशा इति ज्योतिर्विदामनुमानम् ।

१. उपरक्तकिरणाः वायुमण्डलं भित्त्वा प्रविशन्तिः नीललोहितोत्तरकिरणाश्च वायुमण्डलं न प्रविशन्ति, अत एव नीललोहितोत्तरच्छायाचित्रं किञ्चिद् बृहत् ।

भौमस्य चित्रपटान्यपि कल्पितानि । तत्र स्थानानां नामान्यपि दत्तानि । तत्र सन्ति महाद्वीपा महासागराश्च (वस्तुतस्तत्र महासागरा न सन्ति) । अस्मिन् चित्रपटनिर्माणकार्ये सर्वाधिकपरीक्षणानि कृतानि 'इटली'निवासिना 'शियपैरेली'महोदयेन । १८७७-तमे ख्रिस्ताब्दे तेन भौमपृष्ठे हरिद्वर्णा ऋजुरेखा दृष्टा; तथा 'कैनालि'नाम्ना विज्ञापिताः ।

एता हरिद्वर्णा ऋजुरेखा वस्तुतः किंपदार्थका इति विवादास्पदो विषयः । 'शियपैरेली'-महोदयेन तेषां सद्भावः सर्वप्रथममुद्घोषितः, तथाप्यद्यपर्यन्तं केचिद् ज्योतिर्विदस्ताः पश्यन्ति,



भौमस्य कलाचित्राणि

जुलाई १९४१

अगस्त १९४१

[माउण्टविस्सन-वेधशाला]

केचिच्च न पश्यन्ति । 'लवेल'महोदयेनात्र विस्तरेण व्याख्यातम् । तस्य मतं च संक्षेपेणाधो दीयते—

भौमः कदाचित् पृथिवीसदृश आसीत् । शनैः शनैर्भौमः शीतलोऽभवत्, अधुना यद्यपि चन्द्रवद् मृतो नास्ति, तथापि पर्याप्तं शीतलोऽस्ति । तत्र मरुस्थलान्यधिकांशतया सन्ति, तानि रक्तवर्णानि दृश्यन्ते । यानि हरिद्वर्णस्थलानि तानि हरिद्भूमयः सन्ति । भौमे जडं दुर्लभम्, परन्तु भौमवासिनोऽतिसभ्या विज्ञानविदश्च सन्ति । त आवश्यकतानुसारं कुल्याः खनन्ति, ग्रीष्मतौ ध्रुवगलितहिमजलं ताभिर्विषुवप्रदेशेषु प्रापय्य ते निवासिनः कृषिकर्म कुर्वन्ति । यत्रानेक रेखाः सम्मिलन्ति तत्र शाद्वलप्रदेशाः सन्ति ।

७.३८ उपग्रहः

भुव एक उपग्रहश्चन्द्रनाम्ना प्रसिद्धः, परन्तु भौमस्य द्वावुपग्रहौ । तौ संख्यायां द्वौ, परन्तु तयोस्तादृशं तमोऽहन्तुत्वं न यादृशमस्माकं रजनीकरस्य, यतस्तावत्कल्पपरिमाणकौ—प्रथमो

सप्तमोऽध्यायः


१४३

‘फोवस’नामकः केवलं दशक्रोशार्धमितव्यासकः, द्वितीयो ‘डाइमस’नामकः केवलं पञ्चक्रोशार्धमितव्यासकः ।

तावन्यविषयेष्वपि चन्द्राद् भिन्नौ । प्रथमस्य फोवसस्याक्षभ्रमणकालः केवलमष्टहोरामितः, अत एव यावति काले भौम एकमक्षभ्रमणं करोति, स तावति काले, त्रीण्यक्षभ्रमणानि करोति ।

डाइमसः

फोवसः



भौमस्योपग्रहौ

[लावेल-वेधशाला]

एवमस्योपग्रहस्याष्टहोरामितमासो ग्रहस्य राज्यवधिकालान्यूनः । अत एव रात्रौ स पश्चिमे भाग उदेति, ४½ होरानन्तरमस्तमेति, एकस्यामेव रात्रावस्य ह्यमावस्या पूर्णिमा च भविष्यतिः (कदाचिदेकस्यामेव रात्रौ द्विवारमप्युपग्रहोदयः स्यात्) ।

हो मि

द्वितीयस्य ‘डाइमसस्य’ प्रदक्षिणाकालो (३१ १८ मितः) भौमाक्षभ्रमणकालात् किञ्चिदधिकः । यथा यथाऽक्षभ्रमणाद् भौमपृष्ठे स्थानविशेषः पश्चिमं गच्छति, तथा तथा तेन सहोपग्रहः पश्चिमं गच्छति, अत एव त्रिदिवसपर्यन्तं ‘डाइमसः’ अस्तं न याति, एतावति च कालेऽस्य द्विवारमावस्या पूर्णिमा च भवति ।

द्रावुपग्रहौ ग्रहादतिदूरत्वेन स्थितौ । प्रथमस्य भौमाद् दूरत्वं ५,८०० क्रोशार्धमितम्, द्वितीयस्य च १४,६०० क्रोशार्धमितम् ।


—सारिणी—

नाम	चित्रितिकारः	उपग्रहस्य ग्रहाद् दूरत्वम्	परिक्रमणकालः	व्यासमानम्	नाक्षत्रकोटिः
			दि हो मि		
फोवस	‘हाल’महोदयः	१८७७ ५,८००	०-७-३९	१० (?)	+१२
डाइमस	” ” ”	१४,६००	१-६-१८	५ (?)	+१३

७.४१ अवान्तरग्रहाः

ग्रहाणां सूर्याद् दूरत्वकण्ठस्थीकरणे 'बोर्ड'नियमोऽतिप्रसिद्धः^१, परन्तु १७७२ तमे ख्रिस्ताब्दे प्रथमप्रतिपादनावसर एवास्मिन्नियम आसीदेकोऽपवादः। भौमगुरुमध्यान्तरे २.८ मितस्थाने कोऽपि ग्रहो दृष्टो नासीत्। ज्योतिर्विद्भिस्तत्र ग्रहोपलब्धये महान्तः प्रयत्नाः कृताः, परन्तु ते सर्वथा निष्फला जाताः। ख्रिस्ताब्दे १७८१ तमे वरुणोपलब्धिर्'बोर्ड'-नियमागते स्थाने १९.६ मितस्थाने जाता। अनेनोत्साहिता ज्योतिर्विदः पुनर्ग्रहदर्शनाय प्रयत्नसहस्राण्यकुर्वन्। ख्रिस्ताब्दे १८०१ तमे जनवरीमासस्य प्रथमदिनाङ्के यदा 'पिआर्जी'महोदय आकाशस्य तस्य क्षेत्रस्य नक्षत्र-मानचित्रालेखनार्थं वेधान् कुर्वन्नासीद् तदाऽकस्माद् दृष्टवान् २.८ मितस्थान एकं चलं प्रकाश-विन्दुम्। स च दर्शनस्याचिरानन्तरं सूर्यसामीप्याद् लुप्तोऽभवत्, परन्तु 'गाउस'महोदयेन गणितेन तस्य विन्दोः कक्षा निर्धारिता। वर्षानन्तरं स प्रकाशविन्दुर्गणितागतस्थाने पुनर्दृष्टिपथ-मागच्छत्। तस्य ग्रहत्वमेवं सुस्थापितमासीत्, तस्य च नाम 'सेरेस' इति कृतम्।

ख्रिस्ताब्दे १८०२-तमे 'सेरेसम्' अन्विष्यता 'ऑल्वर्स'महोदयेनैकोऽपरो ग्रहः 'पैलस'-नामकः प्राप्तः। १८०४-तमे ख्रिस्ताब्दे 'जूनो' नामकग्रह उपलब्धः, १८०७-तमे ख्रिस्ताब्दे च



त्रयाणामवान्तरग्रहाणां क्रमणचिह्नानि

[प्रो० बुल्फ]

सर्वाधिकभासुरो 'वेस्टा'नामकः। ततः प्रतिक्रमे नूतना नूतना ग्रहा दर्शनपथमायाताः। १८९१ ख्रिस्ताब्दपर्यन्तं त्रीदशाः ३२२-संख्याकाः प्राप्ता आसन्। परन्तु तत्पर्यन्तमन्वेषणकार्यं प्रधान-

सप्तमोऽध्यायः


१४५

तथा चाक्षुषोपायैरेव कृतम् । अधुना फोटोचित्रोपपद्धत्यावान्तरग्रहाः सरलतयान्विष्यन्ते । पृथिवी-
गतिरसमगतिकेन चलितेन दूरदर्शकयन्त्रेण, फोटोफलके होराद्वयस्य होरात्रयस्य प्रकाशदर्शनं प्रदाय
फोटोचित्रं गृह्यते । अस्मिन् चित्रे नक्षत्राण्यचलत्वाद् बिन्दव इव दृश्यन्ते, परन्त्ववान्तरग्रहा
गतिशीलत्वात् क्रमणचिह्नरूपेण लभ्यन्ते ।^१ अनेन विधिना प्रायः १,५०० संख्याका अवान्तरग्रहा
उपलब्धाः सन्ति ।

७.४२ विस्तार आकारश्च

अवान्तरग्रहाणां परिमाणमल्पकम् । यद्येते सर्वे १५०० संख्याका मिलित्वैकः पिण्डो
भवेयुः, तर्हि स पिण्डश्चन्द्रतुल्यो भवेत् । अवान्तरग्रहेषु कतिपयास्त्ववान्तरग्रहाः केवलं क्रोशार्ध-
मितव्यासकाः । प्रायेण च तेषां व्यासाः ५०-क्रोशार्धाल्पमितः । प्रायो दशसंख्याकानां व्यासः
शतक्रोशार्धाधिकोऽस्ति । 'वेस्टा' नामकस्य व्यासः २४१-क्रोशार्धमितः, पैलसस्य ३०६ क्रोशार्ध-
मितः, विशालतमस्य सेरेसस्य च ४८०-क्रोशार्धमितः ।

कतिपयानां लघुपरिमाणकानामवान्तरग्रहाणामाकारो गोलेतरोऽस्ति । 'एरोस'ग्रहस्य



आकार इष्टिकाकारः, इष्टिकामध्यस्थितोर्ध्वाधररेखां
परितोऽयमक्षभ्रमणं करोति । अस्या इष्टिकायाः
परिमाणानि १५ क्रोशार्धानि $\times$ ५ क्रोशार्धानि
 $\times$ ५ क्रोशार्धानि सन्ति ।

७.४३ परिक्रमणानि

प्रायेण कक्षा वृत्ताकारा अथवेषद्वृत्ताकाराः
सन्ति । ग्रहाश्च सर्वे राशिचक्रे भ्रमन्ति, कक्षा-
गमनञ्च क्रान्तिवृत्तादत्यधिकं न । परन्तु सन्ति

केचन येषां विचित्रा गतिः । 'हिडल्गो' नामकस्योत्केन्द्रिता ६६ मित्ता, कक्षागमनञ्च ४३°
मितम् । अस्योच्चत्रिन्दुः शनिकक्षायाः समीपं वर्तते ।

सर्वे एते ग्रहाः पश्चिमतः पूर्वं गच्छन्ति । एषां परिक्रमणकालः ३ $\frac{१}{२}$ -वर्षादारभ्य ६-वर्ष-
पर्यन्तमस्ति ।

गुरुः

शुक्रं विशेषावस्थासु च भौमं विहाय ग्रहाणां भासुरतमो गुरुः । ग्रहाणां मध्ये विशाल-
तमस्यास्याक्षभ्रमणकालो न्यूनतमः । अस्य विम्बे मेखला दृश्यन्ते, एकादशसंख्याकाश्चास्योपग्रहाः
सन्ति, अत एव दूरदर्शकेऽस्याद्भुतं दर्शनम् ।

१ एवं प्रथमं क्रमणचिह्नेनानुमीयते ग्रहसत्ता, पुनर्दूरदर्शकयन्त्रमेवं भ्रास्यते यद्
नक्षत्राणि तदा क्रमणचिह्नरूपेण दृश्यन्ते, ग्रहश्च बिन्दुरूपेण । अनया पद्धत्या
प्रदाय दीर्घप्रकाशदर्शनं धूमिलग्रहा अपि लभ्यन्ते ।

१४६

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

७.५१ परिक्रमणम्


गुरुः सूर्ये परितः ४३३२.६ दिनेषु (११.८६-वर्षेषु वा) परिभ्रमति । दीर्घवृत्ताकार-
कक्षाया मध्यमकर्णः ४८,३३,००,००० क्रोशार्धमितः, सूर्यादल्पतमदूरत्वं ४६,००,००,०००
क्रोशार्धानि, दीर्घतमदूरत्वञ्च ५०,६०,००,००० क्रोशार्धानि । दीर्घवृत्तस्योत्केन्द्रिता ०.४८३
मिता । युतिकालश्च ३९९ दिनानि लभ्यते । युतौ गुरोर्भुवो दूरत्वं ५,६७,००,००० क्रोशार्धानि
भवति, प्रतियोगे (षड्भान्तरे) च केवञ् ३,९०,००,००० क्रोशार्धानि । युतौ विम्वन्यासः
३२ विकलमितः, सर्वानुकूलप्रतियोगे च ५० विकलमितो भवति ।

७.५२ अक्षभ्रमणम्

गुरुष्टुष्टे चिह्नानि दृश्यन्ते, अत एवाक्षभ्रमणकालनिर्णये सरलता विद्यते । विषुवप्रदेशाः
९हो ५० मि २५ से समयेन, मध्यमकटिवन्धप्रदेशाश्च ९हो ५५ मि ४० से समयेनैकमक्षभ्रमणं
कुर्वन्ति । अक्षभ्रमणवेगस्यातिवस्त्वाद् ध्रुवनिम्नता $\frac{1}{3}$ लभ्यते, अर्थाद् ध्रुवलङ्गनव्यासमानं
८२,८०० क्रोशार्धानि, विषुवलङ्गनव्यासमानञ्च ८८,७०० क्रोशार्धानि ।

७.५३ वायुमण्डलं तापक्रमश्च

गुरौ वायुमण्डलं वर्तत इति निर्विवादम् । निम्नफोटोचित्रद्वय एकं फोटोचित्रं नीललोहितो-
त्तरकिरणेषु गृहीतम्, द्वितीयञ्चोपरक्तकिरणेषु गृहीतम् । उपरक्तच्छायाचित्रागतविम्बं नीललोहितो-



उपरक्ते

नीललोहितोत्तरे

गुरोरुपरक्ते नीललोहितोत्तरे छायाचित्रे

(एक उपग्रहः, तच्छाया च संक्रमणं कुर्वन्तौ दृश्येते, विशालरक्तचिह्नं नीललोहितोत्तरच्छाया-
चित्र उपरिभागे दृश्यते ।)

[मैकडोनल्ड-वेधशाला]

सप्तमोऽध्यायः

१४७


त्तरच्छायाचित्रागतविम्बापेक्षया लघुपरिमाणकम् । अत एव वायुमण्डलं वर्तते (कारणव्याख्यार्थं द्रष्टव्या पृष्ठ-१९९ तमेऽध्यायिणी) ।

गुरोर्वायुमण्डले हाईड्रोजनं बहुलतया वर्तते । कार्बननाइट्रोजने अपि पूर्वमास्ताम्, यतोऽत्र 'मीथेन'वाष्पम्, अमोनियावाष्पञ्च लभ्येते ।

मेघानां तापक्रमः—१३० सेन्टीग्रेडमितः । अस्मिन् तापक्रमे मीथेनवाष्पं वाष्परूपेण वर्तते, परन्त्वमोनियावाष्पं घनीभवति ।

७.५४ गुरो रचना

विषुवप्रदेशानां बहिर्ऽन्तस्त्वस्य मानं यावन्मात्रकं प्रत्यक्षवेधेन दृश्यते तावन्मात्रकादधिकं गणनया लभ्यते । अत एवेदं प्रतीयते यद् गुरुः केन्द्रवर्तिभागेषु घनः पृष्ठतले च विरलः । 'विल्ड'-महोदयेन गुरो रचनायाः काल्पनिकचित्रमालिखितं तदधो दीयते—



७.५५ पृष्ठचिह्नानि

दूरदर्शकेन दृष्टो गुरुर्विवृणोति विभिन्नवर्णान्, नैकानि च पृष्ठचिह्नानि । विषुवप्रदेशे वर्तते एका मेखला त्वीषत्पीतवर्णा । तस्या उपर्यधश्च समानान्तराः श्यामलाः प्रकाशमानाश्च मेखला दृश्यन्ते । मेखलास्वक्षभ्रमणजनितवायुमण्डलीयप्रवाहा द्रुतगत्या विचलन्तो यत्र तत्रानिय-

१ मीथेन (CH_4) कार्बन-हाईड्रोजनयोः संयोगेन, अमोनिया च (NH_3) नाइट्रोजन-हाईड्रोजनयोः संयोगेनोत्पद्येते ।

१४८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

मिताकारा मेघाश्च दृश्यन्ते । एतानि प्रवाह-मेघादिजनितचिह्नानि परिवर्तनशीलानि—कानिचित् शीघ्रतया, कानिचिद् विलम्बेन वा ।



सितम्बर १४

अक्टूबर ६

नवम्बर ३०

गुरौ मेघचिह्नानि

[लावेल-वेधशाला]

७.५५१ विशालरक्तचिह्नम्

सर्वप्रथमं ख्रिस्ताब्दे १८७८-तमे ज्योतिर्विद्भिर्गुरुपृष्ठेऽस्य स्थितिर्विज्ञापिता । तदेदं पाठ्यलितं दीर्घवृत्ताकारं चासीत् । अधुनेदं दक्षिणकटिग्रन्थे (दूरदर्शके पतिते विम्बे चोत्तरार्धे) दृश्यते । अस्य परिमाणञ्च ३०,००० क्रोशार्धानि दैर्घ्यं, ७०,००० क्रोशार्धान्यायामे ।

अस्य समीपमुत्तरेण द्वितीयं चिह्नं दृश्यते । सर्वप्रथमं १९०१-तमे ख्रिस्ताब्दे तस्य दर्शन-मभवत् । अस्य दैर्घ्यं ४५,००० क्रोशार्धमितम्, अक्षभ्रमणकालश्च विशालरक्तचिह्नस्याक्षभ्रमण-कालात् किञ्चिदल्पमितः, अत एव प्रत्येकस्मिन् तृतीये वर्षे तद् विशालरक्तचिह्नस्य पार्श्वतो गच्छति ।

७.५६ उपग्रहाः


सन्ति गुरोरेकादशोपग्रहाः । तेषां त्रयो वर्गाः—प्रथमवर्गे पञ्च समीपवर्तिन उपग्रहाः, ते च पश्चिमतः पूर्वं परिक्रामन्ति । द्वितीयवर्गे त्रयो दूरवर्तिन उपग्रहाः, तैऽपि पश्चिमतः पूर्वं परिक्रामन्ति । तृतीयवर्गे त्रयोऽतिदूरवर्तिन उपग्रहाः, ते च पूर्वतः पश्चिमं परिक्रामन्ति ।

प्रथमवर्गीयोपग्रहेषु विद्यन्ते चत्वारो भासुरा उपग्रहाः (ते १४९ पृष्ठस्थचित्रयोः स्पष्टतया दृश्यन्ते), एकोऽतिधूमिल उपग्रहः । तेषां परिक्रमणकक्षा प्रायो वृत्तकारा । अत्र परिमाणविषये द्वावस्माकं चन्द्राद् विशालतरौ, द्वावस्माकं चन्द्रेण तुल्यौ, एकश्च (ग्रहान्नेदिष्ठः) चन्द्राद् लघूयान् ।

संक्षमोऽध्यायः

१४६


द्वितीयवर्गीयोपग्रहाणां परिक्रमणकालः प्रायः २६०-दिनमितः, त उपग्रहाश्च ७,००, ०००-क्रोशार्धदूरत्वे स्थिताः सन्ति । तृतीयवर्गीयाणां च परिक्रमणकालः प्रायः ७००-दिनानि, दूरत्वञ्च १५,००,००० क्रोशार्धानि ।



गुरोश्चत्वारो भासुरा उपग्रहाः

[यरकिज्ञ-वेधशाला]

७.५७ उपग्रहाणां ग्रहणं संक्रमणं छायासंक्रमणम् आच्छादनञ्च



चत्वारो भासुराः

प्रथमवर्गीयोपग्रहाः सर्वदैक
स्मिन्नेव धरातले परिक्रामन्ति,
अस्माकं भूरपि तस्मिन्नेव तले
स्थिता, अत एव त उपग्रहा
वस्तुतः परिक्रमणं कुर्वन्तो-

गुरोश्चत्वार उपग्रहा भुव एकरेखायां चलन्तो दृश्यन्ते ।


ऽप्येकरेखायामेवेतस्ततश्चलन्त

इव दृश्यन्ते । परिक्रमणं कुर्वन्तस्त एकपार्श्वतो गुरोः सम्मुखमागच्छन्ति, पुनर्विम्बमुल्लङ्घ्य
द्वितीयपार्श्वं प्राप्नुवन्ति, ततः प्रत्यागच्छन्तस्ते गुरोः पृष्ठतो गुरुच्छायामतिक्रम्य पुनः पूर्वस्थानमा-

१२०

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

गच्छन्ति । अस्मिन् क्रमे तेषां गुरुविम्बे संक्रमणानि, तेषां छायाणां गुरुविम्बे संक्रमणानि, गुरुविम्बेन तेषामाच्छादनानि, गुरुच्छायया तेषां प्रासाश्च भवन्ति ।



उपग्रहाणां संक्रमणानि, छायासंक्रमणानि, ग्रहणानि,
आच्छादनानि च

संक्रमणानि—अ-स्थान एक उपग्रहो विद्यते । गुरु-भू-प्रोतरेखायां स्थितः स परिक्रमन् गुरोः पृष्ठे दूरदर्शकेन श्यामलचिह्नमिव चलन् दृश्यते (यथा बुधशुक्रौ रविचिम्बे §§ ७.१९, ७.२६) ।

छायासंक्रमणानि—उपग्रहस्य छायापि गुरुपृष्ठे पतति, साऽप्युपग्रहवत् संक्रमणं कुर्वती दृश्यते । चित्रे आ-स्थाने छाया दृश्यते ।


ग्रहणानि—यदा परिक्रमण उपग्रह इ-स्थानं प्राप्नोति तदा स गुरोश्छायां प्रविशति । यथा भूमायां चन्द्रग्रहणं भवति, तथैव गुरुभायामुपग्रहस्य ग्रहणमवलोक्यते ।

आच्छादनानि—परिक्रमण उपग्रहः काले काले गुरुपृष्ठे भवति, यद्यपि तेन गुरुभा वृत्तीर्णा, तथापि गुरुपृष्ठस्थितत्वात् स न दृश्यते (यथा चन्द्रेण नक्षत्राण्याच्छाद्यन्ते § ४.५१) । इदमाच्छादनं कथ्यते ।

७.५८ उपग्रहग्रहणानां महत्त्वम्

सर्वप्रथमं 'रोमर'महोदयेन
 गुरोरुपग्रहाणां ग्रहणेन प्रकाशवेगो
 निर्धारितः । तेन वेधेन दृष्टं
 यत् कदाचिद् ग्रहणं गणनागत-
 कालात् पूर्वम्, कदाचिच्च ग्रहणं
 गणनागतकालस्य पश्चाद् भवति ।
 पुनस्तैन निरीक्षितं यदिदमन्तरं
 भुवः परिक्रमणमार्गे भुवः स्थिति-
 मपेक्षते, यदा भूः गुरोः समीपं
 तदा ग्रहणं पूर्वं भवति, यदा भूः
 गुरोर्दूरवर्तिनी तदा ग्रहणं पश्चाद्
 भवति । सर्वाधिकमीदृशमन्तरं
 $= ८\frac{१}{३}$ मिनटमस्ति । अनेन
 'रोमर'महोदयेन प्रकाशकिरणाः
 सीमितवेगेन गच्छन्तीति साधि-
 तम् । यदा भूगुरोः समीपं तदा
 प्रकाशकिरणा अविलम्बेन भुवं
 प्राप्नुवन्ति, ग्रहणञ्च गणनागत-
 कालात् पूर्वं भवति, यदा च
 भूगुरोर्दूरवर्तिनी तदा प्रकाश-
 किरणा विलम्बेन भुवं प्राप्नु-
 वन्ति, ग्रहणञ्च गणनागतकालस्य
 पश्चाद् भवति । यत इदमन्तरं
 $+८' १९''$, पृथिव्याः सूर्याद्
 दूरत्वं $८' १९''$ मितमस्ति ।
 पृथिव्या दूरत्वमन्येनोपायेन ९,
 २९,००,०००-क्रोशार्धानि पूर्व-
 मेव ज्ञातम्, अतः प्रकाशकिरणाः
 $८' १९''$ -समये ९,२९,००,०००
 क्रोशार्धानि चलन्ति, अर्थाद्
 एकस्मिन् सेकिण्डे १,८६,०००
 क्रोशार्धानि चलन्ति ।

उपग्रहग्रहणात् प्रकाशवेगनिर्धारणम्



१५२

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

७.५९ उपग्रहाणां सारिणी

उपग्रहः	विवृतिकारः	वर्षः	गुरोर्दूरत्वम् (क्रोशार्धानि)	परिक्रमणकालः दि हो मि (क्रोशार्धानि)	व्यासमानम् (क्रोशार्धानि)	नाक्षत्रकोटिः
पञ्चमः	बर्नार्ड	१८९२	११२, ६००	० ११ ५७	१०० (?)	+ १३
प्रथमः	गलिलियो	१६१०	२६१, ८००	१ १८ २८	२३००	५
द्वितीयः	"	"	४१६, ६००	३ १३ १४	२०००	६
तृतीयः	"	"	६६४, २००	७ ३ ४३	३२००	५
चतुर्थः	"	"	१,१६९,०००	१६ १६ ३२	३२००	६
षष्ठः	पैरि	१९०४	७,११४,०००	२५० १६	१०० (?)	१४
सप्तमः	"	१९०५	७,२९२,२००	२६० १	४० (?)	१६
दशमः	निकल्सन	१९३८	७,३४०,०००	२६४		
एकादशः	"	"	१४,०००,०००	६९२		
अष्टमः	मेलो	१९०८	१४,६००,०००	७३९	४० (?)	१६
नवमः	निकल्सन	१९१४	१४,९००,०००	७५८	२० (?)	१७

शनिः

भासुरग्रहाणां मध्ये शनेः शनैश्चरत्वं सर्वाधिकदूरत्वं च प्राचीनज्योतिर्विदां सुविदिते एवास्ताम्। अधुना शनिकक्षावहिवर्तिनां मन्दतरगतिकानां वरुणेन्द्रकुबेराणां विवृत्यनन्तरमप्यस्य महिमा कदापि न न्यूनः, यतोऽस्य वलयानि (यानि दूरदर्शकयन्त्रेणैव दृश्यन्ते) सौरमण्डलेऽपूर्ववस्तूनि सन्ति ।

७.६१ परिक्रमणम्

शनिः सूर्ये परितः १०७५९.२ दिनेषु (२९ $\frac{१}{२}$ वर्षेषु वा) परिभ्रमति । दीर्घवृत्ताकार-कक्षाया मध्यमकर्णः ८८,६०,००,००० क्रोशार्धानि । उत्केन्द्रिता च ०.५५९ मिता । सूर्यादस्य दीर्घतमं दूरत्वं ९३,६३,८८,००० क्रोशार्धानि, अल्पतमं दूरत्वञ्च ८३,७१,७०,००० क्रोशार्धानि । भुवोऽस्य दीर्घतमं दूरत्वं १,०३,०९,१२,००० क्रोशार्धानि, अल्पतमं दूरत्वञ्च ७४,२६,४६,००० क्रोशार्धानि ।

युतिकालः ३७८ दिनमितोऽस्ति । युतौ विम्बव्यासः १४ विकलमितः, सर्वानुकूलप्रतियोगे च २० विकलमितः ।

७.६२ अक्षभ्रमणकालः

१० होरा १४ मिनटमितोऽस्याक्षभ्रमणकालः पर्याप्तमल्पः । ('लिक'वेधशालाया हो मि

रश्मिविश्लेषणात्मकविधिनाऽस्य विषुवीयाक्षभ्रमणकालः १० २ मितो लभ्यते) । विभिन्नाक्षांशेषु स्थितानां प्रदेशानां विभिन्नोऽक्षभ्रमणकालः । अस्य व्यासः पार्थिवव्यासस्य नवगुणितः, अक्षभ्रमणकालश्च केवलं दशहोरामितः, अत एव शनिरतिवेगेनाक्षभ्रमणं करोति । अक्षभ्रमणस्य

सप्तमोऽध्यायः

१५३

वेगाधिक्यादत्र ध्रुवनिम्नता पर्याप्ता ००९७ मिता ($\frac{६००}{१०००}$ -मिता) दृश्यते । विषुववर्तिव्यासस्य मानं ७४,९०० क्रोशार्धान्यस्ति, ध्रुवलनव्यासस्य च मानं केवलं ६७,७०० क्रोशार्धानि ।

७-६३ वायुमण्डलं तापक्रमश्च



गुरुवदत्रापि वायुमण्डलं वर्तते । शनेः परिक्षेपणशक्तिः '४२-मिता सान्द्रमेघानामुपस्थितिं सूचयति । वर्णच्छत्रेणापि वायुमण्डलभावो लभ्यते । वर्णच्छत्रे 'अमोनिया'-रेखा अल्पमात्रया 'भीथेन' रेखाश्च बहुमात्रया दृश्यन्ते । तापक्रमः १५५ सेन्टीग्रेडमितो विद्यते ।

७-६४ रचना

शनेर्ध्रुवनिम्नता (मध्यबहिर्लम्बत्वं वा) सौरमण्डले सर्वाधिकमिता, तथापि मध्योत्सारि-शक्तिं विचार्य या गणना कृता तथा मध्य-बहिर्लम्बत्वस्य वेधलब्धमानाद् अधिकतरत्वं प्रकट्यते । गणनागतमानाद् वेधोपलब्धमानस्य न्यूनत्वं मध्यकेन्द्रे घनत्वमधिकं पृष्ठतले च घनत्वं विरलमस्तीति सूचयति । अत एव शने रचना गुरुवदनेन चित्रेण स्पष्टीक्रियते—

७-६५ पृष्ठचिह्नानि

गुरुवदत्रापि विषुवरेखायाः समानान्तरे मेखला दृश्यन्ते, यद्यपि तास्तावन्मात्रं न प्रकाशमाना यावन्मात्रं गुरुमेखलाः । विषुव-प्रान्ताः किञ्चित्प्रकाशमानपीतवर्णकाः, ध्रुव-प्रान्ताश्च ईषद्भूमिलहरितवर्णकाः सन्ति । काले काले श्यामलचिह्नानि दृश्यन्ते, परन्तु तानि सर्वदा क्षणिकानि ।




शनेरेखायाचित्रम्

७.६६ शनिवलयानि

शनिः विषुवरेखातले त्रिभिः समकेन्द्रिकैर्वलयैः परिवेष्टितोऽस्ति । साधारणदूरदर्शकेन वलयत्रये परस्परं भिन्नता न दृश्यते, अर्थादेकमेव वलयं दृश्यते, परन्तु तीक्ष्णदूरदर्शकेन तस्य त्रिसंख्याकत्वं सिध्यति सरलतया । शनेदूरवर्ति वलयं बहिर्वलयं मध्यमदूरवर्ति मध्यवलयं समीपवर्ति चान्तर्वलयं कथ्यते । बहिर्वलयस्य पृथुत्वं ११,००० क्रोशार्धसमम्, मध्यवलयस्य च १८,००० क्रोशार्धमितमस्ति । बहिर्वलय-मध्यवलयमध्ये रिक्तस्थानं वर्तते । अस्य २,२०० क्रोशार्ध-विस्तृतस्य रिक्तस्थानस्य

नाम 'कैसिनी' विभागोऽस्ति । बहिर्वलयमध्यभागोऽपोदृशं रिक्तस्थानं दृश्यते, तस्य नाम 'एनकी' विभागोऽस्ति । अन्तर्वलयं धूमिलमीषत्कृष्णवर्णं दृश्यते इदमर्धपारदर्शकमप्यस्ति ।



वलयत्रयम्

एतानि वलयान्यतिक्रान्ति सन्ति । वलयसमूहस्य व्यासः १,७१,००० क्रोशार्धसमः, गुरोर्व्यासस्य द्विगुणितोऽस्ति ।

कथं तानि सर्वदा न दृश्यन्ते

एतानि वलयानि सर्वदास्माकं दृष्टिपथं नावतरन्ति । एषामदर्शनस्य तिष्ठोऽवस्थाः—


(१) यदा पृथिवीवलयानि चैकस्मिन्नेव धरातले वर्तन्ते, तदानीं वलयानां केवलम् अणिर्दृश्यते सा चातिक्रान्तादृश्यैव ।

(२) यदा सूर्यो वलयानि चैकस्मिन्नेव धरातले वर्तन्ते, तदानीं वलयानाम् अणिरिव सूर्यकिरणैरालोकिता भवति, परन्त्वतिक्रान्तात् सा न दृश्यते ।

(३) यदा वलयानां धरातलं सूर्यपृथिवीमध्ये वर्तते, तदानीं तेषां वलयानामप्रकाशितभागा अस्माकं सम्मुखं वर्तन्ते, अप्रकाशितवाचो न दृश्यन्ते ।

७.६७ वलयानां कलाः

वलयानां धरातलस्य शनिकक्षातः २७° मिता प्रवणतास्ति, वलयानि च सदैव शनिपरिक्रमणक्षयां समानान्तरकाण्येव तिष्ठन्ति, अत एव क्रमशस्तेषां दक्षिणभागा उत्तरभागाश्चास्माकं



सप्तमोऽध्यायः





१२५

समक्षं भवन्ति । परिक्रमणकाले द्विवारं शनिरेवं तिष्ठति यद् वलयधरातलं सूर्यं स्पृशति, प्रत्येकमवसरे शनिर्भुवः कक्षां वर्षैककालेनोल्लङ्घयति । भूः स्वयमेकस्मिन् वर्षे पर्याप्तमितस्ततो भ्रमति, अत एव प्रत्येकस्मिन् ह्यवसरे शनिवलयान्येकवारं लुप्तानि भवन्ति ।

यदा वलयानि पूर्णविस्तारेण दृश्यन्ते तदा तेषामायतिर्व्यासस्य ४५% भवति, वलयानि च तदा शनिप्रकाशस्य १.७ गुणितं प्रकाशं प्रक्षिपन्ति ।

१

३



२

४

७.६८ वलयानां निर्मितिः

वलयानि घनपिण्डा न सन्ति, प्रत्युतासंख्याकानां कणानां परस्परवियुक्तानां समूहाः सन्तीति प्रायेण निश्चितम् । वलयानां पृथक्कणा ग्रहं परितो भ्रमन्ति, केवलमतिदूरवर्तित्वादस्माभिरेकपिण्डरूपेण दृश्यन्ते । विरलकणनिर्मितिः सर्वप्रथमं 'कैसिनी' महोदयेन विज्ञापितासीत्, परन्त्वधुना शतवर्षानन्तरं नैकानि प्रमाणानि दीयन्ते—

(१) गणनाविषयकप्रमाणानि—१८५६ तमे ख्रिस्ताब्दे 'मैक्सवेल' महोदयेन गणितेन सिद्धीकृतं यद् घनद्रव्यमयपिण्डस्य द्रवमयपिण्डस्य वा स्थायिरूपेण तत्र परिभ्रमणं न सम्भवम् (शनैरतिसामीप्यात्), केवलमेकस्मिन्नेव धरातले वृत्ताकारे भ्रमन्तो विरलाः परस्परासम्बद्धपदार्था एवास्यां स्थित्यां स्थायित्वं भजन्ते ।

फ्रेंचगणितज्ञेन 'रोशे' महोदयेनापि गणनयास्य समर्थनं कृतम् । कोऽप्युपग्रहो वलयं वा ग्रहाद् ग्रहव्यासार्धस्य २.५ गुणितदूरत्वान्तरे न तिष्ठति, यदि कदाचिच्चास्मिन्नन्तरे समायाति, तर्हि तस्य पदार्थाश्छिन्ना भिन्ना भवन्ति । शनैर्वलयान्यस्मिन् दूरत्वाभ्यन्तरे वर्तन्ते, अत एव तानि छिन्नानि भिन्नानि भूत्वाधुनासम्बद्धपदार्थमूलकानि ।

(२) वेधोपलब्धप्रमाणानि—रश्मिविश्लेषणात्मकविधिना (डाय्ग्रासिद्धान्तेन) 'कीलर'-महोदयेन शनिसमीपवर्तिभागापेक्षया शनिदूरवर्तिभागानां परिक्रमणकालस्य मान्यं ज्ञातम् ।

१२६

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

बहिर्वलयस्य बहिर्भागस्याक्षभ्रमणकालः १४^{हो} २७^{मि} मितः, मध्यवलयस्य शनिसमीपवर्तिभागस्याक्षभ्रमणकालः ७^{हो} ४६^{मि} मितः, अन्तर्वलयस्य शनिसमीपवर्तिभागस्य चाक्षभ्रमणकालोऽत्यल्पक एव । यदि वलयानि घनपिण्डरूपाण्यभविष्यन्, शनिवर्तिभागस्य शनिसमीपवर्तिभागापेक्षया गतिस्तीव्राऽभविष्यत् ।

‘जेलिमर’महोदयेनापि वलयानां कणमयत्वं साधितम् । यदा सूर्योऽस्माकं पृष्ठे तिष्ठति, वलयानि पूर्णचन्द्र इव प्रकाशन्ते, परन्तु किञ्चिदेवेनान्तरं प्राप्य तेषां प्रकाशः पर्याप्तं न्यूनो भवति । अनेन वलयेषु बहवोऽसम्बद्धकणाः सन्तीति संभाव्यते, यतः कणानां किञ्चिदेवेनान्तरे दीर्घाश्छायाः पतन्ति, छायाभावाच्च प्रकाशहानिर्भवति ।

७.६६ शनैरुपग्रहाः

शनैर्वोपग्रहाः सन्ति । एषां ‘टाइटन’नामक उपग्रहः सर्वाधिकप्रकाशमानोऽष्टमकोटिकनक्षत्रमिव भाति । अयं दूरदर्शकेनैव दृश्यते । चन्द्राद् विशालतरोऽयमेवैकाग्र्युपग्रहो यत्र वायुमण्डलं वर्तते । अस्य वर्णश्च किञ्चिद् रक्तपीतः ।

शनैर्दूरतमोः ‘फोब’नामक उपग्रहो विचित्रगतिकोऽस्ति । अयं पूर्वतः पश्चिमं परिक्रामति ।

निम्नलिखितसारिण्यामुपग्रहाणां दूरत्वादयो वर्णिताः सन्ति ।

७.६६१ शनैरुपग्रहाणां सारिणी

नाम	विवृतिकारः	अब्दः	दूरत्वं शनेः (कोशार्धानि)	परिक्रमणकालः दि हो मि	व्यासमानं (कोशार्धानि)	नाक्षत्र- कोटिः
मिमस्	हर्शल	१७८९	१,१५,०००	० २२ ३७	३०० (?)	१२
एन्केलडुस	”	”	१,४८,०००	१ ८ ५३	३०० (?)	१२
ट्रेथस्	कैसिनी	१६८४	१,८३,०००	१ २१ १८	६०० (?)	११
डाइना	”	”	२,३४,०००	२ १७ ४१	६०० (?)	११
री	”	१६७२	३,२७,०००	४ १२ २५	९०० (?)	१०
टाइटन	ह्यूप्स	१६५५	७,५९,०००	१५ २२ ४१	२९००	८
हाइपेरियन	ब्रांड	१८४८	९,२०,०००	२१ ६ ३८	३०० (?)	१३
आइपेटस	कैसिनी	१६७१	२२,१०,०००	७९ ७ ५६		११
फोब	पिकरिंग	१८९८	८०,३४,०००	५५० — —	२०० (?)	१४

७.७१ चरुणः (यूरेनस)


प्राचीनायां ज्योतिर्विद्यायां सौरमण्डलेऽन्तिमग्रहः शनिरासीत् । ज्योतिर्विदां सौरमण्डलीयग्रहाणां विषये शनिपर्यन्तञ्च ज्ञानमासीत् । बुधादीनां ग्रहाणां विवृतिः केन कदा कृतेति न जानाति कोऽपि, यतः सर्वत्र ज्योतिर्विदामेषां ज्ञानमासीत् । परन्तु सहस्राधिकवर्षपर्यन्तं न कस्यचिदपि ग्रहस्य विवृतिर्जाता । १७८१-तमे ख्रिस्ताब्दे मार्चस्य १३-तमे दिनाङ्के ‘सरविलियमहर्शल’महोदयेन-

सप्तमोऽध्यायः

१५७

कोऽन्यनक्षत्रेभ्यो भासुरतरो ज्योतिर्विन्दुदृष्टः स्वरचितेन नवदूरदर्शकेन । यदाधिकशक्तिकं चतुस्तालं दूरदर्शके तेन स्थापितं तदा तस्य बृहत्तरं विम्बं जातम् । एवं तस्यानक्षत्रत्वं सिद्धम् । कालान्तरे भ्रष्टस्थानः स प्रथमं धूमकेतुर्मतः, परन्तु वर्षपर्यन्तकृतगणनया तस्य कक्षावृत्तं दीर्घवृत्ताकारं लब्धम् । ततस्तस्य ग्रहभावः सिद्धः, तस्य नाम च 'यूरेनस' कृतम् ।

वरुणस्य सूर्यकेन्द्राद् दूरत्वं १,८०,००,००,००० क्रोशार्धमितम् । प्रतिसेकिण्डं ४-क्रोशार्धगत्या दीर्घाकारकक्षायां परिभ्रमन् वरुणः ३०६८६ दिनेषु (८४ वर्षेषु) सूर्यस्य परिक्रमं करोति । अस्य कक्षाया उत्केन्द्रिता ०.४७१-मिता, कक्षाणमनञ्च ०°४६' कलामितम् । वरुण आकाशे षष्ठकोटिकनक्षत्रमिव भाति दूरदर्शके हरिद्वर्णको दृश्यते । अस्य वास्तविकव्यासः ३१,००० क्रोशार्धानि, प्रतीयमानविम्बव्यासश्च ३.८ विकलामितः । अस्य भ्रुवनिम्नता ०.८ मिता, अक्षभ्रमणकालश्च १०.४८ हो ४८ मि मितः । दूरदर्शकेनास्मिन् शनाविव धूमिला मेखला दृश्यन्ते, वर्णविश्लेषणेन चास्य निर्मितिः शनिवद् गुरुवच्च निर्धारिता ।



वरुणस्य पञ्च उपग्रहाः

[मैकडोनल्ड-वेधशाला]

वरुणस्य पञ्चोपग्रहाः सन्ति (द्रष्टव्यमत्र फोटोचित्रम्) । चत्वारः प्रकाशमानाः, पञ्चमो ग्रहस्य समीपतमो धूमिलश्च । सर्वे तीक्ष्णदूरदर्शकयन्त्रैरेव दृश्यन्ते । तेषां कक्षातलं वरुणकक्षातलात् प्रायः समकोणान्तरे । तेषां दूरत्वादीन्यधो दीयन्ते सारिण्याम् ।

१५८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

७-७११ वरुणस्योपग्रहाणां सारिणी

नाम	विवृतिकारः	अब्दः	दूरत्वं वरुणात् (क्रोशार्धानि)	परिक्रमणकालः दि हो मि	व्यासमानं (क्रोशार्धानि)	नाक्षत्र- कोटिः
मिरण्डा	कीपर	१९४८	८१,०००	१ ९ ५६		१७
एरियल	लैसेल	१८५१	११९,०००	२ १२ २९	६०० (?)	१५
उम्रियल	"	"	१६६,०००	४ ३ २८	४०० (?)	१५
टिटैनिया	हर्शल	१७८७	२७२,०००	८ १६ ५६	१००० (?)	१४
ओवेरन	"	"	३६४,०००	१३ ११ ०७	९०० (?)	१४

७-७२ इन्द्रः (नेपच्यून)


वरुणस्य विवृतिर्यद्यद्भुतासीत्तर्हीन्द्रस्य विवृतिरद्भुततरास्ति, यत् इन्द्रविवृत्यां नेत्रयोर्दूर-दर्शकस्य वोपयोगो न कृतः, केवलं गणनयैवास्य सत्ता प्रकाशिता। विवृतिरियं ज्योतिर्गणित-विद्याया अद्भुतश्चमत्कारः।

वरुणविवृत्यनन्तरं वरुणस्य मार्गो ज्योतिर्गणकैः सुस्थापितः, परन्तु वेधोपलब्धस्थानं सर्वदा गणनागतस्थानात् किञ्चित् पूर्वमासीत्। प्रथमं गणनाऽशुद्धिजनितमिदमन्तरमिति विचार्य पौनः-पुन्येन गणना कृता, परन्तु सर्वदा सर्वथा तामेव शुद्धामवलोक्याकर्षणसिद्धान्तज्ञैर्गणकैरनुमितं तत् कोऽपि ग्रहो वरुणं निजाकर्षणरज्ज्वा गणनागतस्थानगमनाद् अवरुणद्धि।

२८४३-तमे ख्रिस्ताब्दे आंग्लदेशवासिना 'एडम्स'महोदयेनास्याध्ययनं प्रारब्धम्। वर्षद्वयपर्यन्तं तेन गणना कृता, अन्ततः पिण्डस्य परिमाणम्, पिण्डमार्गः, पिण्डः कुत्र कदा दृश्यमानो भविष्यतीति सर्वं तेन लब्धम्। स १८४५-तमे ख्रिस्ताब्दे २१-अक्टूबरे 'ग्रिनिच'-वेधशालायां सर्वं गणनाफलमध्यक्षाय दत्तवान्।

अत्रान्तरे फ्रांसदेशे 'लेविरिए'महोदयेनापीदृशीं गणनां विधाय बर्लिनवेधशालायां अध्यक्षस्य समीपं निजगणनाफलं प्रेषितम्। तत्राध्यक्षेण 'एनकी'-महोदयेन झटिति तस्य ग्रहस्य दर्शनं कृत्वा नूतनग्रहस्य विवृति-जगति विज्ञापिता।

एवं गणनयैव ग्रहस्य विवृतिं कुर्वता 'एडम्स'महोदयेन 'लेविरिए'महोदयेन च विवृते-नूतनपद्धतिरारब्धा। अनयैव पद्धत्या पश्चात् कुबेरस्य विवृतिरभवत्।



इन्द्रः, तदुपग्रहः 'ट्रिटनः' [मैकडोनल्ड-वेधशाला]

सप्तमोऽध्यायः

१५६

पृथ्व्यपेक्षया इन्द्रस्य सूर्याद् दूरत्वं ३० गुणितम् । १६५ वर्षमितोऽस्य परिक्रमणकालः । दूरदर्शकेनायं हरिद्वर्णकोऽष्टमकोटिकनक्षत्रवदाभाति । वर्णच्छत्रविश्लेषणात्मकपद्धत्याऽस्या-
क्षभ्रमणकालः १६ होरामितो भवति ।


इन्द्रस्य द्वावुपग्रहौ । प्रथमश्चन्द्राद् विशालतरः पूर्वतः पश्चिमं परिभ्रमति, द्वितीयो दूर-
वर्ती लघुपरिमाणकोऽतिधूमिलश्च निम्नलिखितसारिण्यां दूरत्वादीनि दीयन्ते—

७.७२१ इन्द्रस्योपग्रहयोः सारिणी

नाम	विवृतिकारः	अब्दः	दूरत्वं इन्द्रात् (क्रोशार्धानि)	परिक्रमणकालः	व्यासमानम् (क्रोशार्धानि)	नाक्षत्रकोटिः
ट्रिटन	लैसेल	१८४६	२२०,०००	५ दि २१ हो ३ मि	२८०० (?)	१३
नेरियड	कीपर	१९४१	— —	वर्षद्वयम्	१०० (?)	१९

७.७३ कुबेरः (प्लूटो)

कुबेरस्यापि विवृतिर्गणनयैवाभवत् । इन्द्रविवृत्यनन्तरं वरुणस्य गतिभेदः किञ्चिद्
व्याख्यातः, परन्तु गणनायामिन्द्रजनितविक्षेपसंस्कारान् कृत्वापि वरुणस्य गतिभेदं व्याख्यातुमस-
मर्था अभवन् ज्योतिर्विदः ।
ख्रिस्ताब्दे १९१५-तमे 'लावेल'-
महोदयेन तस्याज्ञातपिण्डस्य
गणना प्रारब्धा, येनाकृष्टो
वरुणो गतिभेदं प्राप्नोत् ।
दुर्भाग्यवशात् स विवृतेः पूर्वमेव
मृतः, तथापि तस्य सहकारिणः
कार्यतत्पराः सन्तः ख्रिस्ताब्दे
१९३०-तमे मार्चमासे 'लावेल'-
सूचितस्थाने नूतनग्रहस्योप-
स्थितिं फोटोफलके प्राप्तवन्तः ।



लावेलमहोदयस्याज्ञात-
पिण्डविषयकगणना कीदृशी
यथार्थमानानां समीपेति निम्न-
सारिण्या स्पष्टीभवति । गण-
नाया इयं शुद्धिराधुनिकगणि-
तस्यासाधारणं कौशलं प्रकटी-
करोति ।


विवृतिकाले कुबेरः [लावेल-वेधशाला]

१६०

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

गणनया ज्ञातपिण्डस्य मानानि	वेधोपलब्धमानानि
दूरत्वं (ज्योतिष्प्रमापकाणि)	४३.००
परिक्रमणकालः (वर्षाः)	२८२ ००
उत्केन्द्रिता	०.२०२
नीचभोगांशाः	२०४°४८'
कक्षाणमनम्	१०°
नाक्षत्रकोटिः	१३
	३९.५२
	२४८ ४३
	०.२४९
	२२२°३०'
	१७°९'
	१४५

सौरमण्डले कुबेरस्य कक्षाया उत्केन्द्रिता सर्वाधिका, कक्षाणमनञ्च सर्वाधिकम् । उत्केन्द्रिता-मानस्य पर्याप्तत्वात् कुबेरः १९८९-तमे ख्रिस्ताब्दे इन्द्रकक्षाया अपि समीपतरमायास्यति ।



कुबेरस्य कक्षावृत्तम्

७.८ ग्रहाणां सारिणी

नाम	सूर्याद् मध्यम- (ज्योतिःप्रमा- पकाणि)	दूरत्वम् (नियुत- क्रोशार्धानि)	नाक्षत्रकालः (दिनानि)	युतिकालः (दिनानि)	उत्केन्द्रिता	कक्षाणमनम्
बुधः	३८७१	३५.९६	८७.९६९	११५.८८	०.२०६	७°०'
शुक्रः	७२३३	६७.२०	२२४.७०१	५८३.९२	०.००७	३ २४
भूः	१.००००	९२.९०	३६५.२५६		०.०१७	० ०
भौमः	१.५२३७	१४१.६	६८६.९८०	७७९.९४	०.०९३	१ ५१
			(वर्षाः)			
सेरेसः	२.७६७३	२५७.१	४.६०४	४६६.६०	०.०७७	१० ३७
गुरुः	५.२०२८	४८३.३	११.८६२	३९८.८८	०.०४८	१ १८

सप्तमोऽध्यायः

१६१

नाम	सूर्याद् मध्यम (ज्योतिष्प्रमा- पकाणि)	दूरत्वम् (नियुत- क्रोशार्धानि)	नाक्षत्र-कालः (दिनानि)	युतिकालः दिनानि	उत्केन्द्रिता कक्षागमनम्	
शनिः	९५३८८	८८६.२	२९.४५८	३७८.०९	०.०५६	२ २९
वरुणः	१९.१९१०	१७८३	८४.०१५	३६९.६६	०.०४७	० ४६
इन्द्रः	३०.०७०७	२७९४	१६४.७८८	३६७.४९	०.००९	१ ४७
कुवेरः	३९.४५७४	३६७०	२४७.६९७	३६६.७४	०.२४९	१७ ९
नाम	व्यासमानं (क्रोशार्धानि)	पिण्डमात्रा [पार्थिवपिण्ड- मात्रा १ =१]	घनत्वम् अक्ष- जलस्य=१ भ्रमण- कालः दि	विषुवरेखायाः प्रवणता (क्रान्तिसूत्रात्)	ध्रुव- निम्नता	महत्तमभास्वर- त्वकाले नाक्षत्र- कोटिः
सूर्यः	८६४०००	३३१९५०	१.४१	२४.६५	७°१०'	० —२६.८
चन्द्रः	२१६०	०.०१२	३.३३	२७.३२	६ ४१	० —१२.६
बुधः	३१००	०.०४	३.८	८८		० —१.९
शुक्रः	७७००	०.८१	४.८६	३० (?)		० —४.४
भूः	७९२७	१.००	५.५२	२३ ^{हो} ५६ ^{मि}	२३°२७'	१/२९६
भौमः	४२१५	०.११	३.९६	२४ ३७ २४	१/१९२	—२.८
गुरुः	८८६४०	३१६.९४	१.३४	९ ५० ३ ७	१/१५	—२.५
शनिः	७४१००	९४.९	०.७१	१० ०२ २६ ४१	१/९.५	—०.४
वरुणः	३२०००	१४.७	१.२७	१० ४५ ९८	१/१४	+५.७
इन्द्रः	३१०००	१७.२	१.५८	१५ ४८ २९	१/४०	+७.६

ॐ

अष्टमोऽध्यायः

धूमकेतुः

[सौरमण्डले भ्रमतां ग्रहव्यतिरिक्तपिण्डानां स्वरूपगत्यादीन्यत्र द्रष्टव्यानि ।]

८.१ धूमकेतवः

धूमकेतव उत्पातचिह्नानीति प्राचीनानां प्रसिद्धिः । अस्याः प्रसिद्धेर्मूलं तेषां विरलागमनमेव, यतो विरलदर्शनेषु प्रायेण रहस्यपूर्णशक्तिमत्ता मन्यते । वस्तुतः प्रकाशमानानां चाक्षुष- (चक्षुर्दृष्ट) धूमकेतूनां दर्शनं विरलमेव । मानवस्य शतवर्षायुष्के जीवने दशाधिकानां नेत्रदृष्ट-धूमकेतूनां दर्शनं प्रायोऽसम्भवम् । परमधुना धूमकेतुषु न कापि रहस्यपूर्णा शक्तिर्मन्यते, यतो दूरदर्शकयन्त्रेण तेषां दर्शनानि सुलभान्येव । अकस्मादेव नक्षत्रावलोकनकार्ये सायंकाल आकाशस्य पश्चिमभागे, सूर्योदय आकाशस्य पूर्वभागे ते काले काले दृष्टिपथमवतरन्ति । प्रतिवर्षं पञ्चषकेतव आलोक्यन्ते । एषां त्रयश्चत्वारो वा नूतना धूमकेतवः, शेषाः पुनरागताः पूर्वपरिचिताश्च ।

८.११ परिक्रमणमार्गः

सर्वे धूमकेतव एकरूपेण दृश्यन्ते । न दृश्यते तेषां किमपि स्पष्टं प्रत्यक्षं भेदकम्, येन ते सजातीयेष्वभिज्ञाता भवेयुः । तथापि ज्योतिर्गणकैस्ते सूर्यमभितः स्वपरिक्रमणमार्गेणाभिज्ञायन्ते ।

परिक्रमणमार्गस्य द्वावाकारौ—(१) दीर्घवृत्ताकारः, (२) परवल्याकारश्च । दीर्घवृत्ताकार-मार्गका धूमकेतवो नियमिता आख्यायन्ते, परवल्याकारमार्गाकाश्चानियमिताः ।

दीर्घवृत्ताकारमार्गका धूमकेतवः सूर्यं परितो दीर्घवृत्तेषु भ्रमन्ति । दीर्घवृत्तानामेकस्मिन्नाभौ सूर्यस्तिष्ठति । मार्गस्य दीर्घवृत्ताकारत्वात्ते धूमकेतवः पुनः पुनः सूर्यं प्रत्यागच्छन्ति, तेषां भगण-कालादयोऽपि ग्रहभगणकालादिवानियमिताः । न कस्यापि धूमकेतोर्भगणकालः शतवर्षाधिकः, परमुत्केन्द्रिता च तेषां पर्याप्तमिता, कक्षाणमनञ्च साधारणम् । परिक्रमणे ते ग्रहवत् पश्चिमतः पूर्वं गच्छन्ति ।

परवल्याकारमार्गेण ये धूमकेतवो भ्रमन्ति तेषां परवल्याकारमार्गस्याप्येकस्मिन्नाभौ सूर्य-स्तिष्ठति । परं यथा परवलयस्य द्वे शाखे अनन्तस्थानं प्रति सर्वदा गच्छतः, न च कदापि परिवर्तते, तथा धूमकेतव एत एकदा सौरमण्डलेऽतिथिरूपेणागच्छन्ति, पुनश्च न दृश्यन्ते । एषां कक्षा-णमनं पर्याप्तमितम् । एषामर्धाः पूर्वतः पश्चिमं भ्रमन्ति, अर्धाश्च पश्चिमतः पूर्वं भ्रमन्ति ।


८.१२ धूमकेतोः स्वरूपम्

धूमकेतोः त्रीणि प्रमुखाङ्गानि—(१) शीर्षम् (नाभ्यावरणं), (२) नाभिः, (३) पुच्छश्च । अत्र पुच्छमस्य महत्तममङ्गम्, यतः पुच्छलत्वादस्य नाम 'पुच्छलतारा' प्रसिद्धम् । धूमकेतुशब्दस्य व्युत्पत्त्यापि धूमपूर्णकेतोः (धूमपूर्णपुच्छस्य) महत्ता दृश्यते ।


सर्वेषां धूमकेतूनां शीर्षमवश्यं विद्यते । तन्यूनाधिकं वृत्ताकारम् । इदं मेघसदृशं पर्याप्तं धूमिर्न महापरिमाणकञ्च । अस्य व्यासो न कदापि १५,००० क्रोशार्धादल्पः ।

शीर्षमध्यभागो नाभिरुच्यते । केन्द्रभागस्थेयं नाभिर्नक्षत्रमिव भाति । अस्याकारश्च गोलः, परिमाणञ्चाल्पं ५००-९०० क्रोशार्धमितकम् । धूमकेतोः क्वचिद् द्वे नाभी, क्वचिदेका नाभिः (साऽपि केवलं सूर्यसामोप्ये), क्वचिदेकापि न ।

तृतीयमङ्गं पुच्छमस्य प्रधानमङ्गम् । पुच्छमतिदीर्घं (कदाचित् कोटिक्रोशार्धमितमपि) परिमार्जिनीव दृश्यते । सा शीर्षाद् निस्सरति । पुच्छं शीर्षापेक्षया किञ्चिद् धूमिलम् । तत् कस्मात् स्थानाद् निःसृतमिति निश्चयो दुष्कर एव । यद्यपि पुच्छं सर्वाधिकदीर्घाङ्गं प्रमुखञ्च, तथापि कतिपयानां दूरदर्शकेनैव दृष्टानां लघुधूमकेतूनां पुच्छं न विद्यते ।




धूमकेतु १९१०-अ
[लावेल-वेधशाला]



धूमकेतु-१९४८
[लावेल-वेधशाला]

८.१३ पुच्छम्-उत्पत्तिर्गतयश्च

यदा धूमकेतुः सूर्यस्य सामीप्यं भजते तदा तस्यैकं पुच्छं जायते । पुच्छं शीर्षात् सूर्य-प्रतिकूलदिशायां प्रथमं निस्सरति । यथा यथा सूर्यस्य समीपं धूमकेतुर्गच्छति तथा तथा पुच्छं दीर्घं दीर्घतरञ्च भवति । एवं पुच्छं वस्तुतः शीर्षस्थबाष्प-सूक्ष्मरजःकण-समूह एव, यः सूर्यप्रकाश-किरणैः प्रणुदितः सूर्यप्रतिकूलदिशायां शीर्षाद् निस्सरति । एवं सूर्यकिरणप्रणोद एव पुच्छस्य हेतुः ।



पुच्छनिर्माणम्

पुच्छस्य तिस्रो गतयः । प्रथमा तद् नामेः प्रतिसेकिण्डं नैकक्रोशार्धगत्या वहिर्निस्सरति । द्वितीया यथा यथा पुच्छं शीर्षाद् दूरं भवति तथा तथा प्रणोदाल्प-त्वात् तस्य परिमाणं वर्धते । अत एव तत् सूर्यप्रतिकूलदिशायां शृङ्गाकारं भवति । तृतीया सूर्यं परितो भ्रमणशीलत्वात् 'केप्लर'नियमेन पुच्छस्य सूर्यदूरवर्तिभागा

मन्दगत्या भ्रमन्ति, सूर्यसमीपवर्तिभागाश्च शीघ्रगत्या भ्रमन्ति । अत एव पुच्छं नामेः पञ्चा-त्तिष्ठति, अर्थात् पुच्छं किञ्चिद् वक्रतां भजते ।

पुच्छे यानि बाष्पाणि विरलसूक्ष्मरजःकणाश्च वर्तन्ते तेषां विषपूर्णप्रभावो भूवासिनां भविष्यति यदि धूमकेतोः पुच्छं भुवः समीपं भूवायुमण्डलमध्याद् वा गच्छतीति साधारणजनानां मन्यं न निर्मूलम् । तथापि पुच्छस्य बाष्पाणीयद्विरलानि यत् ख्रिस्ताब्दे १८६१-तमे १९१०-तमे चेदृशो घटना घटिता, न च कोऽपि प्रत्यक्षविषपूर्णप्रभावो दृष्टः ।

८.१४ वर्णच्छत्रम्

वर्णच्छत्रे काश्चिद् रेखाः सूर्यवर्णच्छत्रीयरेखासमाः काश्चिच्च सूर्यवर्णच्छत्रीयरेखाभ्यो भिन्ना दृश्यन्ते । अत एव धूमकेतुप्रकाशकिरणेषु केचन किरणा धूमकेतुकणपरवर्तिताः सूर्यप्रकाश-किरणा एव, केचन च धूमकेतोः स्वकीया इति सिद्धयति । धूमकेतोः स्वकीयकिरणानां वर्ण-च्छत्रीयरेखाभिर्ज्ञायते यत्तत्र बाष्पाणि सूर्यकिरणप्रणुदितानि सन्ति प्रकाशमानानि भवन्ति । वर्णच्छत्रविश्लेषणेन C_2 , NH , CN , CH , OH आदिव्यूहाणूनामुपस्थितिः सूच्यते । एतेषु व्यूहाणुषु कतिपया व्यूहाणवः पृथिव्यां न लभ्यन्ते ।

८.१५ पिण्डमात्रा, रचना च

धूमकेतुर्मुख्यतयौलिकद्रव्यरचितो भवति । एते विरलघनत्ववन्त औलिकद्रव्यकणाः सूक्ष्मरजोभिर्मिश्रितबाष्पैः सम्मिलिता भवन्ति । सूर्यसामीप्ये बाष्पाण्यौलिकद्रव्यकणोभ्यः पृथग् भूत्वा सूक्ष्मरजःकणैः सह नाभ्यावरणं रचयन्ति, ततः सूर्यकिरणप्रणुदितानि भूत्वा पुच्छं रचयन्ति । तत्र


१. प्रकाशस्यापि भारो वर्ततेऽयमाश्चर्यविषयः परं विज्ञानविद्भिः सुसाधितः ।

च परावर्तितसूर्यकिरणैः सूर्यप्रकाशप्रणुदनजनितब्राह्मीयप्रकाशकिरणैश्च भास्वरत्वं दृश्यते ।
औलिकद्रव्यकणेश्चो ब्राह्मणां पृथग्भवनस्य, नाभ्यावरणपुच्छरचनायाः प्रकाशमानत्वस्य च प्रक्रिया
शनैः शनैः सूर्याद् दूरत्ववृद्धौ समाप्ता भवति । अन्ततोऽप्रकाशमान औलिकद्रव्यपुञ्ज एव
धूमकेतुर्भवति । पिण्डमात्रा नूनं किञ्चिद् न्यूना भवति, यतः पुच्छरूपेण निस्सृता पिण्डमात्रा
प्रायेण पुञ्जे पुनर्नागच्छति ।

धूमकेतोः परिमाणं सुदीर्घकम्, पिण्डमात्रा चाल्पा, अत एव तस्य घनत्वमत्यल्पमितम् । ग्रहस्योपग्रहस्य सामीप्येऽपि धूमकेतुमार्गस्य च्युतिहीनत्वमत्रैकं प्रमाणम्, पुच्छानां पारदर्शकत्वं द्वितीयम् ।

८.१६ धूमकेतूनां परिवाराः

दीर्घवृत्ताकारमार्गकाणां धूमकेतूनां प्रायेण त्रिशत्संख्याका गुरुपरिवारीयाः कथ्यन्ते । एतेषां सर्वेषामुच्चबिन्दुः संपात-
बिन्दुर्वा गुरुकक्षायाः समीपे दृश्यते । भगणकालः पञ्चवर्षा-
धिको नववर्षाल्पश्च भवति । कक्षाणमनं साधारणमेव दृश्यते । सर्वे पश्चिमतः पूर्वं भ्रमन्ति । 'एन्की' धूमकेतुरस्मिन्नेव परि-
वारे वर्तते, स प्रत्येकस्मिन् चतुर्थे वर्षे दृश्यते ।



ग्रहेषु गुरोः पिण्डमात्रा
सर्वाधिका, अत एव स समर्थः
पर्याप्तसंख्यायां धूमकेतूनां वन्दी-
करणे । अन्यैरपि ग्रहैः कतिपया
धूमकेतवो वन्दीकृताः—शनिना
त्रयः, वरुणेन द्वौ, इन्द्रेण चत्वारौ ।

८.१७ धूमकेतूनां वर्गः

सन्ति कतिपया धूमकेतवो येषां कक्षातत्त्वानि प्रायः समानानि । एते एकवर्गीयाः कथ्यन्ते । १६६८-१८४३ प्रथम-१८८२ द्वितीय-१८८७ प्रथमधूमकेतव एकवर्गीयाः सन्ति । एते सूर्यस्यातिसमीपमपि गच्छन्ति । १८८२ ख्रिस्ताब्दस्य सितम्बरमासे दृष्टः १८८२-द्वितीय-धूमकेतुरद्भुत आसीत् । स दिवाप्यदृश्यत । स सूर्यप्रभामण्डलमध्यात् सूर्यपृष्ठस्य ३,००,००० कोशार्धदूरत्वान्तरे प्रतिहोरं कोटिकोशार्धगत्या निरगच्छत् । सूर्यस्यातिसमीप्या-

१. अस्माकं वायुमण्डलापेक्षया $\frac{1}{50,000,000,000,000,000}$ ($= \frac{1}{5 \times 10^{16}}$)
भागमिता हालिकेतोः पिण्डमात्रा ।

१६६



अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

तस्य नाभिश्चतुर्धाभवत् । अर्थादेक एव धूमकेतुश्चतुर्धाऽभवत् । चत्वारो नवसृष्टा धूमकेतवः पृथग्भूय भ्रमन्ति । तेषां परिक्रमणकालः क्रमशः ६६४ वर्षाणि, ७६९ वर्षाणि, ८७५ वर्षाणि, ९५९ वर्षाणि चास्ति, अत एव ते २५-तमशतकात् प्रारभ्य २८-तमशतकपर्यन्तं पुनरेकवारं द्रक्ष्यन्ते ।

८.१८ प्रसिद्धा धूमकेतवः

हालिधूमकेतुः

सर्वप्रथमं 'न्यूटन'महोदयेन धूमकेतूनां ग्रहवत् सूर्यपरिक्रमणमनुमितम्, परं न तेन कृता कस्यचन धूमकेतुविशेषस्य गणना । तस्य मित्रेण 'हालि'महोदयेन १६८२-तमे ख्रिस्ताब्दे तत्कालदर्शनागतधूमकेतोः कक्षावृत्ततत्त्वानि गणयित्वा, तस्य परिक्रमणकालस्य मानं ७५-वर्षाणि लब्धम् । पूर्वोल्लेखैस्तेन दृष्टं यत् प्रत्येकं ७५-तमे वर्षे एको धूमकेतुरदृश्यत । अत एव हालि-



हालिधूमकेतुः

महोदयेन १७५८ तमे ख्रिस्ताब्दे धूमकेतोः पुनर्दर्शनं भविष्यतीति घोषितम् । हालिमहोदयोऽति वृद्ध आसीत्, पुनरागमनात् पूर्वमेव पञ्चत्वं गतः; तथापि पूर्वसूचितवर्षे पूर्वसूचितस्थाने धूमकेतो-


अष्टमोऽध्यायः

१६७

दर्शनमभवत् । धूमकेतोश्च नाम 'हालि' धूमकेतुः कृतो ज्योतिर्विद्भिः । हालिधूमकेतुः १९१०-तमे ख्रिस्ताब्दे दृष्ट आसीत् । पुनरयं १९८६-तमे ख्रिस्ताब्दे द्रक्ष्यते ।

'श्वासमन-वारमन'-धूमकेतुः (१६२५-द्वितीय-धूमकेतुः)

१९२७-तमे ख्रिस्ताब्दे लब्धो धूमकेतुर्ग्रहवद् भ्रमति । अस्य कक्षावृत्तं पूर्णतया गुरुकक्षा-शानिकक्षा-मध्ये वर्तते । साधारणतोऽयमष्टादशकोटिकनक्षत्रमिव भाति, परन्तु काले कालेऽस्य भास्वरत्वमकस्माद् वर्धते स्म । १९३४-तमे ख्रिस्ताब्दे चतुर्दिवसान्तरे तस्य भास्वरत्वमकस्मात् शतगुणितमभवत् । (द्रष्टव्यं निम्नं फोटोचित्रम्)—



धूमकेतु-१९२५-द्वितीयस्यौज्ज्वल्ये विकासः

[यरकिज-वेधशाला]

विण्ळा-धूमकेतुः

सर्वप्रथमं १८२६-तमे ख्रिस्ताब्दे 'विण्ळा'-महोदयेन गणनयास्य परिक्रमणकालः ६३ वर्षमितो निश्चितः । यदायं केतुः १८४६-तमे ख्रिस्ताब्दे दृष्टस्तर्हि स द्विषा दृष्टः । तस्य द्वौ भागौ पृथक् पृथक् भ्रमन्तौ दृष्टौ । १८५२ तमे ख्रिस्ताब्दे द्वौ भागौ द्वौ धूमकेतुः अभवताम् । १८५९-तमे, १८६६ तमे ख्रिस्ताब्दे च महाप्रयत्नैरप्येतयोर्दर्शनं नाभवत् । परन्तु १८७२ तमे ख्रिस्ताब्दे गणनागतदर्शनकाले २७-नवम्बरे पृथिव्या उपर्यसंख्या उल्का अपतत् । एवं प्रतीयते यद् धूमकेतुः डिन्नमिन्नो भूत्वा झुल्कापुञ्जोऽभवत् । एवं धूमकेतवो यदा कदा विनाशं गच्छन्ति ।

८.२ उल्काः

यदा कदा रजनीकरविहीनायां निशागामाम्बरे रत्नवस्त्रकाशमानेषु नक्षत्रेषु कतिपये प्रकाशविन्दवा दृश्यन्ते, ये क्षणं भ्रमणकुले चलन्त एव लुप्ता भवन्ति । साधारणजनेषु कोपोऽयं

तारापतननाम्ना प्रसिद्धः । परन्विदं वस्तुतस्तारापतनं न, न चैते पिण्डा वस्तुतस्ताराः । तारा (नक्षत्राणि) अतिविशालाकाराः सन्ति, परन्वेते पिण्डाः केवलं प्रकाशहीना अतिलघुपिण्डाः । एते लघुपिण्डा भुवः समीप्ये, भुव आकर्षणशक्त्याकृष्टा वायुमण्डलसङ्घर्षजनिततापेन प्रज्वलिताः सन्तः क्षणिकप्रकाशं प्रदर्श्य भस्मीभवन्ति ।

एषां धूमकेतुभ्यो भिन्नत्वं निम्नतथ्यैः समर्थ्यते—


(१) धूमकेतूनां गतिरतिमन्दा । आकाशे कतिपयदिनपर्यन्तं (केचन नैकसप्ताह-पर्यन्तमपि) दृश्यन्ते, रात्र्याः सर्वप्रहरेषु च चन्द्रवद् आलोक्यन्ते । उल्काः क्षणमाकाशेऽचिरप्रभया प्रकाशन्ते, क्षणिकां दीप्तिञ्च प्रदाय विलीना भवन्ति । एषां प्रकाशमानरेखा मिनटैककालपर्यन्तं दृश्यन्ते ।

(२) धूमकेतवः सुदूरवर्तिगोलीयपिण्डाः सन्ति, उल्काश्च प्रकाशमानकाले भुवो वायुमण्डले भवन्ति ।

(३) धूमकेतवः परिमाणे पृथिव्या बृहत्तराः सन्ति (केचन तु सूर्य इव विशालकायाः सन्ति । तेषां सर्वेषां मध्यमानं दशपृथिवीसमं गण्यते), उल्काश्च सर्षपदतिसूक्ष्मपिण्डा एव ।

८.२१ उल्कापतनस्य संख्या

प्रतिहोरं १०,००,०००—संख्याका उल्का भुवि पतन्ति (गणनेयं केवलं नेत्रदृष्टोल्का-नामसि) । अर्थात् प्रतिदिनं २,४०,००,०००—संख्याकोल्कानां पिण्डमात्रा पार्थिवपिण्डमात्रया



युज्यते । उल्कानां प्रत्येकं भारोऽ-तिलघुदृश्यते, तथापि प्रतिदिनं पति-तानामुल्कानां सम्मिलितो भारः २४-‘सेर’ मितो भवति ।

उल्का रजन्या उत्तरार्धकालेऽ-धिकं दृश्यन्ते । पूर्वार्धकाले पृथिव्या गोलाकारभागो महाकाशेऽस्माकं सम्मुखं वर्तते । अत एव केवलं पृष्ठत उल्का आगच्छन्ति । प्रातःकाले वयं सम्मुखादरक्षिता भवामः, अत एवोल्का अधिकसंख्यायाम् अधिकवेगेना-

रजन्याः उत्तरार्धकाले उल्का अधिकसंख्याया पतन्ति ।

गच्छन्ति (द्रष्टव्यमत्रत्यं चित्रम्) ।


८.२२ उल्कासम्पातविन्दू

उल्काः सर्वदा समसंख्यायां न दृश्यन्ते । यदा कदा तासां संख्यात्यधिका भवति । एवं प्रतीयते यदाकाश उल्कावृन्दानि भ्रमन्ति । यदा सूर्य परितो भ्रमणे पृथिव्युल्कावृन्दपथमुलङ्घयति तदोल्का महासंख्यायां भुवि पतन्ति । इदमुल्कावृष्टिः कथ्यते ।

अष्टमोऽध्यायः

१६६

यदि तुलकावृष्टयवसरे दृष्टिगोचराणामुल्कासहस्राणां मार्गाः खगोले अङ्कयन्ते, तर्हि ता एकस्माद् बिन्दोरगच्छन्त्यो दृश्यन्ते । बिन्दुरयमुल्कासम्पातबिन्दुरुच्यते (द्रष्टव्यमधश्चित्रम्) ।



उल्कावृन्दानि च सम्पातबिन्दुनामभिः प्रसिद्धानि भवन्ति । (यथा यदि सम्पातबिन्दुः सिंहाराशौ स्थितस्तर्हि उल्कावृन्दं सैही-वृन्दमुच्यते) । उल्कावृन्दानि प्रायेण धूमकेतुमार्गेण सम्बद्धानि भवन्ति (द्रष्टव्यः § ८.१८) । निम्नसारिण्यामुल्कावृन्दानि, तत्सम्बन्धिधूमकेतूनां च नामानि दीयन्ते ।

उल्कावृन्दम्	महत्तमवृष्टिः	सम्बद्धधूमकेतुः	धूमकेतोः परिक्रमण-कालः
वीणाविषयकम्	अप्रैल २२	१८६१-प्रथम	४०० वर्षाणि
कुम्भविषयकम्	मई ४	'हालि'	७६
ययातिविषयकम्	अगस्त ११	१८६२-तृतीय	१२०
कालियविषयकम्	अक्टूबर ९	१९३३-तृतीय	६३
मृगविषयकम्	अक्टूबर २१	हालि	७६
वृषविषयकम्	नवम्बर ९	एनकी	३३
'सैही' (सिंहविषयकम्)	नवम्बर १५	१८६६ प्रथम	३३
देवयानीविषयकम्)	नवम्बर २७	बिएला	६३

८.३ उल्कापिण्डाः


प्रायेणोल्का वायुमण्डलं प्रविश्य भूपृष्ठमलभमाना एव भस्मीभवन्ति, परं याः काश्चन भस्मीभवनादवशिष्टा भूतलं प्राप्नुवन्ति ता उल्कापिण्डाः कथ्यन्ते ।

उल्कापिण्डेषु प्रायः 'मेनेशिया' 'निकेल' लौहचूर्णादीनि लभ्यन्ते । उल्कापिण्डानां भारः 'तोला'द्रयात् प्रारभ्य नैक'मन'पर्यन्तं दृश्यते ।

यदा कदा बृहत्कायका उल्कापिण्डा दृश्यन्ते । उल्कापिण्डाश्च यदा कदातिजवेन भुवि निपत्य तत्र गिरिमुलमपि रचयन्ति (द्रष्टव्यं १७० पृ० प्रथमं चित्रम्) ।


१७०

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्



‘एरिजोना’ स्थाने उल्कापिण्डजनितगिरिमुखम्

८४ राशिचक्रप्रकाशः



राशिचक्रप्रकाशः

अष्टमोऽध्यायः

१७१

उल्कादर्शनवदेकोऽन्योऽपि दृग्विषयोऽत्यन्तमद्भुतः । मेघविहीने रजनीकरशून्ये निर्मले व्योमनि शरदतौ सूर्योदयात् किञ्चित्पूर्वं वसन्ततौ च सूर्यास्तस्य किञ्चिदपश्चात् सूर्यसमीपवर्तिभागादुच्चैः श्वेतप्रकाशो दृश्यते । अयं क्षितिजे पृथुतम उज्ज्वलतमश्च वर्तते, उच्चोन्नतांशेषु चाल्पीभवत्यस्य पृथुतोऽज्ज्वलता च । प्रकाशोऽयं राशिचक्रमनुदृश्यते, अत एव राशिचक्रप्रकाशनाम्ना प्रसिद्धः । क्रान्तिवृत्तधरातले भूकक्षासूर्यमध्यवर्तिभागेषु सूक्ष्मा विरलाश्चौल्लिककणा वर्तन्ते, एतेभ्यश्च सूर्यकिरणाः परावृत्ताः सन्त इमं प्रकाशं जनयन्ति ।

विशेषद्रष्टव्यानि

§ ८.१ धूमकेतवो ज्योतिर्विदां चिरपरिचिताः सन्ति । अथर्ववेदसंहितायां तेषामुल्कानाञ्चोल्लेखो लभ्यते—

“उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाच्छं नो दिविचरा ग्रहाः । शं नो भूमिवेपमाना शमुल्कानिर्हंत च यत् ॥ शं नो मृत्युधूमकेतुः शं रुद्रास्तिग्मतेजसः ॥” (१९.९) । बृहत्संहितायां केतुचारनामकाध्याये धूमकेतूनां विवरणानि दत्तानि । धूमकेतूनां भेदाः, तेषां संख्या (शतं सहस्रं वा), तेषां स्वरूपाणि, तेषां दर्शनस्य शुभाशुभफलानि च विस्तरेण व्याख्यातानि तत्र । तेषां द्वित्रचूलत्वं सामान्यतो वर्णितम् । तेषां परिवाराः सन्ति (§ ८.१६) इति वराहसंहितायां निम्नवर्णितेन विभागेन सूच्यते । तत्र ६० संख्याकशनिपुत्रा धूमकेतवः, ५६-संख्याकगुरुपुत्रा धूमकेतवः, ६० संख्याकभौमपुत्रा धूमकेतवः, इत्यादिधूमकेतवो वर्णिताः । यथात्र (§ ८.१८) प्रसिद्धा धूमकेतवो विवृतिकारनाम्ना (हालि-धूमकेतुः...) प्रचलिताः सन्ति, तथैव पैतामहश्चलकेतुः, उद्दालकश्चेतकेतुः, काश्यपश्चेतकेतुः, इत्यादयः पराशरसंहितायां लिखिताः । पाश्चात्यदेशेषु तु सर्वप्रथमं ‘हालि’-महोदयेन (१७५८ तमे ख्रिस्ताब्दे) विज्ञापितं यद् धूमकेतूनां केचित् पुनः पुनर्निश्चितसमयानन्तरं दर्शनं ददति, परन्त्वस्माकं पूर्वाचार्यैः पूर्वमेव केपाञ्चिद् धूमकेतूनां परिक्रमणमानानि सूचितानि, यथा—

“पैतामहश्चलकेतुः पञ्चवर्षशतं प्रोष्य उदितः । अथोद्दालकः श्वेतकेतुर्दशोत्तरं वर्षशतं प्रोष्य दृश्यः । अथ रश्मिकेतुर्विभावसुजः प्रोष्य शतम् ॥” (पराशर०)

§ ८.२ उल्का वस्तुतः पतन्ति नक्षत्राणि नेति ज्ञानं पाश्चात्यदेशेषु नातिप्राचीनम्, परन्त्वस्माकं ज्यौतिषाचार्याणामिदं पूर्वमेवाधिगतमासीत् । श्रीपति-भास्कराचार्यादिभिरुल्काः कुवायोरन्तरेण गणिताः । वराहसंहितायामुल्कानां पञ्च भेदा वर्णिताः—

दिवि भुक्तशुभफलानां पततां रूपाणि यानि तान्युल्काः ।

धिष्ण्योल्काशनिविद्युत्तारा इति पञ्चधा भिन्नाः ॥ (अध्यायः ३३)

अत्राशनिः ‘meteorite-उल्कापिण्ड’ समा, विद्युत् ‘Trai’ समा, धिष्ण्या ‘fireball’ समा, ताराश्च ‘meteor-train’ समाः प्रतीयन्ते । वराहसंहिताया निम्नश्लोकास्तुलनासौकर्यायै दीयन्ते—

अशनिः—अशनिः स्वनेन महता नृगजाश्वमृगाश्मवेश्मतरुपशुषु ।

निपतति विदारयन्ती धरातलं चक्रसंस्थाना ॥

विद्युत्— विद्युत्सत्त्वत्रासं जनयन्ती तटतटस्वना सहसा ।
कुटिलविशाला निपतति जीवेन्धनराशिषु ज्वलिता ॥


धिष्ण्या—धिष्ण्या कृशाल्यपुच्छा धनूषि दश दृश्यतेऽन्तराभ्यधिकम् ।
ज्वलिताङ्गारनिकाशा द्वौ हस्तौ सा प्रमाणेन ॥

तारा— तारा हस्तं दीर्घा शुक्ला ताम्राब्जतन्तुरूपा वा ।
तिर्यग्धश्चोर्ध्वं वा याति वियत्युद्यमानेव ॥

§ ८.३ अशनिनाम्ना तूष्कापिण्डाः प्रसिद्धा आसन् । उपर्यशनिविवरणं दत्तमेव ।

५.३१५ ध्रुवप्रकाशस्य ज्ञातारोऽपि पूर्वाचार्या दृश्यन्ते । 'गन्धर्वनगर'-इति नाम कुवायौ
दृश्यमानं दृग्विषयं निम्नरूपेण वर्णितं लभ्यते—

अनेकवर्णाकृति खे प्रकाशते पुरं पताकाध्वजतोरणान्वितम् ।^१
यदा तदा नागमनुष्यवाजिनां पित्रत्यसृग्भूरि रणे वसुन्धरा ॥



१. डा० गोरखप्रसादलिखितसौरपरिवारे ध्रुवप्रकाशचित्रयोः स्पष्टतया तोरणपताकाध्वजा-
दीनि दृश्यन्ते ।

नवमोऽध्यायः

वेधशाला

[खगोलीयपिण्डानां निरीक्षणे नेत्रसहायकानां वेधशाला-तत्रत्यविविधयन्त्राणां प्रक्रियोप-
योगितयोश्चित्रादिसाहाय्येन वर्णनमत्र दीयते ।]

६.१ वेधशाला

ज्योतिर्विद्याया आत्मा वेधकार्याण्येव, अतो वेधशालानां तत्र परमं महत्त्वपूर्णस्थानम् । पुरा वेधशालासु केवलं वेधयन्त्राण्यवर्तन्त । परमधुना वेधशाला वेधोपयोगिनां दूरदर्शकादियन्त्राणां शाला एव न, तत्र वेधोपलब्धसूचनागणनार्थं गणनाविभागः, यथार्थव्याख्याकरणार्थं भौतिकशास्त्र-विषयकप्रयोगशाला, यन्त्ररचनागृहम्, पुस्तकालयादयश्चावश्यं वर्तन्ते ।

आधुनिकवेधशालानामग्रणीः 'प्लोमर'पर्वते^१ स्थापिता वेधशालास्ति, यत्र विशालतमं परावर्तनात्मकं द्विशत-इञ्चीयदूरदर्शकयन्त्रं वर्तते । स्थानमिदं समुद्रतलात् ६००० फिटोच्छ्रये विद्यते, अत एव वायुमण्डलं सर्वदा विरलं रजःकणादिशून्यं मेघैरनावृतं वायुसंक्षोभविहीनञ्च वर्तते । समीपे च न किमपि महानगरं विद्यते, यत्रत्यविद्युद्दीपप्रकाशः फोटोफ्लक्कहीतनक्षत्रचित्रेषु धूमिलत्वं जनयेत् । एवमादर्शस्थाने^२ प्रतिष्ठापिता वेधशालेयं नीहारिका-अल्पाकाशगङ्गासंस्थानानां विशेषाध्ययनं कुर्वती विश्वसृष्टिरहस्योद्घाटने प्रयत्नशीलास्ति ।

आधुनिकवेधशालासु नैकानि महाभीमकायकानि यन्त्राणि दृश्यन्ते, परन्तु प्राकृतजनानां नयने सर्वाधिकमाकर्षति दूरदर्शकयन्त्रं तस्यारोहणयन्त्रञ्च । दूरदर्शकयन्त्रमेकस्मिन् विशिष्टेऽर्ध-गोलकारगृहे तिष्ठति । तच्च सुदृढकंक्रीटभूमिकायां निर्मायते । दूरदर्शकमाकाशस्य प्रत्येकं दिग्विभागं प्रदर्शयितुं समर्थं भवेत् । अत एव शिखरगोलाधो (द्रष्टव्यमपरपृष्ठे शिखरगोलाधस्य चित्रम्) वृत्ताकारलौहपथमारूढो वर्तते । शिखरगोलाधोऽतिभारकः, अत एव लौहपथे स विशालविद्युन्मोटैर्भ्रम्यते । (यथा महत्त्वपूर्णरेलवेस्टेशनेषु 'इञ्जिन'स्य मुखं प्रतिकूलयितुं लौहपथाः सन्ति) ।


दूरदर्शकं क्षितिजात् खस्वस्तिकपर्यन्तं प्रदर्शयितुं समर्थं भवेत्, अत एव शिखरगोलाधे एकं पृथुविवरं वर्तते (द्रष्टव्यमपरपृष्ठस्थं छायाचित्रम्) । विशालविद्युच्चालितयन्त्रैर्दूरदर्शकमुपर्यधश्च

१. अमेरिकायाः कैलीफोर्नियाप्रान्ते ।

२. सर्वथा रजःकणादिशून्यं मेघेभ्योऽप्युच्चैः स्थितं नगराद् दूरवर्ति स्थानं वेधशालो-पयुक्तम्; अस्मादेव कारणात् 'उत्तरप्रदेशीयशासनेन' स्वराजकीयवेधशाला नैनीताले स्थापिता ।

(ऊर्ध्वाधरदिशायां) पृथुविवरमध्यादाकाशं पश्यति । एवं दूरदर्शकं प्रत्येकमुन्नतांशं प्रति (ऊर्ध्वाधरदिशायां भ्रामयित्वा) प्रत्येकं दिगंशं प्रति (शिखरगोलार्धं भ्रामयित्वा) क्रियते ।

नक्षत्राणां सततवेधनार्थमिदमावश्यकं यद् दूरदर्शकमपि नक्षत्रानुसारं पूर्वतः पश्चिमं गच्छेत् । नक्षत्राणि क्रान्त्यंशानां स्थिरत्वादहोरात्रवृत्तेषु भ्रमन्ति । अत एव विद्युच्चालितयन्त्रैः



द्विशत-इञ्जीयदूरदर्शकस्य शिखरगोलार्धः

['पलोमर' कैलिफोर्निया]

प्रथमं दूरदर्शकस्य मुखं नक्षत्रं प्रति क्रियते, ततो विद्युच्चालित'घटिका'यन्त्रेण शिखरगोलार्धः सदूरदर्शकोऽहोरात्रवृत्ते भ्रमति । 'घटिका'यन्त्रं ध्रुवीयाक्षमन्वेवं भ्रमति यद् नाक्षत्रदिने पूर्णचक्रं करोति, एवञ्च पृथिव्यक्षभ्रमणं निष्फलीकरोति ।

शिखरगोलार्धे वेधकर्तृणां सौकर्याय कृत्रिमधरातलमस्ति, यद् विद्युच्चालकयन्त्रेणोर्ध्वमधो वा क्रियते । (क्षितिजवर्तिनक्षत्रवेधार्थं दूरदर्शकं प्रायः क्षैतिजधरातले स्थाप्यते, दूरदर्शकस्य चक्षुस्तालमयूष्वै भवति, खस्वस्तिकवर्तिनक्षत्रवेधार्थं दूरदर्शकं प्राय ऊर्ध्वाधरदिशायां स्थाप्यते

नवमोऽध्यायः

१७५

दूरदर्शकस्य चक्षुस्तालं वेधशालाकुट्टिमतल आगच्छति । वेधकर्ता च सदैव चक्षुस्तालस्य सम्मुखं वर्तते, अत एव तस्योर्ध्वाधोगमनमवश्यं भावि ।)

उपरि शिखरगोलार्धस्य संक्षिप्तं विवरणं दत्तम् । अधुना वेध-
शालास्थयन्त्राणां विवरणानि दीयन्ते, प्रथमं दूरदर्शकयन्त्रस्य, तत्पश्चाद्
दूरदर्शकोपकारकयन्त्राणाम् ।


१.२ दूरदर्शक यन्त्राणि

वेधकार्येषु नियामकानां यथार्थज्ञानाय, खगोलीयपिण्डानां स्पष्ट-
दर्शनलाभाय, तेषां भौतिकसंरचनां रासायनिकसंरचनाञ्च ज्ञातुं विविधानि
यन्त्राणि प्रयुज्यन्ते । एतेषां यन्त्राणां दूरदर्शकयन्त्राणि परममहत्त्वपूर्णानि ।
दूरदर्शकानि नानाप्रयोजनेषु सफलानि दृश्यन्ते । तैर्वेधे सूक्ष्मता यथार्थता
चायातः, तैः खगोलीयपिण्डाः स्पष्टतां भजन्ते । नक्षत्राणां फोटोचित्राणि
गृह्यन्ते, वर्णच्छत्रादीनां ग्रहणमपि तैः सम्भवम् । एवं दूरदर्शकयन्त्रं
परमोपयोगि ।


६.२१ प्रकाशकिरणानां नियमाः

प्रकाशकिरणा एव वेधकर्तारं नक्षत्रग्रहादिभिः संयोजयन्ति । अत
एव प्रकाशकिरणग्राहनियमा अवश्यं ज्ञातव्याः । एते नियमाः केवलं
संक्षेपेणात्र दीयन्ते, विशेषविवरणार्थं भौतिकशास्त्रग्रन्था अवलोकनीयाः ।

(१) प्रकाशकिरणाः सामान्यतया तालेन त्रिपाद्वेणं वा गृह्यन्ते ।
प्रकाशकिरणास्तालं प्रविश्य यदा निस्सरन्ति तदा ते संसृता भवन्ति,
अपसृता वा भवन्ति । तालरचनापेक्षीदं संसृतत्वमपसृतत्वं वा । यद्युन्न-
तोदरतालानि तर्हि संसृतकिरणपुञ्जो भवति, यदि च नतोदरतालानि तर्हि
अपसृतकिरणपुञ्जो भवति ।^१



(२) बिम्बनिर्माणम्



उन्नतोदरतालानि नतोदर-
दर्पणा एव वास्तविकबिम्बं
कल्पयन्ति, अत एवैत एव दूरदर्श-
केषु प्रयुज्यन्ते । उन्नतोदरतालं
प्रविश्य किरणाः संसृतकिरणपुञ्जं
सृजन्तीति पूर्वमेवोक्तम् । अत्र
काश्चित् परिभाषा दीयन्ते—

तालकेन्द्रम्—तालस्य मध्यवर्तिकेन्द्रं तालकेन्द्रं कथ्यते ।

नाभिः—संसृतकिरणपुञ्जो यस्मिन् बिन्दौ संसरति स नाभिः कथ्यते ।

मुख्याक्षः—नाभि-तालकेन्द्र-प्रोतरेखा मुख्याक्षः ।

अनुबद्धनाभिः—मुख्याक्षे नाभिस्तालकेन्द्रस्य एकस्मिन् पार्श्वे वर्तते, तालकेन्द्रात्
तस्मिन्नेव दूरत्वे तालकेन्द्रस्य द्वितीये पार्श्वे मुख्याक्षवर्तिबिन्दुः
अनुबद्धनाभिः कथ्यते ।

नाभ्यन्तरम्—केन्द्र-नाभेरन्तरं नाभ्यन्तरं कथ्यते ।


अत्रोपरि चित्रं द्रष्टव्यम् । चित्रेणैताः परिभाषाः स्पष्टीभविव्यन्ति ।

(३) बिम्बस्य चित्रनिर्माणे प्रयुक्ता नियमाः

(अ) मुख्याक्षसमानान्तराः किरणास्तात्रं प्रविश्य नाभिं स्पृशन्तो गच्छन्ति ।

(आ) तालकेन्द्रं स्पृशन्तो निर्गताः किरणाः सरलरेखायां (भुगतामप्राप्य) गच्छन्ति ।

(इ) अनुबद्धनाभिं स्पृष्ट्वा गताः किरणास्तालं प्रविश्य मुख्याक्षसमानान्तरा भवन्ति ।




बिम्बनिर्माणे प्रयुक्ता नियमाः

नवमोऽध्यायः

१७७

अभिदृश्यतालः


यदि वस्तु तालस्य नाभ्यन्तराद् दूरतरं तर्हि तालं प्रविश्य निर्गताः किरणा वस्तुनोऽधोमुखि बिम्बं कल्पयन्ति । यदि वस्तु सुदूरं वर्तते तर्हि प्रकाशकिरणाः सर्वे नाभिं संस्पृश्य गच्छन्ति । अधोमुखं लघ्वाकारकं बिम्बं नाभ्यां भवति ।



अभिदृश्य तालम्

चक्षुस्तालम्

यदि वस्तु नाभ्यन्तराल्पदूरे वर्तते तर्हि तालं प्रविश्य निर्गताः किरणा वस्तुन एकमुन्नतं विस्तृतं काल्पनिकं बिम्बं रचयन्ति । साधारणवृद्धिदर्शकाचे नियमोऽयं प्रयुज्यते ।




६:२२ वर्तनात्मकदूरदर्शकानि

साधारणदूरदर्शकयन्त्र उपर्युक्ततालद्वयस्य प्रयोगः क्रियते । एकस्या नलिकाया एकस्या कोट्यामभिदृश्यतालं स्थाप्यते । द्वितीयकोट्याञ्च चक्षुस्तालम् । नलिकाया दीर्घत्वं द्वयोस्तालयो-

१७८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्


नाभ्यन्तरयोर्योगेन तुल्यम् । चक्षुस्तालं नलिकायामग्रे पश्चाद् वा मृदु सप्यते । प्रथमं बृहन्नाभ्यन्तरकं तालं बिम्बं नाभ्यां कल्पयति । द्वितीयं चक्षुस्तालमल्पनाभ्यन्तरकं प्रथमतालकल्पितयथार्थ-बिम्बस्यातिविस्तृतं बिम्बं कल्पयति ।



अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

नतोदरदर्पणजनितबिम्बम्

यदा प्रकाशकिरणाः श्लक्ष्णप्राञ्जलदर्पणे पतन्ति, ततस्ते किरणाः परावर्तन्ते । यदि दर्पणस्य तलं गोलाकारं तर्हि तत् तालवद् बिम्बं कल्पयति । अनन्तदूरवर्तिनः प्रकाशकिरणा नाभ्यामधोमुखे बिम्बं लघ्वाकारकं जनयन्ति । अत एव दूरदर्शकेऽभिदृश्यतालस्थाने नतोदरदर्पणः प्रयुज्यते ।



९.२३ परावर्तनात्मकदूरदर्शकम्


परावर्तनात्मकदूरदर्शके त्वभिदृश्यतालस्थाने नतोदरदर्पणः प्रयुज्यते । नतोदरदर्पणो वृत्ताकारः काचनिर्मितो भवति, अस्य बाह्यपृष्ठम् 'अल्मूनियमा'दिपरावर्तकारिधातुभिराच्छादितं भवति । वर्तनात्मकदूरदर्शकेऽभिदृश्यतालेमूर्ध्वं वर्तते चक्षुस्तालं चाधः । अत एवाधोवर्तिजना अपि चक्षुस्ताले बिम्बानि पश्यन्ति । परन्तु परावर्तनात्मकदूरदर्शके चाभिदृश्यदर्पणोऽधो वर्तते, नाभिश्चोर्ध्वं वर्तते । तत्र वेधकर्तृणां गमनं न सम्भवम् । अत एव नाभ्यां (यत्र बिम्बं कल्प्यते)

नवमोऽध्यायः

१७६

समतलदर्पणप्रयोगेण विम्बमन्यत्र गम्यस्थले दृश्यते । समतलदर्पणस्य द्वौ प्रयोगौ प्रसिद्धौ—न्यूटोनियन-विधिः, कैसेग्रेनियन-विधिश्च ।

‘न्यूटोनियन’-प्रकारके दूरदर्शकनलिकायामेको लघुः समतलदर्पणः ४५ अंशैः तिर्यक् तिष्ठति । ततो विम्बं परावर्त्य पाद्वे पतति । कैसेग्रेनियन’-प्रकारक एको लघुरुन्नतोदरदर्पणः



न्यूटोनियन - कैसेग्रेनियन-विधि

प्रतिविम्बं पुनरभिदृश्यदर्पणं प्रति प्रक्षिपति । अभिदृश्यदर्पणमध्ये एकं विवरं वर्तते, यतो विम्बं निर्गत्य चक्षुस्ताले पतति ।

६.२४ दूरदर्शकयन्त्रस्य शक्तयः

दूरदर्शकस्य तिस्रः शक्तयः । प्रथमया तद् लघुवस्तूनि विस्तृतानि करोति, द्वितीयया तद् धूमिलं वस्तु किञ्चित् स्पष्टं करोति, तृतीयया च द्विकादीनां नक्षत्रद्वयस्य परस्परं वैभिन्यं प्रकटीकरोति । प्रथमा त्वभिवर्धनशक्तिः, द्वितीया प्रकाशप्राहिता शक्तिः, तृतीया विश्लेषिणी शक्तिरुच्यते ।

अभिवर्धनशक्तिः

यन्त्रस्याभिवर्धनशक्तिः साधारणतया सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णा । दिनेत्रयन्त्रेण जनो दूरवर्तिवस्तूनि, यानि नेत्राभ्यामेव बिन्दुरूपेण दृश्यन्ते, किञ्चिद् विस्तृततरं पश्यति । अभिवर्धनशक्तिर्नाभिदूरत्वाधीना—

१६०

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

$$\text{अभिवर्धनशक्तिः} = \frac{F}{f} = \frac{\text{अभिदृश्यतालस्य नाभ्यन्तरम्}}{\text{चक्षुस्तालस्य नाभ्यन्तरम्}}$$

यथा यथा चाभिदृश्यतालस्य नाभ्यन्तरस्य मानं वर्धते, चक्षुस्तालीयनाभ्यन्तरस्य मानञ्च हीयते तथा तथाभिवर्धनशक्तिर्वर्धते । अत एव F -स्य मानं वर्धयित्वा f -स्य मानमतिलघु कृत्वा-भिवर्धनशक्तिर्वर्धते । परन्त्वस्ति सीमाभिवर्धनशक्तेर्वर्धनस्य । एक-इञ्चीयदूरदर्शकस्य महत्तमाभिवर्धनशक्तिः ५०-मिता । शत-इञ्चीयदूरदर्शकस्य ५०००-मिता, द्विशत-इञ्चीयदूरदर्शकस्य च १००००-मिता ।

प्रकाशग्राहिता शक्तिः

यथा गृहे कक्षायां वातायनागतः प्रकाशो वातायनक्षेत्राधीनः, तथैव दूरदर्शकस्य प्रकाशग्राहिताभिदृश्यतालस्य क्षेत्रस्याधीना । अत एव यथा यथा ह्यभिदृश्यतालक्षेत्रं वर्धते तथा तथा प्रकाशग्राहिता शक्तिर्वर्धते ।

प्रकाशग्राहिता ह्यभिदृश्यतालक्षेत्राधीना, क्षेत्रञ्च सदैव व्यासस्य वर्गाधीनम् । अत एव प्रकाशग्राहिता शक्तिरभिदृश्यतालस्य व्यासवर्गाधीना । अर्थात्

$$\text{प्रकाशग्राहिता शक्तिः} = (\text{अभिदृश्यतालस्य व्यासः})^2 \times \text{स्थिरराशिः} ।$$

निशायां मनुष्यस्य नयनतारिका $\frac{1}{8}$ इञ्चमिता भवति । अत एव एक-इञ्चीयदूरदर्शकस्य प्रकाशग्राहिता नयनापेक्षया $\left(\frac{1}{\frac{1}{8}}\right)^2 = 16$ गुणिता । अर्थात् तेन दूरदर्शकेन चाक्षुष-नक्षत्राणां १/१६ गुणितभास्वरत्ववतां नक्षत्राणां दर्शनं सम्भवम् (अर्थाद् नवमकोटिकनक्षत्राण्यपि दृश्यन्ते) । शत-इञ्चीयदूरदर्शकेन चाक्षुषनक्षत्रस्य $\frac{1}{640000}$ गुणितभास्वरत्ववताम्, २००-इञ्चीय-दूरदर्शकेन चाक्षुषनक्षत्रस्य $\frac{1}{160000}$ गुणितभास्वरत्ववतां नक्षत्राणां दर्शनं सम्भवम् ।

विश्लेषिणी शक्तिः


नक्षत्रस्य त्रिविधं विवर्त्तनेन नैकैरेककेन्द्रिकैर्धूमिलैर्वलयैरावृतं दृश्यते । अत एव यदि द्वे नक्षत्रे एवं स्थिते यत् तयोर्न्तरं बहिर्वलयव्यासादल्पं तर्हि बृहत्याऽप्यभिवर्धनशक्त्या तयोः पृथक्करणं दुष्करम् । विश्लेषिणी शक्तिमहत्तमकोणीयदूरत्वम्, यतो भिन्ने नक्षत्रे स्पष्टतया विभिन्ने दृश्येते ।

$$\text{विश्लेषिणी शक्तिः} = \frac{8''.५६}{\text{अभिदृश्यतालस्य व्यासः}}$$

द्विशत-इञ्चीयदूरदर्शकस्य विश्लेषिणी शक्तिः ०''.०२३, अर्थाद् यदि द्वे नक्षत्रे परस्परं ०''.०२३ दूरे तिष्ठतस्तर्हि ते पृथक् पृथक् दृश्येते । यदि द्वे नक्षत्रे परस्परं ०''.०२३ मिता-दल्पदूरे तिष्ठतस्तर्हि ते एकमिव दृश्येते ।

६.३ याम्योत्तरवृत्तम्

वेधशालायामत्यन्तोपयोगि यन्त्रमिदम् । यतः कालसंशोधनं वेधकार्येषु परममहत्त्वपूर्णकार्यम्, कालसंशोधनञ्चानेन यन्त्रेण क्रियते । अनेन दूरदर्शकविशेषेण याम्योत्तरवृत्तनामकेन याम्योत्तरवृत्तमुलङ्घयतो नक्षत्रस्योल्ङ्घनकाल उन्नतांशाश्च सूक्ष्मतया निश्चीयन्ते । याम्योत्तरोल्ङ्घने नाक्षत्रकाल एव नक्षत्रस्य विषुवांशाः, अत उल्ङ्घनकाले निश्चितेन कालेन नक्षत्रस्य विषुवांशा निर्धार्यन्ते । यदि नक्षत्रस्य विषुवांशाः पूर्वविदिताः सन्ति तर्हि नाक्षत्रकालः सूक्ष्मतया निर्धार्यते । वेधोपलब्धनाक्षत्रकालो नाक्षत्रकालघटिकादत्तनाक्षत्रकालेन तोल्यते, नाक्षत्रकालघटिकाया गतेः शैघ्र्यं मान्यञ्च (यद्यपि इदं प्रायेण सूक्ष्मातिसूक्ष्मं दृश्यते) प्राप्येते ।



याम्योत्तरचक्रमिदं यानारूढाग्न्यस्त्रवद् दृश्यते । दूरदर्शकमिदमाकाशस्य सर्वभागेषु न भ्रमति । इदं केवलं याम्योत्तरवृत्ते (दक्षिणसमस्थान-खस्वस्तिक-उत्तर-समस्थानप्रोतवृत्ते) एवोर्ध्वाधरदिशायां भ्रमति । अनेन नक्षत्रस्य दीर्घकालिकमध्ययनं न सम्भवम्, यतो वेधे दूरदर्शकयन्त्रे शीघ्रगत्या धावदिव नक्षत्रं दृश्यते ।

दूरदर्शकमेवमारोहितमस्ति यद् याम्योत्तरवृत्ते (याम्योत्तरसमतले) एवास्य भ्रमणं भवेत् । धुरः केन्द्रीयरेखा घूर्णनाक्षः कथ्यते । घूर्णनाक्षमभितो दूरदर्शकं भ्रमति । दूरदर्शकस्य समकोणे द्वे धुरौ स्तः । धूर्धुरौ V-आकारकौ । (द्रष्टव्यमपरपृष्ठस्थं चित्रम्)


अस्य यन्त्रस्य कर्म मुख्यतया सत्यतास्थापनम् । अर्थादिष्टनक्षत्रस्य भगोले स्थितिः पुनः पुनर्नीयते । नक्षत्राणां बृहत्सूच्यामिष्टनक्षत्रस्य याम्योत्तरवृत्तोल्ङ्घनकालं दृष्ट्वा याम्योत्तरोल्ङ्घनकालात् कतिपयमिनटपूर्वं दूरदर्शकं नक्षत्रोन्नतांशस्थाने स्थाप्यते । अभिदृश्यतालस्य विवरं प्रायेण नव-इञ्चमितं भवति । अत एव तेन नवमकोटिकनक्षत्राण्यपि दृश्यन्ते । वृत्ताकारे दृश्यक्षेत्र एकः

१. 'तोप' इति भाषायाम् ।

१८२


अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

क्षैतिजो लूतातन्तुः, प्रायेण दशसंख्यका ऊर्ध्वाधरलूतातन्तुवश्च सन्ति । नक्षत्रं सर्वप्रथमं सन्यतम्-



आन्त्योत्तरवृत्तम्

भाग आत्मानं दर्शयित्वा सन्येतरभागं प्रति धावति । वेधकर्ता दूरदर्शकं भ्रामयित्वा नक्षत्रं क्षैतिजतन्तौ स्थापयति । उन्नतांश-कुडुपश्च स्थिरीक्रियते । नक्षत्रं क्रमशः एकैकमूर्ध्वाधरतन्तुं स्पृशति । प्रत्येकस्मिन्मूर्ध्वाधरतन्तुस्पर्शे वेधकर्ता ह्येकां विद्युद्घुण्डिकां संपीडयत्यङ्गुल्या । ततो विद्युद्धारया कालाङ्कक-नामक-यन्त्रे चिह्नानि जायन्ते । कालाङ्ककश्च नाक्षत्रकाल-घटिकया सम्मद्धं वर्तते (द्रष्टव्यः § ९.४) । क्षैतिजतन्तुरप्यूर्ध्वाधर-दिशायामितस्ततश्चाल्यते । नक्षत्र-विम्बश्च तेन द्विविभक्तं क्रियते । प्रत्ये-



कस्मिन् विभाजनकाले विद्युद्घुण्डिका वेधकर्त्रा संपीड्यते । एवं कालाङ्कके चिह्नानि जायन्ते ।

दूरदर्शकस्य चतसृषु दिशामु स्थापितानि चत्वारि दीर्घनलिकानि सूक्ष्मदर्शकयन्त्राणि । तैश्चक्रांशलिलितवृत्ते विभिन्नानि परीक्षणानि दृश्यन्ते । परीक्षणानि च पश्चाद् विश्लेष्यन्ते । यद्यपि वेधकार्याणि सर्वाणि द्रुतगत्या क्रियन्ते, यतो नक्षत्रं क्षिप्रमेव दृश्यक्षेत्राद् बहिर्भवति, तथापि विश्लेषणे वर्तते महती गणना । सा सुदीर्घकालेन विभिन्नान् संस्कारान् विधाय क्रियते ।


एवं परोक्षणानां विश्लेषणेन नक्षत्रस्य तावदुन्नतांशाः क्रान्त्यंशा याम्योत्तरोलङ्घनकाल्यन्त्र सूक्ष्मतया यथार्थतया च निश्चीयन्ते ।

अधुना वेधकर्ता विद्युद्घुण्डिकां न पीडयति । व्यक्तिविविहीनसूक्ष्ममापक^१मत्र प्रयुज्यते । वेधकर्ता केवलमूर्धाधरं चरुं तन्तुमेवं भ्रामयति यद् नक्षत्रविम्बं निरन्तरं द्विविभक्तं वर्तते । कालाङ्कके च स्वयंचालित-यन्त्रेण चिह्नान्यङ्कयन्ते ।


६.४ कालाङ्ककयन्त्रम्

याम्योत्तरचक्रस्यविद्युद्घुण्डिकां सम्पीड्य वेधकर्ता विद्युद्धारया कालाङ्कके चिह्नानि कल्पयति । कालाङ्ककयन्त्र एकं पत्रं गोलनलिकोपरि समगत्या मिनटद्वय एकं परिभ्रमणं करोति ।

कालाङ्ककयन्त्रम्



अस्मिन् पत्र एका विद्युद्वेदिनी प्रत्येकस्मिन् सेकिण्ड एकं चिह्नं करोति । सूचिका (लेखिनी) च नाक्षत्रकालघटिकायन्त्रेण सम्प्रदावर्तते । यदा वेधकर्ता विद्युद्घुण्डिकां सम्पीडयति तदान्यया लेखिन्या चिह्नं भवति । प्रतिसेकिण्डेऽङ्कितानां चिह्नानां दर्शनेन, वेधकर्तृकृतचिह्नानि सापेक्षतया $\frac{1}{100}$ सेकिण्डमात्रपर्यन्तं शुद्धतया पठ्यन्ते, कालश्च सूक्ष्मतया ज्ञायते ।



कालाङ्ककयन्त्रे निश्चितानां पञ्चाशत्

अत्र वेधकर्तृकृतचिह्नानि X अङ्कितानि ।


१. व्यक्तिविविहीनसूक्ष्ममापकम् = Impersonal Micrometer

९.५ विषुवदीयदूरदर्शकम्

याम्योत्तरचक्रेण खगोलीयपिण्डा अत्यल्पकालपर्यन्तं दृश्यन्ते, यतो दूरदर्शकं सदैव याम्यो-
त्तरदिशायां तिष्ठति, पिण्डाश्च झटिति याम्योत्तररेखामुल्लङ्घ्य लुप्ता भवन्ति । परन्तु खगोलीय-
पिण्डानां सुष्ठु ज्ञानाय सुनिरीक्षणाय सरलतया फोटोचित्रग्रहणाय च यन्त्रान्तरं प्रयुज्यते । इदं
विषुवदीयदूरदर्शकयन्त्रनाम्ना प्रसिद्धम् ।

सामान्यतया दूरदर्शकमिदं बृहदाकारकम् । याम्योत्तरचक्रादिषु नक्षत्रधावनस्य कारणं
भुवोऽक्षभ्रमणम्, अत एवाक्षभ्रमणकृतधावनस्य प्रतीकारार्थं दूरदर्शकमिदं नाक्षत्रकालघटिकासञ्चालित
आरोहणविशेषे स्थाप्यते । नाक्षत्रकालघटिकासञ्चालितयन्त्रं भुवोऽक्षभ्रमणस्य प्रतिकूलदिशाया-
मक्षभ्रमणवेगसमजवेन भ्रमति ।

दूरदर्शकमिदमेवमारोह्यते यदाकाशस्य कस्यचिदपि भागस्याभिमुख्यमिदं भजेत । अत्र
द्वौ परिभ्रमणाक्षौ परस्परं समकोणत्वं भजमानौ वर्तते । प्रथमः पृथिव्याः परिभ्रमणाक्षसमानान्तरः,
द्वितीयश्च परिभ्रमणाक्षलम्बवर्ती । प्रथमो ध्रुवीयाक्षः, द्वितीयश्च क्रान्त्यक्षः कथ्यते । प्रत्येक-
मक्षस्याधो भ्रमणशक्तिं वृत्तं वर्तते । ध्रुवीयाक्षस्याधो होराचक्रं क्रान्त्यक्षस्य चाधः
क्रान्तिचक्रं दृश्यते । एतच्चक्रद्वयमेवं सामञ्जस्यपूर्णं यद् यदा दूरदर्शकं याम्योत्तरवृत्तवर्तिविन्दुं प्रति



विषुवदीयदूरदर्शकम्


तिष्ठति तदा होराचक्रे शून्याङ्को दृश्यते, यदा च विषुववर्तिविन्दुं प्रति तिष्ठति तदा क्रान्त्यक्षचक्रे
शून्याङ्को दृश्यते ।

उपर्युक्तं यद् दूरदर्शकमिदमाकाशस्य कस्यचिदपि भागस्याभिमुख्यं भजते । अत एव यदि कस्यचिद् नक्षत्रस्य होराकोणः $+६०^{\circ}$, क्रान्त्यंशाश्च $+३०''$, तदा तस्य दर्शनार्थं विषुवदीयदूरदर्शकमेवं भ्राम्यते यद् ध्रुवीयाक्षो होराचक्रे ६०° मितकोणं रचयति, क्रान्त्यक्षश्च क्रान्त्यंशचक्रे $+३०^{\circ}$ -मितकोणं कल्पयति । एवमेव यदि नक्षत्रस्य क्रान्त्यंशा होराकोणांशाश्च पूर्वविदिता न सन्ति, तर्हि होराचक्रे क्रान्त्यंशचक्रे चांशान् पठित्वा ज्ञायन्ते ।

विषुवदीयदूरदर्शकान्य-
त्यन्तमुपयुक्तानि छायाचित्रा-
दिग्रहणे । छायाचित्रग्रहणे
ग्राह्यविषयस्य सम्पूर्णतया-
चलत्वं परमावश्यकम् ।
यद्यपि घटिकाचलितयन्त्रेण
समगत्याक्षभ्रमणस्य प्रतीकारो
भवति, तथाप्येकमन्यद्
गौणदूरदर्शकं विशालदूरदर्शक-
स्योपरि स्थाप्यते, येन दृष्ट्वा
वेधकर्ता कञ्चिदपि गतिभेदं
निराकरोति ।

९.६ घटिकायन्त्राणि


वेधकार्येषु कालस्य
कालावधेश्च यथार्थज्ञानं
परमावश्यकं भवति । अत
एव वेधशालासु द्वे घटिका-
यन्त्रे अवश्यं दृश्येते । प्रथमा
नाक्षत्रकालघटिका, द्वितीया च मध्यमकाल (लोकव्यवहारकाल) घटिका ।



विषुवदीयदूरदर्शकम्

पुगकाले घटिकायन्त्राणामाविष्कारात् पूर्वं बालकायन्त्राणि, जलयन्त्राणि, सूर्यशङ्कु यन्त्रादीनि चासन् । स्थूलकालगणनायां तानि पर्याप्तं यथार्थान्यासन्, परन्तु सूक्ष्मगणना पर्याप्तं दुष्करासीत् ।

‘हीगेस’ महोदयेन सर्व-प्रथमं लोलकं पर्याप्तं घटिकायन्त्रेषु प्रायुज्यत । ततः प्रभृति घटिकायन्त्रेषूत्तरोत्तरं परिष्कारा जाताः । ज्योतिषघटिकाः सामान्य-घटिकाभ्यो न नितान्तं भिन्नाः । ताः केवळं सुपरिश्रमेणावधानेन च रच्यन्ते, यतस्तासु गतिभेदो न जायते । यदि कदाचिद् जायते तर्हि तस्य मात्रा-त्यल्पा ।



तापक्रमेण लोलक-कम्पने न्यूनाधिकमात्रायां भिन्नता जायते । वायु-मण्डलभारस्यापि प्रभावो लोलककम्पने दृश्यते । अत एव ज्योतिषघटिका एवं रच्यन्ते यत्तत्तां तापक्रमजनितदोषा वायु-मण्डलभारजनितदोषाश्च न दृश्यन्ते । अचिरात्पूर्वं ‘शार्ट’घटिकायन्त्राण्यति-प्रसिद्धानि सर्वश्रेष्ठानि च । ‘शार्ट’घटिकायन्त्रे द्वे घटिके वर्तन्ते—प्रथमा ‘स्वामिनीघटिका’ नाम्ना द्वितीया ‘दासी-घटिका’-

याम्योत्तरवृत्तम्


नाम्ना च प्रसिद्धा । ‘स्वामिनी’घटिकाया लोलकं वायुशून्यकोषे तिष्ठति । विद्युद्धारया लोलक-भिदं प्रतिमिनटार्धं प्रेरणां लभते । स्वामिनी-घटिकया सम्बद्धा दासी-घटिका समयं प्रदर्शयति

नवमोऽध्यायः

१८७

यन्त्रान्तराणि च चालयति । 'शार्ट' घटिकायामधिकाधिको गतिविकारः केवलं प्रतिदिनं ०.०१ सेकिण्डभागमितः ।

अधुना महत्यां वेधशालायां 'स्फटिकघटिकायन्त्राणि' प्रयुज्यन्ते । नैनीतालस्थ-उत्तरप्रदेशीयवेधशालायां स्फटिकघटिकायन्त्रं वर्तते । घटिका विद्युत्संचालकयन्त्रेण चाल्यते । सञ्चालकयन्त्रञ्च स्वयं स्फटिकपट्टिकायाः स्वतन्त्रकम्पनैः पूर्णतया नियन्त्रितम् । स्फटिकपट्टिका $2'' + 1\frac{1}{2}'' + 1''$ परिमाणे । स्फटिकपट्टिका प्रदोलीविद्युत्परिपथे नियोजितास्ति । परिपथानामवयवा ह्येवं संयोजिता वर्तन्ते, यत्तेषां दोलनकालः स्फटिकस्य स्वाभाविकदोलनकालेन समः । स्फटिकपट्टिका चैकस्मिन् सेकिण्डे लक्षवारं (१,००,०००-वारं) कम्पते । तस्याः परिपथेऽप्येतावत्संख्याकानि कम्पनानि भवन्ति । विद्युत्पद्धत्या प्रतिसेकिण्डं १,००० कम्पनानि क्रियन्ते । ततो नैका विद्युद्घटिकाः सञ्चलन्ति ।



स्फटिकघटिकायन्त्र

स्फटिकघटिकायां प्रतिदिनं ०.००१ सेकिण्डभागादधिको गतिविकारो न भवति ।

६.७ विविधानि यन्त्राणि


६.७१ फिलरसूक्ष्ममापकम्

विषुवदीयदूरदर्शकयन्त्रेण गृहीतानि छायाचित्राणि वेधस्य पश्चात् परीक्ष्यन्ते, सूक्ष्ममापकेन च माप्यन्ते । परन्तु यदा कदा नेत्राभ्यामेव मापनस्यावश्यकता दृश्यते तथा पिण्डानां कोणीयव्यासमानानयने, द्विकानां प्रधाननक्षत्र-सहचारिनक्षत्र-दूरत्वमानानयने । एतदर्थं फिलरसूक्ष्ममापकं प्रयुज्यते । अस्य विवरणं § १२.१५ दास्यते ।

६.७२ नतांशदूरदर्शकयन्त्रम् (नतांशनलिका)

अक्षांशनिर्णयो नतांशदूरदर्शकयन्त्रेण सुकरो भवति । दूरदर्शकविशेषेण नक्षत्रद्वयस्य नतांशा वेधेन ज्ञायन्ते । द्वे नक्षत्रे ईदृशे चीयेते, यत्र प्रथमं याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनं यावदंशं खस्वस्तिकं दक्षिणेन करोति, द्वितीयं तावदंशैरुत्तरेण करोति । तयोर्याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनकाल-योरन्तरं प्रायेणाल्पमेव । एवं यदि स्थानस्याक्षांशाः ϕ , तर्हि प्रथमस्य नक्षत्रस्य नतांशाः $9-\phi$, द्वितीयस्य च नतांशाः $\phi-9_2$ । तयोरन्तरञ्च $8, +9_2-2\phi$ ।

सूक्ष्ममापकस्य तन्तुः प्रथमं प्रथमस्य त्रिभुजस्य मध्यसूत्रादूर्ध्वत्वं मिनोति । यन्त्रं ततोऽधोमुखं क्रियते । ततो द्वितीयस्य त्रिभुजस्य मध्यसूत्रादूर्ध्वत्वं तन्तुर्मिनोति । सूक्ष्ममापकस्य तन्तुर्वावदन्तरं गच्छति तद् मीयते । तच्चास्ति $9+9_2-2\phi$ । यतः $9, 9_2$ ज्ञातराशी स्तः, अत एव ϕ (अक्षांशाः) ज्ञायन्ते ।



अधुना त्वेकमत्यन्तं परिष्कृतं यन्त्रं प्रयुज्यते । ऊर्ध्वाधरभ्रमणाद् एकं पारदयन्त्रं भ्रमति । वेधानां फोटोचित्राणि च गृह्यन्ते । ततः सूक्ष्ममापकयन्त्रेण दूरत्वं मीयते, यन्त्रमिदं 'फोटोग्राफिक-जेनिथ-स्वू' नाम्ना प्रसिद्धम् ।

६.७३ अट्टालिकादूरदर्शकयन्त्रम्

विषुवदीयारोहणेन दूरदर्शकं भ्राम्यते, परन्तु सुदीर्घनाभ्यन्तरवतो दीर्घदूरदर्शकयन्त्रस्य भ्रामणं न सरलं कार्यम् । अत एव सूर्यस्य वर्णमण्डलादीनां परीक्षणेषु, यत्र सुदीर्घनाभ्यन्तरवतो दूरदर्शकस्यावश्यकता दृश्यते, तत्राचलं दूरदर्शकं प्रयुज्यते ।


अट्टालिकादूरदर्शकयन्त्रम्

अट्टालिकादूरदर्शकयन्त्रस्योच्च-भाग एकं शिखरं वर्तते । तत्र 'कोलास्यट' नामकं यन्त्रं वर्तते । तत्रैको दर्पणः समतलको भुवोऽध-भ्रमणप्रतिकूलदिशायां घटिकायन्त्रेण चाल्यते । विषुवदीयारोहणारूढदर्पणादस्मात् परावृत्य किरणा द्वितीये दर्पणे पतन्ति । ततः परावृत्य दूरदर्शकयन्त्रमतीत्याट्टालिकाधस्तलवर्तिचक्षुस्ताले पतन्ति,

विम्वञ्च कल्पयन्ति । तत्र छायाचित्राणि, वर्णच्छत्रादीनि च गृह्यन्ते । सर्वोच्छ्रयशालि अट्टालिकादूर-दर्शकं 'माउण्टेविल्सन' वेधशालायां वर्तते । तस्योच्छ्रयः १५० फिटमितः ।

६.७४ रश्मिविश्लेषकयन्त्रम्

ज्योतिर्भौतिकविज्ञाने वर्णच्छत्रविश्लेषणस्य परमं महत्त्वं वर्तते । अनेन वर्णच्छत्रेणैव नक्षत्राणां नीहारिकाणामत्याकाशगङ्गासंस्थानानां रासायनिकरचना नक्षत्राणाञ्च वर्णतापक्रम-भौतिकस्थित्यादीनि लभ्यन्ते ।




रश्मिविश्लेषकयन्त्रम्

रश्मिविश्लेषकयन्त्रेण प्रकाशरश्मीनामवयवविश्लेषणं क्रियते । रश्मिविश्लेषणप्रक्रियायाः

सर्वैरनुभूतमुदाहरणमिन्द्रधनुरस्ति । सूर्यरश्मयो गोलाकारजलबिन्दुभ्यो वर्तिता वर्णविश्लेषणं प्राप्य इन्द्र-धनूरूपेण दृश्यन्ते । त्रिपार्श्वस्थापने-ऽप्येवं प्रकाशरश्मयो विश्लेषणं भजन्त इति सर्वप्रथमं 'न्यूटन'-महोदयेन विदितम् । तेन दृष्टं यत् त्रिपार्श्वमुल्लङ्घ्य सूर्यप्रकाशकिरणा विभिन्नवर्णकाः—यथा नीललोहित-नील-आकाशीयनील - हरित् - पीत-रक्तपीत-रक्तवर्णका भवन्ति । वर्णानां समुदायोऽयं वर्णच्छत्रं कथ्यते ।

रश्मिविश्लेषकयन्त्रस्य त्रयोऽवयवाः सन्ति । (१) संधानकम् ('कालीमीटरम्'), (२) त्रिपार्श्वम्, (३) दूरदर्शकयन्त्रम् । 'काली-मीटरम्' एका नलिकास्ति यस्या एक-कोट्यां निर्वर्णतालं वर्तते, द्वितीय-कोट्यामेकं संकीर्णच्छिद्रम् । इष्ट-



सरश्मिविश्लेषकदूरदर्शकम्

प्रकाशस्य रश्मयश्छिद्रादागत्य निर्वर्णतालं प्रविश्य समानान्तराः सन्तो निस्सरन्ति । त्रिपाश्व-
मेकस्मिन्नूर्ध्वाधराक्षे भ्रमणशीले चारोहणे वर्तते । त्रिपाश्वविशिष्टवर्णतरङ्गा दूरदर्शकं प्रविशन्ति ।
दूरदर्शकं संधानकवदेका नलिकास्ति । एकस्यां कोट्यामपि दृश्यतालं वर्तते, द्वितीयकोट्यां चक्षु-



स-कैमरा-दूरदर्शकयन्त्रम्

स्तालनलिका वर्तते, यस्यां चक्षुस्तालं स्वस्तिकासूत्रञ्च वर्तते । चक्षुस्तालनलिका दण्डचक्रिप्रबन्धे-
नाग्रे पश्चाद्वा मृदु सर्पति ।

[वर्णच्छत्रीयरेखाणां विवरणं सूर्याध्यायेऽपि § ५.३२१ द्रष्टव्यम्]

६.७५ फोटो-कैमरायन्त्रम्

अधुना विशालदूरदर्शकेन नेत्राभ्यामेव नक्षत्राणां ग्रहाणां चावलोकनानि न क्रियन्ते
ज्योतिर्विद्भिः । दूरदर्शकयन्त्राणि केवलं साधनानि यत्संगृहीतकिरणाः कैमरायन्त्रेण छायाचित्र-


निर्माणार्थं गृह्यन्ते, अथवा रश्मिविश्लेषकयन्त्रेण वर्णच्छन्ननिर्माणार्थं गृह्यन्ते, अथवा 'थर्मोकुपल' यन्त्रेण तापक्रमनिर्णयार्थं गृह्यन्ते ।

५ मिनिटैः

५० मिनिटैः


१० मिनिटैः

विभिन्नोद्घाटनकालैर्विभिन्नदर्शनानि लभ्यन्ते । [लिङ्ग-वेधशाला]




१. अधुना फोटोविद्युत्कोषयन्त्रैः (फोटो इल्लिविड्क सेल) ।

नेत्रतारकयोर्भास्वरत्वप्रभावः क्षणिकः, परन्तु फोटोफलके दीर्घकालीनोद्घाटनेन दीर्घकाल-
पर्यन्तं प्रकाशः पतति, अतिधूमिलानि नक्षत्राण्यपि प्रकाशतां यान्ति । (द्रष्टव्यान्यधश्चित्राणि) ।



शत-इञ्चीयदूरदर्शकम्



द्विशत-इञ्चीयदूरदर्शकम्

विशेषद्रष्टव्यानि

अग्रे वर्ण्यमानप्राचीनयन्त्राणां विवरणेन स्पष्टीभविष्यति यद् वयं भारतीया वेधकार्येष्वपि तात्कालिकपाश्चात्यज्योतिर्विदपेक्षया नितरामग्रेचरा आस्म । परमस्माकं वेधशालाः पाश्चात्यवेध-शालाभ्यो भिन्ना आसन् । अस्माकं यन्त्राणि सुवाह्यान्यासन् । तेषां स्थापनमपि नातिदुष्करमासीद् । अत एव ज्योतिर्विद्भिः स्वस्वगृहेषु सामान्या वेधशालाः प्रतिष्ठापिता आसन् । गृहेभ्यो बहिरपि तानि यन्त्राणि सुवाह्यत्वात् ससौविध्यं वेधकर्मसु प्रायुज्यन्त ।

श्रीजयसिंहमहाराजेन 'दिल्ली' 'जयपुर' 'मथुरा' 'काशी' 'उज्जयिनी' इत्यादिषु नगरेषु वेध-शालाः स्थापिता इति सर्वेषां विदितम् । तत्र प्रायेण निम्नानि यन्त्राणि दृश्यन्ते—

१. सम्राट् यन्त्रम्, २. षष्ठांशयन्त्रम्, ३. राशिवलययन्त्रम्, ४. जयप्रकाशयन्त्रम्,
५. कपालयन्त्रम्, ६. रामयन्त्रम्, ७. दिगंशयन्त्रम्, ८. नाडिवलययन्त्रम्, ९. दक्षिणोत्तर-
- मित्तियन्त्रम्, १०. उन्नतांशयन्त्रम्, ११. चक्रयन्त्रम्, १२. क्रान्तिवृत्तयन्त्रम् ।

भास्कराचार्येण सिद्धान्तशिरोमणौ, श्रीपतिना सिद्धान्तशेखरे च यन्त्राणां विस्तरेण वर्णनं कृतम् । प्रमुखयन्त्राण्यत्र वर्ण्यन्ते—

- (१) गोलयन्त्रम् । अनेन सूर्यस्योन्नतांशानामुन्नतघटिकायाश्च ज्ञानं भवति ।
 अपवृत्तगरविचिह्नं क्षितिजे धृत्वा कुजेन संसक्ते ।
 नाडीवृत्ते त्रिन्दुं कृत्वा धृत्वाऽथ जलसमं क्षितिजम् ॥
 रविचिह्नस्य च्छाया पतति कुमध्ये यथा तथा विधृते ।
 उडुगोले कुजत्रिन्दोर्मध्ये नाड्यो द्युयाताः स्युः ॥ (सि० शिरोमणिः)
- (२) नाडीवल्लयम् । भास्कराचार्येणोक्तम्—
 अपवृत्ते कुजलग्ने लग्नं चाधो खगोलनलिकान्तः ।
 भूस्थं ध्रुवयष्टिस्थं चक्रं षष्ठ्या निजोदयैश्चाङ्क्यम् ॥
 व्यस्तैर्यष्टीभायामुदयेऽर्कं न्यस्य नाडिका ज्ञेयाः ।
 इष्टच्छायासूर्यान्तरेऽथ लग्नं प्रभायां च ॥
 केनचिदाधारेण ध्रुवाभिमुखकीलकेऽत्र धृते ।
 अथवा कीलच्छायातलमध्ये स्युर्नता नाड्यः ॥ (सि० शि०)
- (३) यष्टियन्त्रम् । अनेन दिग्देशकालानामवगमः क्रियते । यथा श्रीपतिना वर्णितम्—
 संसाधिताशं कृतचक्रभागं विधाय वृत्तं समभूप्रदेशे ।
 त्रिल्याङ्गुलाङ्कां सुसमां च यष्टिं नष्टद्युतिं तज्जठरे निदध्यात् ॥
 तदग्रलम्बः खलु शङ्कुस्तन्मूलकेन्द्रान्तरमत्र दृग्ज्या ।
 पूर्वापरान्तद्विबरं भुजः स्याच्छङ्कग्रमस्तोदयसूत्रमध्यात् ॥
 शङ्कग्रमर्कैर्गुणितं विभक्तं तल्लम्बकेन स्फुटमक्षभा स्यात् ।
 अग्राग्रभागान्नतभागमौर्वी कार्येह खल्वङ्गुलवृत्तजाता ॥
- कालवगमनार्थम्—
 शङ्कुयष्टिधनुश्चक्रैश्छायायन्त्रैरनेकधा ।
 तोययन्त्रकपालाद्यैर्मथूरनरवानरैः ॥
 ससूत्ररेणुगर्भैश्च सम्यक्कालं प्रसाधयेत् ॥ (सूर्यसिद्धान्ते)
- अन्यान्यपि यन्त्राण्यासन् । तेषां विवरणानि तत्रैव द्रष्टव्यानि ।

दशमोऽध्यायः

[निरग्रनभसि प्रोल्लसन्नक्षत्रनिचयाः केषु केषु परिचितप्राण्यादिरूपेषु नेत्राभ्यामेव पूर्वैर्दृष्टा
इत्यत्र वर्ण्यते ।]

नक्षत्रमण्डलानि

पाश्चात्यज्योतिषग्रन्थेषु सर्वप्रथमं टालेमीमहोदयस्य ग्रन्थे ४८ संख्याकनक्षत्रमण्डला-



नक्षत्रसमूहानां कल्पितरूपाणि

नामुल्लेखो दृश्यते । तत्पूर्वं होमरादिरचितमहाकाव्येषु मृग-बहुल-सतर्प्यादिनक्षत्रमण्डलानामुल्लेखो वर्तते । आकाशस्य प्रायेण विभिन्नभागो नक्षत्राणां विभिन्नरूपाणि दृश्यन्ते । तानि नक्षत्रमण्डलानि कथ्यन्ते । एतेषां नामानि प्रायेण परिचितानां पशूनां पक्षिणां जञ्जीवानां ग्रीक-रोमकीयपुराण-वर्णितनरनारीणां नामभिः सम्बद्धानि । आधुनिकज्योतिर्विदामनुमानमिदं यदिदमाकाशस्य नक्षत्रमण्डलेषु विभाजनं तद्ग्रीकविदुषां कृतिर्नास्ति । ते ग्रीसवासिन इदं ज्ञानं कदाचित् स्वपूर्ववर्ति-
'बेबिलोनिया'-निवासिभ्योऽर्जितवन्तः । ते च कदाचित् स्वपूर्ववर्तिजनेभ्यः ।^१

अधुनापि नक्षत्रमण्डलानां महत्ता ज्योतिर्विद्यायां दृश्यते । नक्षत्रमण्डलानां कल्पना नक्षत्राणां नीहारिकाणामत्याकाशगङ्गासंस्थानानाञ्च स्थितिनिर्देशनायोपयुक्ता । यथा 'पोस्-कार्डा'दिषु पत्रसंज्ञायां नगरस्य नाम्नः पश्चात् प्रान्तस्य नाम्नो लेखनेन प्रेषणी (= डाकविभागः)-विभागस्तं सौविध्येन गन्तव्यस्थानं प्रेषयति, तथैव नक्षत्रं कस्मिन् मण्डले वर्तते इति ज्ञानेन तस्यावलोकनं सरलं भवति ।

नक्षत्रमण्डलानां पुरा सीमा पूर्णतया निर्धारिता नासीत्, परमधुना ख्रिस्ताब्दे १९२८ तमे 'अन्ताराष्ट्रिय-ज्योतिषसंघेन' प्रत्येकं सीमा सूक्ष्मतया निर्धारिता । एवं निश्चितानां नक्षत्रमण्डलानां संख्या ८८ अस्ति । नक्षत्रमण्डलानां नामान्यग्रिमानुच्छेदे दास्यन्ते ।

१०-११ नक्षत्राणां नामानि

प्रायेण पञ्चाशत्संख्याकनक्षत्राणां नामानि पुरातनानि सन्ति । कतिपयानां नामानि 'ग्रीक'-भाषायाः, 'रोमन'-भाषाया वा सन्ति, अन्येषाञ्च 'अरबी'-भाषायाः । अधुना नक्षत्राणां नामानि वैज्ञानिकग्रन्थेषु प्रायेण न प्रयुज्यन्ते । अधुना नामकरणं वैज्ञानिकपद्धत्या क्रियते । अर्थात् प्रथमं नक्षत्रमण्डलस्य नाम लिख्यते, ततश्च 'ग्रीक'वर्णमालाया वर्णाः प्रयुज्यन्ते । नक्षत्रमण्डलस्य भासुरतमस्य नक्षत्रस्य पश्चात् α (ग्रीकवर्णमालायाः प्रथमवर्णः) स्थाप्यते, ततस्तदल्पतर-भासुरस्य नक्षत्रस्य पश्चात् β (द्वितीयो वर्णः) स्थाप्यते, तत उत्तरोत्तरधूमिलत्वक्रमेण $\lambda, 8, \epsilon$ आदयो वर्णाः प्रयुज्यन्ते । अस्मिन् नामकरणे नक्षत्रमण्डलस्य षष्ठ्या रूपं प्रयुज्यते । यथा α -Geminorum नक्षत्रम् Gemini (मिथुन) नक्षत्रमण्डलस्य भासुरतमं नक्षत्रमस्ति ।

द्वितीया पद्धतिः 'फाल्मस्टीड'महोदयस्याभिमतः, प्रथमपद्धत्याः किञ्चिद् भिन्नास्ति । नक्षत्रमण्डलस्य पश्चतमनक्षत्रस्य पश्चात् '१' लिख्यते, एवमुत्तरोत्तरं पश्चिमदिशायाः पूर्वदिशां चलित्वा '२' '३' आदि संख्या लिख्यन्ते । एवं हंस-६१-नक्षत्रं हंसमण्डले पश्चतमभागात् ६१-तमं नक्षत्रम् ।

परन्तु दूरदर्शकीयनक्षत्राणां गणना त्वत्यधिकसंख्याका, अत एवैका तृतीया पद्धति-खलम्यते । नक्षत्राणां नामकरणं नक्षत्रसूच्या, नक्षत्रसूच्यां तस्य क्रमसंख्यया च क्रियते । एवं HD-३२४१६ नक्षत्रं 'हेनरी ड्रेपर'महोदयस्य नक्षत्रसूच्यां ३२४१६ तमायां संख्यायां वर्तते ।

(नक्षत्रमण्डलानां सारिण्यपरपृष्ठे द्रष्टव्या)

१. कदाचिद् भारतीयैर्भ्यः (?) ।

दशमोऽध्यायः

१६७

१०२ नक्षत्रमण्डलानां सारिणी

लैटिन-नामानि	षष्ठ्या रूपाणि	आंग्ल-नामानि	संस्कृत-नामानि
Andromeda	Andromedae	Andromeda	देवयानी
Antlia	Antlia	Air Panp	रिक्तीकरः
Apus	Apodis	Bird of Paradise	खगः
Aquarius	Aquarii	Watercarrier	कुम्भः
Aquila	Aquilae	Eagle	गरुडः
Ara	Arae	Altar	वेदी
Aries	Arietis	Ram	मेषः
Auriga	Aurigae	Charioteer	रथी
Bootes	Bootis	Herdsmen	भूतपः
Caelum	Caeli	Graving Tool	टङ्कम्
Camelopardalis	Camelopardalis	Giraffe	करमः
Cancer	Canceri	Crab	कर्कः
Canes Venatici	Canum Venaticorum	Hunting Dogs	मृगयाश्वानः
Canis Major	Canis Majoris	Larger Dogs	प्रश्वा
Canis Minor	Canis Minoris	Smaller Dog	श्वा
Capricornus	Capricorni	Sea-Goat	मकरः
Carina	Carinae	Keel	नौतलम्
Cassiopeia	Cassiopeiae	Cassiopeia	शर्मिष्ठा
Centaurus	Centauri	Centaur	किन्नरः
Cepheus	Cephei	Cepheus	वृषपर्वी
Cetus	Ceti	Whale	तिमिः
Chamaeleon	Chamaeleontis	Chameleon	कृकलासः
Circinus	Circini	Compasses	कर्कटकः
Columba	Columbae	Dove	कपोतः
Coma Berenices	Comae Berenices	Bernicis Hair	केशः
Corona Australis	Coronae Australis	Southern Crown	दक्षिणकिरीटः
Corona Borealis	Coronae Borealis	Northern Crown	उत्तरकिरीटः
Corvus	Corvi	Crow	काकः
Crater	Crateris	Cup	चषकः
Crux	Crucis	Cross	स्वस्तिकः
Cygnus	Cygni	Swan	हंसः

लैटिन-नामानि	षष्ठ्या रूपाणि	आंग्ल-नामानि	संस्कृत-नामानि
Delphinus	Delphini	Lolphen	धनिष्ठा
Dorado	Doradus	Dorado	असिमीनः
Draco	Draconis	Dragon	कालियः
Equuleus	Equulei	Little Horse	अश्वकः
Eridonus	Eridani	River	वैतरणी
Fornax	Fornacii	Furnace	अश्मन्तम्
Gemini	Geminorum	Twins	मिथुनम्
Grus	Gruis	Crane	वकः
Heroules	Herculis	Heroules	शौरी
Horologium	Horologii	Clock	होरामापकम्
Hydra	Hydrae	Sea Serpent	वासुकिः
Hydrus	Hydri	Water Snake	जलिका
Indus	Indi	Indian	सिन्धुः
Lacerta	Lacertae	Lizard	सरटः
Leo	Leonis	Lion	सिंहः
Leo Minor	Leonis minoris	Smaller Lion	सिंहकः
Lepus	Leporis	Hare	शशकः
Libra	Librae	Scales	तुला
Lupus	Lupi	Wolf	वृकः
Lynx	Lyncis	Lynx	विडालः
Lyra	Lyrae	Lyre	वीणा
Mense	Mensae	Take Mountain	शैलः
Microscopium	Microscopii	Microscope	सूक्ष्मदर्शकम्
Monoceros	Monocerotis	Unicorn	एकशृङ्गः
Musca	Muscae	Fly	मक्षिका
Norma	Normae	Level	अङ्किनी
Octans	Octantis	Octant	अष्टांशः
Ophiuchus	Ophiuchi	Serpent Holder	सर्पधरः
Orion	Orionis	Orion	मृगः
Pavo	Pavonis	Peacock	मयूरः
Pegasus	Pegasi	Pegasus	उच्चैःश्रवाः
Perseus	Persei	Perseus	ययातिः
Phoenix	Phoenicis	Phoenix	गृध्रः

दशमोऽध्यायः

१६६

लैटिन-नामानि	षष्ठ्या रूपाणि	आंग्ल-नामानि	संस्कृत-नामानि
Pictor	Pictoris	Easel	शिलीन्द्रः
Pices	Piscium	Fishes	मीनः
Pisces Austrinus	Piscis Austrini	Southern Fish	दक्षिणमीनः
Puppis	Puppis	Stern	नौपृष्ठम्
Pyxis	Pyxidis	Mariner's Compass	दिक्सूचकम्
Reticulum	Reticuli	Net	जालम्
Sagitta	Sagittae	Arrow	शरः
Sagittarius	Sagittarii	Archer	धनुः
Scorpius	Scorpii	Scorpion	वृश्चिकः
Sculptor	Sculptoris	Sculptor's Apparatus	मूर्तिकारफलकम्
Scutum	Scuti	Shield	(ढालम्) चर्मम्
Serpens	Serpentis	Serpent	सर्पः
Sextans	Sextantis	Sextant	षडंशः
Taurus	Tauri	Bull	वृषः
Telescopium	Telescopii	Telescope	दूरदर्शकम्
Triangulum	Trianguli	Triangli	त्रिभुजम्
Triangulum Australe	Trianguli Australis	Southern Triangle	दक्षिणत्रिभुजम्
Tucana	Tucanae	Toucan	चक्रवाकः
Ursa Major	Ursa Majoris	Larger Bear	सप्तर्षिः
Ursa Minor	Ursa Minoris	Smaller Bear	ऋक्षकः
Vela	Velorum	Sails	नौवस्त्रम्
Virgo	Virginis	Virgin	कन्या
Volans	Volantis	Flying Fish	उड्डायिमीनः
Vulpecula	Vulpeculae	Fox	लोमाशः

१०.३१ याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनकालः

पूर्वं वर्णितमेव यद् नक्षत्रस्य याम्योत्तरोलङ्घनकालो नक्षत्रस्य विषुवांशतुल्यः, अत एव विदितविषुवांशकस्य नक्षत्रस्य खगोले स्थितिर्नाक्षत्रकालेन शातुं सरला । निम्नसारिण्यां प्रतिपक्ष-मिष्टवेलायां याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनकारिनक्षत्रस्य नाक्षत्रकालो दत्तः ।

२००

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

सारिणी १०.३१

रात्रिकालिकहोराः

मासा	दिनाङ्काश्च	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	१	२	३	४	५	६
↓	नाक्षत्रकालः होरामानेन	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो	हो
६	जनवरी	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३
२१	जनवरी	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४
५	फरवरी	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५
२१	फरवरी	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६
५	मार्च	५	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७
२३	मार्च	६	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८
७	अप्रैल	७	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९
२२	अप्रैल	८	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०
७	मई	९	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१
२३	मई	१०	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२
७	जून	११	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३
२२	जून	१२	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४
७	जुलाई	१३	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	१
२३	जुलाई	१४	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	१	२
७	अगस्त	१५	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	१	२	३
२२	अगस्त	१६	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	१	२	३	४
६	सितम्बर	१७	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	१	२	३	४	५
२२	सितम्बर	१८	१९	२०	२१	२२	२३	२४	१	२	३	४	५	६
७	अक्टूबर	१९	२०	२१	२२	२३	२४	१	२	३	४	५	६	७
२२	अक्टूबर	२०	२१	२२	२३	२४	१	२	३	४	५	६	७	८
६	नवम्बर	२१	२२	२३	२४	१	२	३	४	५	६	७	८	९
२२	नवम्बर	२२	२३	२४	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
७	दिसम्बर	२३	२४	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
२२	दिसम्बर	२४	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११	१२

विशेषदृष्ट्यानि—

(१) 'लीप' वर्षेषु चितु 'मिनटाना' मन्तरं सम्भवम् ।

(२) गणनायां 'स्थानीयकालः' प्रयुक्तः, अत एव प्रामाणिककालं लब्धुं यथोचितसंस्कारः कर्तव्यः ।

(३) सारिण्यां 'नाक्षत्रकाल' एव प्रयुक्तः, अत एव मध्यमकालानयनाय यथोचितसंस्कारः कर्तव्यः ।

उदाहरणानि—

(अ) नक्षत्रविशेषस्य विषुवांशा ५ होरामिताः सन्ति । ६ नवम्बरे स कदा याम्योत्तर-मुल्लङ्घयिष्यति ?

६-नवम्बरे ५-होराङ्कः रात्रिकालिकद्वितीयहोराया अधः, अत एव नक्षत्रविशेषः रात्रौ द्विवादनवेलायामुल्लङ्घयिष्यति ।

(आ) इष्टनक्षत्रस्य विषुवांशा १७ होरामिताः । नक्षत्रं कस्मिन् दिनाङ्केऽर्धरात्रौ याम्योत्तरवृत्तमुल्लङ्घयिष्यति ?

रात्रिकालिक-२४ होराया अधः १७ अङ्कः ७ जूने अग्रे दृश्यते । अत एव नक्षत्रं जूने, अर्धरात्रौ याम्योत्तरवृत्तमुल्लङ्घयिष्यति ।

१०.३२ नक्षत्राणां दिनमानम्

अहोरात्रे नक्षत्रं यावत्कालं क्षितिजादुपरि तिष्ठति तावन्मात्रकः कालो नक्षत्रस्य दिनमान-मुच्यते । दिनमानं दर्शकस्य स्थानाक्षांशं नक्षत्रस्य क्रान्त्यंशं चापेक्षते । नक्षत्रदर्शनगणनायां दिनार्धमानान्यधिकं प्रयुज्यन्ते, अत एव भारतवर्षोपयुक्ता सारिण्याधो दीयते—

सारिणी १०.३२

नक्षत्राणां दिनार्धस्य मानम्

इष्टस्थानस्य	8 = नक्षत्राणां क्रान्त्यंशाः						
अक्षांशाः	+०	+१०	+२०	+३०	+४०	+५०	+६०
१ =	हो मि	हो मि	हो मि	हो मि	हो मि	हो मि	हो मि
०	६ ०	६ ०	६ ०	६ ०	६ ०	६ ०	६ ०
+५	६ ०	६ ४	६ ८	६ १२	६ १४	६ २४	६ ३२
+१०	६ ०	६ ७	६ १५	६ २२	६ ३०	६ ५०	७ १०
+१५	६ ०	६ ११	६ २३	६ ३६	६ ५२	७ १५	७ ४९
+२०	६ ०	६ १५	६ ३१	६ ४८	७ ८	७ ४३	८ ३६
+२५	६ ०	६ १९	६ ३९	७ ४	७ ३२	८ १२	९ ३४
+३०	६ ०	६ २४	६ ५४	७ २०	७ ५६	८ ५२	१२ ००
+३५	६ ०	६ २८	६ ५८	७ ३६	८ २४	९ ४४	—

सूत्र कोज्या (होराकोणः) = स्प १ स्प ८

अस्यां सारिण्यां प्रथमं प्रथमस्तम्भ इष्टस्थानस्याक्षांशाः पठितव्याः, ततस्तेषां सम्मुखवर्ति-पङ्क्त्यामिष्टनक्षत्रस्य क्रान्त्यंशानामधो दत्तः कालः पठितव्यः ।

उदाहरणम्—नक्षत्रस्य क्रान्त्यंशा +५० । देहरादूने (+३० अक्षांशाः) तस्य कियत्प्रमाणको दिनार्धः ।

हो मि
उत्तरम्— ८ ५२
२६

२०२

अर्वाचीन ज्योतिर्विज्ञानम्

१०.३३ याम्योत्तरवृत्तोल्लङ्घनकाले नक्षत्रस्य नतांशाः

याम्योत्तरवृत्तोल्लङ्घनकाले नक्षत्राणां नतांशाः^१ निम्नसारिण्या ज्ञायन्ते ।

सारिणी १०.३३

याम्योत्तरवृत्तोल्लङ्घनकाले नक्षत्राणां नतांशाः

स्थानविशेषस्य	नक्षत्रस्य क्रान्त्यंशाः									
क्रान्त्यंशाः अक्षांशाः—	८=०	१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०	९०
१ =	नतांशाः									
०	०	१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०	९०
५	-५	५	१५	२५	३५	४५	५५	६५	७५	८५
१०	-१०	०	१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०	८०
१५	-१५	-५	५	१५	२५	३५	४५	५५	६५	७५
२०	-२०	-१०	०	१०	२०	३०	४०	५०	६०	७०
२५	-२५	-१५	-५	५	१५	२५	३५	४५	५५	६५
३०	-३०	-२०	-१०	०	१०	२०	३०	४०	५०	६०
३५	-३५	-२५	-१५	-५	५	१५	२५	३५	४५	५५
४०	-४०	-३०	-२०	-१०	०	१०	२०	३०	४०	५०

सूत्रं नतांशाः = -१ + ८

उदाहरणम्—देहरादूनस्याक्षांशाः + ३० सन्ति । हंसनक्षत्रमण्डलस्य (क्रान्त्यंशाः + ४०°) याम्योत्तरवृत्तोल्लङ्घनकाले किंप्रमाणका नतांशाः ।

प्रथमं प्रथमस्तम्भे देहरादूनस्याक्षांशाः + ३० पठितव्याः । ततस्तेषां सम्मुखवर्तिपङ्क्त्यां हंसनक्षत्रमण्डलस्य क्रान्त्यंशानाम् (+ ४०) अधो दत्तः '१०' अङ्कः पठितव्यः । अत एव याम्योत्तरवृत्तोल्लङ्घनकाले तस्य नतांशा १०-मिता भविष्यन्ति । नतांशा धनात्मकाः सन्ति । अत एव याम्योत्तरवृत्तमनूत्तरदिशायां १० अंशान्तरे हंसमण्डलं द्रष्टव्यम् ।

१०.३४ नक्षत्राणां याम्योत्तरवृत्तोल्लङ्घनकालः, उदयकालः, अस्तकालश्च

ह-१०-३१-१०-३३ तमेषु दत्ताभिः सारिणीभिर्नक्षत्राणां याम्योत्तरवृत्तोल्लङ्घनकालादयः सप्तविधं लभ्यन्ते । प्रथममिष्टनक्षत्रस्य विषुवांशाः क्रान्त्यंशाश्च नक्षत्रसूच्यां (मानचित्रे वा) पठ्यन्ते । ततः सारिण्या १०.३१-तमया मध्यरात्र्या नक्षत्रकालः पठ्यते । सारिण्या १०.३२-तमया च नक्षत्रस्य दिनार्धमानं पठ्यते । नक्षत्रविषुवांशैर्मध्यरात्रिनाक्षत्रकालो विकल्प्यते, नक्षत्रस्य याम्योत्तरवृत्तोल्लङ्घनस्य स्थानीयकालो लभ्यते । तत उदयकालः (याम्योत्तरवृत्तोल्लङ्घनस्य स्थानीयकालः-नक्षत्रदिनार्धमानम्) अथवास्तकालः (याम्योत्तरवृत्तोल्लङ्घनस्य स्थानीयकालः +

१. नतांशाः = १०-उन्नतांशाः । याम्योत्तरवृत्तमनु उत्तरदिशायां ×, दक्षिणदिशायां नतांशा गण्यन्ते ।

दशमोऽध्यायः

२०३

नक्षत्रदिनार्धमानम्) लभ्यते । सारिण्या १०°३३-तमया च याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनकाले नक्षत्रस्य नतांशा लभ्यन्ते । एवं कालविशेषे खगोले नक्षत्रस्य याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनकालं ज्ञात्वा नक्षत्रं ससौविध्यं दृश्यते ।

उदाहरणम्—देहरादूनस्याक्षांशाः + ३० । स्वातीनक्षत्रस्य विषुवांशाः (आसन्नमानेन) ०६ हो, क्रान्त्यंशाश्च (आसन्नमानेन) + ७°३० । ७ = दिसम्बरे स्वातीनक्षत्रस्य याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनकालादीन् लभस्व ।

७-दिसम्बरे मध्यरात्र्या नाक्षत्रकालः ५ हो मितः (सारिण्या १०°३१ तमया) नक्षत्रस्य दिनार्धमानं (सारिण्या १०°३१-तमया त्रैराशिकेन) ६ हो १८ मि -होरादिकम् । नक्षत्रस्य याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनस्य स्थानीयकालः

$$६ हो - ५ हो = १ हो$$

$$\text{अत एव उदयकालः} = १ हो - ६ हो १८ मि = १८ हो ४२ मि \quad (\text{सायंकालिकः अस्त-६ हो ४२ मि})$$

कालः = १ हो + ६ हो १८ मि = ७ हो १८ मि (प्रातःकालिकः) याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनकालः = १ हो [सर्वमेतद् स्थानीयकालेन दत्तम्] सारिण्या १०°३३ तमया याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनकाले स्वातीनक्षत्रस्य नतांशाः—२२°३०-मिताः, अर्थात् खस्वस्तिकाद् दक्षिणदिशायां याम्योत्तरवृत्तमु २२.३० दूरे तद् वर्तते ।

१०.४ नक्षत्राणां मानचित्राणि

पूर्वानुच्छेदैर्गणनया त्रिष्टनक्षत्रस्य याम्योत्तरवृत्तोलङ्घनकालादयो ज्ञायन्ते, परं नक्षत्र-मण्डलानां नक्षत्राणां च स्थानादीनि स्थूलतया मानचित्रैः सुस्पष्टं लभ्यन्ते । अत एवाग्रे षड् मानचित्राणि दीयन्ते ।


प्रथममानचित्रे ध्रुवस्थानसमीपभाजां नक्षत्राणां स्थानानि चित्रितानि सन्ति । वृत्तस्य परिधौ मासानां नामानि दीयन्ते । (दिनाङ्काः परिधौ त्रैराशिकेनावगन्तव्याः) । यदि मानचित्र-मेवं स्थाप्यते यद् वेधदिनाङ्क उपरि भवति, तर्हि मानचित्रे केन्द्रप्रतोर्ध्वाधररेखा नवमहोराकालिक-याम्योत्तररेखां दर्शयति । दशमहोराकालिकयाम्योत्तररेखोपलब्धये मानचित्रं घटिकासूचिकाप्रति-कूलदिशायां होरैकस्थास्थानाद् भ्रामय; एकादशहोराकालिकयाम्योत्तररेखोपलब्धये मानचित्रं घटिका-

२०४

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

सूचिकाप्रतिकूलदिशायां होराद्वयस्थानेन भ्रामय । अष्टमहोराकालिकयाम्योत्तररेखोपलब्धये मान-
चित्रं घटिकासूचिकानुकूलदिशायां होरैकस्थास्थानाद् भ्रामय ।

द्वितीय-तृतीय-चतुर्थ-पञ्चम-मानचित्रेषु नानर्तुषु दृष्टानां नक्षत्राणां स्थानानि दत्तानि ।
ऋत्वनुकूलमानचित्रं गृहीत्वा मासानुसारं (दिनाङ्कानुसारं त्रैराशिकेन) होरावृत्तं पश्य । दिनाङ्क-
प्रोतहोरावृत्तं तद्दैनिकीं नवमहोराकालिकयाम्योत्तररेखां प्रकटयति । विभिन्नहोराकालिकवेधनाय
पूर्ववद् मानचित्रं भ्रामय ।




९।

उत्तरार्धे सदीदिननक्षत्रानि

दशमोऽध्यायः


२०५



शिशिरकालीन नक्षत्रमण्डलम्

दशमोऽध्यायः


२०७




शरत्कालीनं नक्षत्रमण्डलम्

२०८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्



नक्षत्रकालीनतत्त्वप्रणयनम्



दाक्षिणाधर्षे सर्वदादितनक्षत्राणि

१०.५ राशिचक्रम्

पूर्वानुच्छेदेषु नक्षत्रमण्डलानि वर्णितानि । अधुना महाकाशस्यान्यद् विभाजनं वर्ण्यते । सूर्यचन्द्रादयः खगोलस्य स्वभ्रमणेषु सर्वाणि स्थानानि नातिक्रामन्ति । सूर्यः केवलं क्रान्तिवृत्ते भ्रमति । अन्ये च ग्रहाः केवलं क्रान्तिवृत्तमुपर्यधो वाष्टांशदूरान्तरे भ्रमन्ति । अत एव ग्रहाणां स्थितिं ज्ञातुं नावश्यकता ८८-नक्षत्रमण्डलानां ज्ञानस्य । केवलं १६-अंशव्यापिमेखला पर्याप्ता । अत एव पुराकाले द्वादशराशीनां प्रयोगो दृश्यते ।

२१०


अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

१६-अंशव्यापिमेलला राशिचक्रं कथ्यते । तस्या मध्ये क्रान्तिवृत्तं वर्तते । अस्या मेललाया द्वादश विभागा ज्योतिर्विद्भिः कृताः । तेषां नामानि मेषादयः सन्ति । अधो दीयन्ते राशीनां नामानि—

	लैटिन-नाम	आंग्ल-नाम	संस्कृत-नाम
१.	Aries	Ram	मेषः
२.	Taurus	Bull	वृषः
३.	Gemini	Twins	मिथुनम्
४.	Cancer	Crab	कर्कः
५.	Leo	Lion	सिंहः
६.	Virgo	Virgin	कन्या
७.	Libra	Scale	तुला
८.	Scorpio	Scorpion	वृश्चिकः
९.	Sagittarius	Archer	धनुः
१०.	Capricornus	Goat	मकरः
११.	Aquarius	Water Bears	कुम्भः
१२.	Pisces	Fish	मीनः

१०-६ कृत्रिमतारामण्डलगृहम्

नक्षत्राणां स्थानबोधो मानचित्रेण सामान्यतया क्रियते । वंशशलाकानिर्मितखगोलेनापि



कृत्रिमतारामण्डलगृहम्

१. राशीनामभिज्ञाः सर्वे भारतीयपरिहताः, अत एवातिसंक्षेपेण तेषां विवरणं कृतम् ।

ज्ञानं सुलभं भवति । परन्तु कृत्रिमतारामण्डलगृहे कृत्रिमनक्षत्राणि कृत्रिमग्रहादयश्च कृत्रिमाकाशे चलन्ति, अत एव तत्र तेषां दर्शनेन ज्ञानं सरलतया भवति ।

कृत्रिमतारामण्डलगृहं गोलार्धाकारं गृहमेव । भूतले दर्शकास्तिष्ठन्ति, तेषामुपरि गोलार्धाकार आकाशो वर्तते । एको यन्त्रविशेषो मध्ये स्थाप्यते । यन्त्रविशेषे विविधस्थानेषु छिद्राणि सन्ति, येष्यो निर्गताः प्रकाशकिरणा अन्धकारपूर्णनभसि प्रकाशविन्दून् सृजन्ति । यन्त्रविशेषः स्वस्थाने भ्रमत्यपि । एवमन्धकारपूर्णनभसि चलन्तः प्रकाशविन्दवो दृश्यन्ते । ते विन्दवः सूर्यचन्द्रादीन् प्रदर्शयन्ति । २१० पृष्ठे द्रष्टव्यं फोटोचित्रम् ।^१

विशेषद्रष्टव्यानि

अस्माकं ज्यौतिषशास्त्रे नक्षत्रमण्डलानि नक्षत्रनाम्ना प्रसिद्धानि । पाश्चात्यानामाकाशस्य ४८-संख्याकनक्षत्रमण्डलेषु ८८-संख्याकनक्षत्रमण्डलेषु वा विभाजनमवैज्ञानिकं प्रतीयते तद् ऐच्छिकमस्ति । नक्षत्रमण्डलानां नामानि कल्पनाप्रसूतानि । परं नैवमस्माकं ज्यौतिषशास्त्रे । अस्माकं नक्षत्राणां नामानि योगतारानामानुसारीणि । अत एव प्रतीयते यत् पूर्वं तैज्योतिर्विद्विर्वेधेन योगताराणां भोगांशादीन् विज्ञाय, तत्समीपवर्तितक्षेत्राणां योगतारानामानुसारं नामानि कृतानि ।

आकाशस्येदं २७-नक्षत्रेषु विभाजनं पूर्णतया भारतीयानां कृतिः । वेदेषु नक्षत्राणां निम्ननामानि दृश्यन्ते—

कृत्तिका, रोहिणी, मृगशीर्षम् (इन्वका), आर्द्रा (बाहू), पुनर्वसुः, तिष्यः, आश्लेषा, मघा, फल्गुनी, (पूर्वा), फल्गुनी (उत्तरा), हस्तः, चित्रा, स्वाती, (निष्टया), विशाखा, अनुराधा, (रोहिणी) ज्येष्ठा, मूलः (चित्रतौ, मूलवर्हणी), अषाढा (पूर्वा०), अषाढा (उत्तरा०), अभिजित्, श्रोणा, श्रविष्ठा, शतभिषक्, प्रोष्ठपदा, रेवती, अश्वयुज्, अपमरणी ।

इदं २७-नक्षत्रेषु विभाजनं चन्द्रकक्षासमीपवर्तितबृहदाकाशस्यैव विभाजनम् । सूर्यमार्गस्तु १२-भागेषु (राशिनाम्ना प्रसिद्धेषु) विभाजितस्तैः ।

* * * * *

१. अचिरापूर्वं देहलीनगरे अन्ताराष्ट्रिय-उद्योग-प्रदर्शिन्यामेकं कृत्रिमतारामण्डलगृहमासीत् ।

एकादशोऽध्यायः


नक्षत्रम्

[कथं नक्षत्राणि भास्वन्ति ? कुत्र च तेषां स्थितिः ? किं तान्यचलानि ? किं तेषां स्वरूपम् ? इत्यादीन्यत्र व्याख्यायन्ते ।]

११.१ नक्षत्राणां भास्वरत्वकोटिः

नक्षत्राणां भास्वरत्वमूलवर्गीकरणाय प्राचीनानामर्वाचीनानां च सर्वेषां ज्योतिर्विदां स्वाभाविकः प्रयासः, यतो नक्षत्राणां भास्वरत्वविषये वैभिन्न्यं प्रत्यक्षमेव—कानिचन नक्षत्राणि भासुराणि दृश्यन्ते, कानिचन च धूमिलानि । यूरोपे सर्वप्रथमं प्राचीनकाले 'टालेमी'-महोदयेन चाक्षुषनक्षत्राणां (यानि नक्षत्राणि, दूरदर्शकयन्त्रेण विना, नेत्राभ्यामेव दृष्टिगोचरतां यान्ति, तानि चाक्षुषनक्षत्राणि प्रोच्यन्ते) षट्कोट्यो निर्धारिताः । प्रथमकोट्यां पञ्चदशसंख्याकानि सर्वाधिक-भासुराणि नक्षत्राणि स्थापितानि, द्वितीयकोट्यां प्रथमकोटिकनक्षत्रेभ्यः किञ्चिद् धूमिलानि पञ्चा-शन्नक्षत्राणि स्थापितानि; एवमुत्तरोत्तरधूमिलत्वक्रमेण प्रथमकोटि-षष्ठकोटि-मध्यवर्तिकोटिषु नक्षत्राणि स्थापयता तेन षष्ठकोट्यां तानि सर्वाधिकधूमिलनक्षत्राणि स्थापितानि यानि तीक्ष्णदृष्टिकैर्नरैश्चन्द्र-रहितनिशायां विना दूरदर्शकयन्त्रेण दृष्टिगोचरत्वमुपयान्ति । सप्तमकोटिकानां नक्षत्राणामीक्षणं न शक्यं विना दूरदर्शकयन्त्रेण ।

नक्षत्राणां 'टालेमी'निश्चितकोटिषु स्थापनं बहुकालपर्यन्तमुररीकृतं ज्योतिर्विद्भिः, परन्तु ख्रिस्तीयोनिर्विशतिशतककालिकज्योतिर्विद्भिरवगतं यदिदं वर्गीकरणमतिस्थूलमेव । अत्र चाक्षुष-नक्षत्राणां सूक्ष्मतया स्थापनं दूरदर्शकदृष्टनक्षत्राणां स्थापनं वाऽसम्भवमासीत् । अत एव सूक्ष्मतया



[चित्रे षड् विद्युद्दीपाः, प्रथमस्य दीप्तिः शतमिता, षष्ठस्य दीप्तिरेकमिता, मध्यवर्ति-विद्युद्दीपानां ३१.८, १५.८५, ६.३१, २.५१ मिता दीप्तिः । एवमेव नक्षत्राणां भास्वरत्वम् ।]
कोटिनिर्णयप्रसङ्गे समागतो ज्योतिर्विदां समक्षं महत्त्वपूर्णोऽयं प्रश्नः—प्रथमकोटिकानां द्वितीय-कोटिकानां नक्षत्राणां मध्ये भास्वरत्वविषये कीदृशः सम्बन्धः ? इति । प्रारम्भे प्रश्नस्यास्योत्तरं दातुं तेऽसमर्था आसन्, परन्तु ख्रिस्तान्दे १८५६-तमे 'पागसन'महोदयो मनोवैज्ञानिकसूक्ष्मपरी-

क्षणसाहाय्येन समर्थोऽभवत् । तेन दृष्टं यत् प्रथमकोटिकनक्षत्राणि षष्ठकोटिकनक्षत्रापेक्षया शतगुण-
भासुराणि । 'हर्शल'महोदयेन पूर्वमेव १८३०-तमे ख्रिस्ताब्दे व्याख्यातमासीद् यद् यदि कोटि-
संख्याः समान्तरश्रेण्यां वर्धन्ते, तर्हि भास्वरत्वं गुणोत्तरश्रेण्यां वर्धते । एवं प्रथमकोटिकानां षष्ठकोटि-
केभ्यः शतगुणभास्वरत्वाद्, भास्वरत्वस्य च गुणोत्तरश्रेण्यां स्थितत्वात्, प्रथमकोटिकानां
द्वितीयकोटिकानां नक्षत्राणां मध्ये भास्वरत्वविषये सम्बन्धो ज्ञायते । प्रथमकोटिकानि षष्ठकोटिकेभ्यः
पञ्चाधिककोटिकानि, पञ्चकोट्यन्तरेषु च शतगुणभास्वरत्वम्, अत एव

एकस्मिन् कोट्यन्तरे $5\sqrt{100} = 2.512$ गुणकं भास्वरत्वम् ।

प्रथमकोटिकानि नक्षत्राणि प्रायो विंशतिसंख्याकानि, परन्तु न तेषां समभास्वरत्वम्—
कस्यचिद् भास्वरत्वमधिकं कस्यचिच्च किञ्चिन्न्यूनम् । अत एव प्रमाणदण्डोऽवश्यं निश्चेतव्य इति
विचार्य ज्योतिर्विद्भिः सर्वसम्मत्या वृषराशिस्थं रोहिणीनक्षत्रं कुम्भराशिस्थं श्रवणनक्षत्रं वादर्श-
प्रथमकोटिकनक्षत्रं गणितम् ।

११.११ शून्यकोटिः, ऋणकोटयश्च

यथा द्वितीयकोटिकनक्षत्रभास्वरत्वस्य २.५१२-गुणकभास्वरत्वं प्रथमकोटिकनक्षत्रस्य, तथैव
प्रथमकोटिकनक्षत्रभास्वरत्वस्य २.५१२-गुणकभास्वरत्वं शून्यकोटिकनक्षत्रस्य मन्यते । अर्थाद्
यदि कस्यचिन्नक्षत्रस्य भास्वरत्वं प्रथमकोटिकादर्शनक्षत्रभास्वरत्वस्य २.५१२-गुणकशून्यकोटि-
भास्वरत्ववतो नक्षत्रस्य ऋणैककोटिर्निर्धारयितव्या । एवं २-कोटिः-३-कोटिरित्यादिकोटयः
कल्प्यन्ते । लुब्धकनक्षत्रमुज्ज्वलतमं नक्षत्रं तस्य कोटिश्च १.६ मिता ।

११.१२ षष्ठाधिका कोटिः

तानि नक्षत्राणि यानि दूरदर्शकयन्त्रेण विना तीव्रदृष्टिकैर्नैश्चन्द्रहीननिशायामीक्ष्यन्ते षष्ठ-
कोटिकानीति पूर्वं व्याख्यातम्, परन्तु सन्त्यनेकानि नक्षत्राणि यानि न दृश्यन्ते नेत्राभ्याम् । ईदृशानि
बहुसंख्यायां दूरदर्शकयन्त्रेण नेत्रगोचरतां भजन्ते । एतानि दूरदर्शकीयनक्षत्राणि कथ्यन्ते । परन्तु
दूरदर्शकीयनक्षत्राण्यपि भास्वरत्वविषये विभिन्नानि, तेषाञ्चाप्युत्तरोत्तरधूमिलत्वक्रमेण सप्तमाष्टमादि-
कोटयो गण्यन्ते । एतेषां कानिचनतिस्पष्टानि चक्षुस्तालेन नेत्राभ्यामेवावलोक्यन्ते, कानिचन च
दूरदर्शकनिहित'कैमरा'यन्त्रगृहीतफोटोचित्र एव लभ्यन्ते । यतो नेत्रतारिकयोर्भास्वरत्वप्रभावः
क्षणिकः, परन्तु फोटोफले दीर्घकालीनोद्घाटनेन दीर्घकालपर्यन्तं नक्षत्रप्रकाशः पतति, अतिधूमि-
लानि नक्षत्राण्यपि प्रकाशतां यान्ति (विस्तरेण व्याख्यातमिदं ६१.७५ तमे) । शत-इञ्जीय-
दूरदर्शकयन्त्रेण + २१.५-कोटिकनक्षत्राण्यपि ग्राह्यन्ते, २००-इञ्जीयदूरदर्शकयन्त्रेण + २२.५-
कोटिकनक्षत्राण्यपि^१ दृश्यन्ते ।

११.१३ सूर्यचन्द्रशुक्राणां कोटिः

सूर्यस्य भास्वरत्वकोटिः २६.७२ मिता, अर्थात् प्रथमकोटिकनक्षत्रभास्वरत्वापेक्षया
१,२२,१८,००,००,०००-गुणकमस्य भास्वरत्वम् । चन्द्रस्य कोटिः १२.५ अर्थात् २,५१,२००

१. २२.५ कोटिकनक्षत्राणां धूमिलत्वमेवं सरलतया बोध्यते-यदि ३६,८१,६८,०००-
संख्याकानि २२.५ कोटिकनक्षत्राणि मिलित्वैकः पिण्डो भवेत्तर्हि स पिण्डः
प्रथमकोटिकनक्षत्रतुल्यो भास्वरत्वविषये भवेत् ।

२१४

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

प्रथमकोटिकनक्षत्राणां समूहश्चन्द्रतुल्यो भवेत् । शुक्रस्य सर्वाधिकौज्ज्वल्यकाले प्रायः ४.३ मिता कोटिः ।

११.१४ सापेक्षिकभास्वरत्वनिश्चयः

यदीष्टनक्षत्रस्य कोटिः को_१, उपमेयनक्षत्रस्य कोटिः को_२, तयोर्भास्वरत्वञ्च क्रमशः भा_१, भा_२, तर्हि तेषां सापेक्षिकभास्वरत्वमनेन सूत्रेण ज्ञायते—

$$\text{सापेक्षिकभास्वरत्वम्} \frac{\text{भा}_1}{\text{भा}_2} = २.५१२^{(को_२-को_१)}$$

$$\text{अथवा लघुगणक} \frac{\text{भा}_1}{\text{भा}_2} = ०.४^{(को_२-को_१)}$$

उदाहरणम्—शुक्रस्य कोटिः—४.३ मिता । तस्य प्रथमकोटिकनक्षत्रापेक्षया भास्वरत्वं गणय ?

$$\frac{\text{भा शुक्रस्य}}{\text{भा प्रथमकोटिनक्षत्रस्य}} = २.५१२^{\{१-(४.३)\}}$$

$$= २.५१२^1 + ४.३ = २.५१२^{५.३} = १३२$$

अर्थात् शुक्रस्य भास्वरत्वं = १३२ गुणकप्रथमकोटिकनक्षत्रभास्वरत्वम् । एवं शुक्रः १३२-प्रथमकोटिकनक्षत्राणां समूहेन तुल्यः ।

११.२ कोटिभेदाः, तन्निश्चयविधयश्च

अचिरात्पूर्वं दूरदर्शकयन्त्रेण नेत्राभ्यामेव कोटिनिर्णयोऽक्रियत, परन्त्वधुना वेधशालायां फोटोविषयकयन्त्रै रश्मिविश्लेषकयन्त्रैरन्यैश्च सूक्ष्मगणनयन्त्रैरनेकेषामदृष्टपूर्वाणां नक्षत्राणां कोटिनिश्चयः सूक्ष्मतया क्रियते । कोटिभेदा नैकाः, तथापि प्रमुखभेदास्तेषां विभिन्ना निश्चयविधयश्चाधो दीयन्ते ।

११.२१ (क) चाक्षुषकोटिः


नेत्राभ्यामेव कोटिनिश्चयीकरणमवश्यमतिदुष्करम्, परन्तु नक्षत्रद्वयस्य सापेक्षिकभास्वरत्वनिर्धारणं सर्वथा सरलमेव । अत एव चाक्षुषकोटिः सापेक्षिकभास्वरत्वं निर्धार्य निश्चीयते । अत्र द्वे पद्धती प्रसिद्धे—

(१) ध्रुवनक्षत्रस्य प्रकाशरश्मय एकस्माद् दर्पणात् परावृत्य तस्मिन्नेव दूरदर्शकदृष्टक्षेत्र आपतन्ति यस्मिन्निष्टनक्षत्रकिरणाः पतन्ति । एकेन सूक्ष्मयन्त्रेण ध्रुवनक्षत्रस्य प्रकाशकिरणानामापतनमात्रा तावन्मूना क्रियते यावद् ध्रुवनक्षत्रस्य भास्वरत्वमिष्टनक्षत्रभास्वरत्वतुल्यं भवति । सूक्ष्मयन्त्रे (‘फोटोमीटर’नामयन्त्रे) सूक्ष्मगणनसाधनानि विद्यन्ते, यैर्ध्रुवनक्षत्रस्येष्टनक्षत्रापेक्षया भास्वरत्वगुणकं निश्चीयते । भास्वरत्वगुणकोपलब्धेः कोटिनिश्चयः सुसरलः ।

(२) ध्रुवनक्षत्रस्य कदाचिदनुपलब्धत्वात् (यथा दक्षिणीयगोलार्धे) दुर्लभत्वाच्च (यथा मेघावृताकाशे) इष्टनक्षत्रकोटिनिश्चये तद्वाधापतति, अत एव तद्वाधापरिहारार्थं ज्योतिर्विद्भिर्ध्रुवनक्षत्रभास्वरत्वतुल्यभास्वरत्ववान् कृत्रिमप्रकाशो रचितः । अनेन कृत्रिमप्रकाशेन तोल्यते इष्टनक्षत्रभास्वरत्वम् ।


११.२२ (ख) फोटोविषयककोटिः

यदि कस्यचिदाकाशखण्डस्य फोटोचित्रमालिख्यते, फोटोचित्रञ्च परीक्ष्यते तर्हि तत्र कस्य-
चित्रक्षत्रस्य विम्बं किञ्चिद् बृहत्, कस्यचिच्च किञ्चिद् लघु दृश्यते । (द्रष्टव्यमत्र फोटोचित्रम्)—



अत्रोपरि स्थितस्य नक्षत्रस्य व्यासोऽधिकः, अत एव तस्य भास्वरत्वमधिकम् ।

इदं सुव्यक्तमेव यद् बृहती छायातिभासुराणां भानाम्, लघ्वी च छायात्यभासुराणां
भानाम् । अयं नक्षत्रप्रतिबिम्बव्यास-भास्वरत्व-सम्बन्धो मूलाधारः सूक्ष्मफोटोविषयककोटिनिर्ण-



रक्तशोधनयन्त्रयुक्तकैमरागृहीतचित्रम्

नीलशोधनयन्त्रयुक्तकैमरागृहीतचित्रम्

§ ११.२३१ द्रष्टव्यम्

यस्य । परन्त्वत्रेदं स्मर्तव्यं यत् फोटोफलकं वस्तूनां विभिन्नान् वर्णान् समरूपेण न गृह्णाति । नीलवर्णः फोटोफलकं क्षिप्रं प्रभावितं करोति, तस्य प्रतिबिम्बश्च गाढं दीर्घश्च भवति, रक्तवर्णश्च फोटोफलकं विलम्बेन प्रभावितं करोति, तस्य प्रतिबिम्बश्च तावन्मात्रा गाढं दीर्घश्च न भवति । अत एव नीलवर्णानां नक्षत्राणां प्रतिबिम्बव्यासस्तत्समभासुररक्तवर्णनक्षत्राणां प्रतिबिम्बव्यासात् सर्वथा फोटोफलक आयतो दृश्यते, अर्थान्नीलवर्णनक्षत्राणां कोटिस्तत्समभासुररक्तवर्णनक्षत्रकोट्य-
पेक्षया न्यूना प्रतीयते ।

पद्धतिः

यद्येकस्मिन्नेव फोटोफलके समकालिकोद्घाटनं प्रदायैकस्य नक्षत्रस्य द्वे फोटोचित्रे गृह्येते । प्रथमचित्रग्रहणे फोटोयन्त्रकुहरं पूर्णं विवृतम्, द्वितीयचित्रग्रहणे फोटोयन्त्रकुहरं ६ अंशमितं विवृतम्, तर्हि द्वितीयचित्रगतप्रतिबिम्बव्यासेन गणिता फोटोविषयककोटिः प्रथमचित्रगतप्रतिबिम्बव्यास-
गणितकोट्यपेक्षया त्वेकमिताल्पा । अनेन सिद्धान्तेनोपमेयनक्षत्रस्य तुलनायामिष्टनक्षत्रस्य कोट्यन्तरं निश्चीयते । ततो वास्तविकी फोटोविषयककोटिर्गण्यते । अत्र प्रमाणदण्डरूपं लुब्धकनक्षत्रस्य भास्वरत्वम् । तच्च ज्योतिर्विद्भिः सर्वसम्मत्या-१०६ मितं गृहीतम्, अर्थाद् लुब्धकस्य फोटो-
विषयककोटिश्चाक्षुषकोटिसमैव ।

तुलनासौकर्याय ज्योतिर्विद्भिः केप्लाञ्चिन्नक्षत्राणां फोटोविषयककोटिः सूक्ष्मगणनया सुनिश्चिता । यतो ध्रुवनक्षत्रं ध्रुवसमीपवर्तिनि नक्षत्राणि च प्रायेण सर्वत्र (उत्तरीयगोलार्धे) सर्वदा दृश्यन्ते । अत एव ध्रुवादंशद्वयान्तवर्तिनां ९६-संख्याकानां नक्षत्राणां कोटयो निर्विवाद-
रूपेण निश्चिताः । अत्र प्रथमकोटिकादारभ्य विंशतिकोटिपर्यन्तं नक्षत्राणि वर्तन्ते । तैस्तुलनां विधाय भास्वरत्वतारतम्यफोटोविषयकोटिर्निश्चीयते । अयं ९६-नक्षत्राणां समूहो 'ध्रुवश्रेणी' नाम्ना प्रसिद्धः ।

११.२३ (ग) फोटोचान्द्रकोटिः

पूर्वानुच्छेदे व्याख्यातं यत् फोटोफलकं नक्षत्रभास्वरत्वेन समरूपेण प्रभावितं न भवति । तस्य नीलवर्णग्राहकताऽधिका, रक्तवर्णग्राहकता चाल्पा । अत एव फोटोविषयककोटिश्चाक्षुषकोटे-
भिन्ना । परन्तु फोटोफलकमपि नेत्रतारकमिव वर्णग्राहि भवेदिति व्यवहारसौकर्याय ज्योतिर्विदां चिराकाङ्क्षा, सा चाधुना विशेषप्रकाशशोधनयन्त्रस्याविष्कारेण सकला । फोटोयन्त्रमुखे विशेषप्रकाश-
शोधनयन्त्रं स्थाप्यते । प्रकाशशोधनयन्त्रमेवं रच्यते यत्तेन शुद्धानां किरणानां प्रभावो फोटोफलके नेत्रतारकयोरिव । अत एव फोटोफलकापतितकिरणा नेत्रदृष्टप्रतिबिम्बसमं प्रतिबिम्बं रचयन्ति । एवं निश्चिता कोटिः फोटो-चान्द्रकोटिः प्रोच्यते ।

११.२३१ वर्णसूचकम्

पूर्वं स्पष्टीकृतं यत् प्रकाशशोधनयन्त्ररहितफोटोयन्त्रेण समभासुराणामपि नक्षत्राणां विभिन्नवर्णवत्त्वाद् विभिन्ना फोटोफलके छाया, परन्त्वत्र वर्तते भिन्नतायामपि नियमः । फोटो-

एकादशोऽध्यायः

२१७

विषयकोटि-चाक्षुषकोटिमध्य उपलभ्यते नियमविशेषः । फोटोविषयकोटि-चाक्षुषकोट्यन्तरं नक्षत्रस्य वर्णापेक्षि । इदमन्तरं नक्षत्रस्य वर्णसूचकं कथ्यते । अर्थात्—

फोटोविषयकोटिः—चाक्षुषकोटिः = वर्णसूचकं यदि कस्यचन नक्षत्रस्य रक्तवर्णकस्य चाक्षुषकोटिः (फोटोचाक्षुषकोटिर्वा) + ४.०-मिता, निश्चयतस्तस्य फोटोविषयकोटी रक्तवर्णत्वात् किञ्चिदधिका, यथा + ५.५-मिता, तर्हि वर्णसूचकं + १.५-मितम् । एवमेव यदि कस्यचिन्नीलवर्णकस्य नक्षत्रस्य चाक्षुषकोटिः + ४.८ मिता, फोटोविषयकोटिश्च + ४.९-मिता, तर्हि तस्य वर्णसूचकं—०.१ मितम् । यथा यथा नक्षत्रस्य वर्णोऽधिकाधिकं रक्तस्तथा तथा वर्णसूचकं धनदिशायां वर्धते, यथा यथा तस्य वर्ण उत्तरोत्तरं नीलस्तथा तथा ऋणदिशायां वर्णसूचकं वर्धते ।

पूर्वानुच्छेदे (§ ११.२३-तमे) व्यक्तं यद् लुब्धकस्य फोटोविषयकोटिश्चाक्षुषकोटिसम-१.६-मिता, अत एव लुब्धकस्य वर्णसूचकं शून्यमितम् । ऋणदिशायां वर्णसूचकं—०.३ पर्यन्तम्, धनदिशायाञ्च वर्णसूचकं + २ पर्यन्तम् (अतिधूमिलनक्षत्राणाञ्च + १४ पर्यन्तम्) ।

व्यवहारे वर्णसूचकमचिरेणैष्टनक्षत्रस्य विभिन्नवर्णग्राहिकफलपतितविम्बस्य परीक्षणेन तुलनया च गण्यते । नीलवर्णग्राहिकले रक्तवर्णग्राहिकले चैकस्यैवाकाशक्षेत्रस्य द्वे फोटोचित्रे §-११.२२-तमे दत्ते ।

वर्णसूचकस्य ज्योतिर्भौतिकशास्त्रेऽतिमहत्त्वं वर्तते । वर्णसूचकेन वर्णच्छत्रीयवगः (§ ११.७-तमे), तापक्रमश्च (§ ११.६२-तमे) ज्ञायते ।

११.२४ (घ) फोटोविद्युत्कोटिः

भास्वरत्वं फोटोविद्युत्पद्धत्यापि निश्चीयते, एवं निश्चिता च कोटिः फोटो-विद्युत्कोटिरुच्यते । यदा प्रकाशकिरणाः सोडियम-पोटैशियम-रूबीडियमादिधातुषु पतन्ति, तदा धातवः पतितकिरणमात्रानुसारं विद्युत्कणानुद्गिरन्ति—यदि किरणमात्राऽधिका तर्हि अधिकमात्रया विद्युत्कणा उद्गूर्यन्ते, यदि किरणमात्राऽल्पा तर्हि स्वल्पमात्रया विद्युत्कणा उद्गूर्यन्ते । अत्राल्यन्तसूक्ष्मग्राहिणा यन्त्रेण (द्रष्टव्यमत्रयं फोटोचित्रम्) उद्गूर्णविद्युत्कणा गण्यन्ते । सिद्धान्तोऽयं नक्षत्रभास्वरत्वविषयेऽपि प्रयुज्यते । इष्टनक्षत्रस्योपमेयनक्षत्रस्य च प्रकाशकिरणोद्गूर्णविद्युत्कणा गण्यन्ते, परस्परं भास्वरत्वतारतम्यं च लभ्यते । यस्तारतम्य-



‘फोटीमीटर’ यन्त्रम्
[हार्वर्ड-वेधशाला]

गणनसिद्धान्तश्चाक्षुषकोटिविषये फोटोविषयककोटिनिर्णये वा स्वीकृतः स एवात्रोत्तरीक्रियते, अर्थात् प्रथमकोटिकनक्षत्रस्य भास्वरत्वं षष्ठकोटिकनक्षत्रभास्वरत्वापेक्षया शतगुणकम् । यथा फोटो-विद्युद्गृहीतप्रकाशरश्मयो नेत्रगृहीतप्रकाशरश्मिभ्यो नितान्तं भिन्नाः, अत एव न विद्यते कोऽपि स्फुटसम्बन्धो फोटोविद्युत्कोटि-चाक्षुषकोटिमध्ये । अनया चाधुनिकतमया पद्धत्या पूर्वप्रचलित फोटोपद्धतिः प्रायेणापाकृता । अनया च फोटोविद्युत्पद्धत्या सर्वाधिकं सूक्ष्मतया भास्वरत्वतारतम्य-मानमधिगम्यते, विकारिनक्षत्राणाञ्च भास्वरत्वतारतम्यविषये त्वयं पद्धतिरेव सफला ।

११-२५ (ड) यथार्थकोटिः

इतः पूर्वमस्माभिर्या कोटिर्निर्धारिता सा प्रतीयमाना कोटिरेव । सा नक्षत्रस्य यथार्थभास्वर-त्वकोटिं दूरत्वञ्चापेक्षते । लौकिकव्यवहारेऽपि दृष्टमेव सर्वैर्यद् यथार्थभास्वरत्वं भास्वरत्वं दूरत्वं चापे-क्षते । अर्थाद् यथा यथा भासुरपदार्थो दूरं गच्छति तथा तथा तस्य भास्वरत्वं मन्दं प्रतीयते, यथा यथा च स समीपमागच्छति तथा तथा तस्य भास्वरत्वं तीव्रं प्रतीयते । एकोऽतिभासुरः, परन्त्वति-दूरवर्तिपदार्थ एवं न प्रकाशवान् स्याद् यथैकस्तदल्पभासुरः किन्तु समीपवर्तिपदार्थः । अनेन नियमेन एकं वस्तुतोऽतिभासुरं नक्षत्रं सुदूरवर्तित्वात्तथा न प्रकाशते यथान्यत्तदपेक्षया समीपवर्ति-स्वल्पभासुरं नक्षत्रम् । अत एव यथार्थभास्वरत्वं प्रतीयमानभास्वरत्वाद् भिन्नम् ।

यथार्थकोटिरेवं निर्णयिते । यतो यथार्थकोटिर्दूरत्वापेक्षिणी, अत एव प्रमाणदूरत्वे प्रत्येकं नक्षत्रस्य किमात्रकं प्रतीयमानभास्वरत्वं स्यादिति निश्चित्य यथार्थकोटिनिश्चयः शक्यः । प्रमाणदूरत्वमिदं दशपारसेकमितम्^१ उत्तरीकृतं सर्वै ज्योतिस्सूचिभिः । अर्थादिष्टनक्षत्रं निजयथार्थदूरत्वं विहाय दशपारसेक-(३२६ प्रकाशवर्ष)^२ दूरत्वे स्थितं सद् यावन्मात्रकं भास्वरत्वं प्रकटयेत्, या च तस्य प्रतीयमाना कोटिर्भवेत्, तत्तस्य यथार्थभास्वरत्वम्, सा च तस्य यथार्था कोटिः ।

उपरि व्यक्तमेव यथार्थभास्वरत्वकोटिर्यथार्थोज्ज्वल्यं दूरत्वं चापेक्षते । अत एव प्रतीयमान-चाक्षुषकोटिं नाक्षत्रदूरत्वञ्च विज्ञाय यथार्थभास्वरत्वकोटिरधिगम्यते । अत्र निम्नसूत्रं प्रयुज्यते—

$$\text{यथार्थचाक्षुषकोटिः} = \text{चाक्षुषकोटिः} + ५ + ५ \text{ लघुगणक } \left(\frac{१}{\text{दूरत्वम्}} \right) \text{ पारसेकमाने ।}$$

१, चा चाधुना वि-

स्याप्यते । प्रकाशः = चाक्षुषकोटिः + ५ + ५ लघुगणक (लम्बनं) पारसेकिण्डमाने
रिव । अत एव फोटो-विषयककोटिर्लभ्यते ।

कोटिः फोटो-चाना सूचो योऽस्माकं लोकं प्रकाशतां नयति पञ्चमकोटिकनक्षत्रमिवातिधूमिलं
कृच्छ्रेण दृष्टं सत्त्वं यास्यति, यतः

$$\left[\text{यथार्थचाक्षुषकोटिः} = -२६.७२ + ५ + ५ \text{ लघुगणक } \left(\frac{१}{२,०६,२६५} \right) \right]$$

पारसेक-प्रकाशवर्षादीनां मानमग्रे द्रष्टव्यम् ।

स्यस्य लम्बनं २,०६,२६५" मन्यतेऽत्र ।

एकादशोऽध्यायः

२१३

$$\begin{aligned}
 &= -२६०७२ + ५ + ५ \text{ लघुगणक (२,०६,२६५)} \\
 &= -२६०७२ + ५ + ५ \times ५.३१४ \\
 &= -२६०७२ + ५ + २६.५७ = ४.८५]
 \end{aligned}$$

११.२६ नक्षत्राणां सम्मिलितौज्ज्वल्यम्

समस्तनक्षत्राणां प्रकाशः १,४४०-संख्याकप्रथमकोटिकनक्षत्राणामौज्ज्वल्यसमः । अर्थात् ६.९ कोटिनक्षत्रभास्वरत्वसमः । यतः पूर्णचन्द्रस्य कोटिः—१२०९ मिता, अत एव समस्त-नक्षत्राणि पूर्णचन्द्रौज्ज्वल्यशतांशतुल्यं प्रकाशमस्मभ्यं ददति ।

११.२७ नक्षत्राणामौज्ज्वल्यम्

पूर्वानुच्छेदेनोपलक्ष्यते यदौज्ज्वल्यं यथार्थचाक्षुषकोट्यपेक्षि । यथा यथार्थकोटिविनिश्चये दशपारसेकदूरत्वं प्रमाणरूपेण स्वीकृतम्, तथैव तुलनासौकर्यायात्र सूर्यस्यौज्ज्वल्यं प्रमाणरूपेणाङ्गी-क्रियते । इष्टनक्षत्रौज्ज्वल्यनिर्धारणे निम्नसूत्रं प्रयुज्यते—

$$\frac{\text{इष्टनक्षत्रौज्ज्वल्यम्}}{\text{सूर्यौज्ज्वल्यम्}} = २.५१२ \quad (\text{सूर्यस्य यथार्थकोटिः—नक्षत्रयथार्थकोटिः})$$

यतः सूर्यौज्ज्वल्यमस्मिन् मानदण्डे त्वेकमितम्, सूर्यस्य यथार्थकोटिः ४.८५ मिता; अत एव

$$४.८५\text{-नक्षत्रयथार्थकोटिः}$$

$$\text{इष्टनक्षत्रौज्ज्वल्यम्} = २.५१२$$

$$\text{अथवा लघुगणक (इष्टनक्षत्रौज्ज्वल्यम्)} = ०.४ (४.८५ - \text{नक्षत्रयथार्थकोटिः})$$

उदाहरणम्—लुब्धकस्य औज्ज्वल्यं गणय ।

$$\text{लुब्धकस्य यथार्थचाक्षुषकोटिः} = +१.३ [\text{पूर्वमेव दत्ता}],$$

$$\text{अतो लघुगणक (लुब्धकौज्ज्वल्यम्)} = ०.४ (४.८५ - १.३०)$$

$$= ०.४ \times ३.५५$$

$$= १.४२$$

$$\text{लुब्धकौज्ज्वल्यम्} = १० \quad १.४२ = ३०$$

अर्थाद् लुब्धकं सूर्यपेक्षया ३० गुणकं भासुरम् ।

११.२८ उज्ज्वलतमानि नक्षत्राणि

उज्ज्वलतमं नक्षत्रं लुब्धकम् । अन्यानि प्रसिद्धानि भासुरतमानि नक्षत्राणि सारिण्याम्—

उज्ज्वलतमानां नक्षत्राणां सारिणी

नाम	प्रतीयमाना	वर्णच्छत्रीय-	लम्बनम्	दूरत्वं	यथार्थ-
	चाक्षुषकोटिः	वर्गः	प्रकाशवर्षेषु	चाक्षुषकोटिः	
ॐ प्रश्वन्	लुब्धक -१.५८	A _०	.३७८	८.६	+१.३
ॐ नौतल	अगस्त्य -०.८६	F _०	.०३३	१००.	-३.२
ॐ किन्नर	मित्र +०.०६	G _०	.७४८	४.४	+४.४
ॐ वीणा	अभिजित् ०.१४	A _०	.१२३	२६	+०.५
ॐ रथिन्	ब्रह्महृदय ०.२१	G _०	.०७७	४२	-०.४
ॐ भूतप	स्वाती ०.२४	K _०	.०९८	३३	+०.२
ॐ मृग	'रीगेल्' ०.३४	B _८	.००६	५४०	-५.८
ॐ श्वन्	'प्रोक्ष्योन' ०.४८	F _३	.२९४	११.१	+२.९
ॐ वैतरणी	'आचेरनार' ०.६०	B _५	.०४५	७०	-१.१
ॐ किन्नर	०.८६	B _१	.०१७	१९०	-२.९
ॐ गरुड	श्रवण ०.८९	A _५	.२०८	१५.७	+२.५
ॐ मृग	आर्द्रा ०.९२	M _२	.०११	३००	-३.९
ॐ स्वस्तिक	१.०५	B _१	.०१५	२२०	-२.७
ॐ वृष	रोहिणी १.०६	K _५	.०६२	५३	+०.१
ॐ मिथुन	पुनर्वसु १.२१	K _०	.११४	२९	+१.५
ॐ कन्या	चित्रा १.२१	B _२	.०२७	१२०	-१.६
ॐ वृश्चिक	ज्येष्ठा १.२२	M _१	.०१३	२५०	-३.२
ॐ दक्षिणमीन	'फोमाह्वार' १.२६	A _३	.१३९	२३	+२.०
ॐ हंस	'डेने व' १.३३	A _२	.००८	४००	-४.२
ॐ सिंह	मघा १.३४	B _८	.०४९	६७	-०.३

११.३ नक्षत्राणां दूरत्वम्

नक्षत्राणि सूर्यसमानि (कानिचन च सूर्यात् परिमाणविषये महीयांसि), परन्तु सर्वैर्जनैस्तापि चाक्षुषा विचारप्रकाशविन्दव इव। किमत्र कारणम्? अत्र तेषां सुदूरवर्तित्वमेव हेतुः। स्यादप्येते। प्रकाशस्य सुदूरं प्रकाशते, तस्यातिदूरत्वञ्च सूर्याध्याये नैकदृष्टान्तैः प्रदर्शितम्, परन्तु सूर्यस्य अत एव सूर्यस्य भुवो दूरत्वमल्पतरम्। सूर्यस्य किरणाः ८ $\frac{1}{2}$ मिनटकालेन स्पृशन्ति ५ डिग्रिः कोटोच्चसमीपतमस्यापि नक्षत्रस्य (मित्रनामकस्य) रश्मयः ४ $\frac{1}{2}$ वर्षकालेन प्राप्नुवन्ति भूतलं दर्शयन्ति चेत् अर्थात् तस्य दूरत्वम् २,५५,००,००,००,००,००० कोशार्धमितम्।

११.३ [सूर्यदृक्पथविधिः]

प्रहाणां वा दूरत्वं लम्बनेन निश्चीयत इति पूर्वाध्यायेषु स्पष्टीकृतम्, परन्तु सूर्यात् दूरत्वम् प्रतीयमानां नक्षत्राणां सारिणी। सूर्याचन्द्रमसौ नक्षत्रापेक्षया सुसमीपतरौ, तयोर्दूरत्वञ्च 'दूरत्वम् =

एकादशोऽध्यायः


२२१

भूव्यासः

लम्बनज्या

इति सूत्रेण सुलभम्, परन्तु नक्षत्राणां लम्बनमेतावदल्पं विद्यते यदतिसूक्ष्ममापकयन्त्रैरपि तस्य वेधेन मानप्राप्तिरसम्भवा । यद्येका रूप्यकमुद्रा १०००-क्रोशार्धदूरवर्तिनी स्यात्, पृथिवी च सर्वथा समतला स्याद् मुद्रोच्छ्रयेण रचितः कोणो 'अ' स्यात्तर्हि समीपतमनक्षत्रस्य लम्बनमानं 'अ' मितभागं भवेत् । सूक्ष्मयन्त्राणि 'अ' कोणमपि मापयितुं न समर्थानि, का कथा $\frac{\text{'अ'}}{१००}$ कोणस्य अत एवापरा लम्बनपद्धतिरुरीक्रियते ज्योतिर्गणकैः, सा चाधो दीयते ।

लम्बनसिद्धान्ते विज्ञापितमेव पूर्वं यद् यथा यथा चाधाररेखा (यथा चन्द्रदूरत्वनिर्धारणे भूव्यासः) दैर्घ्यं भजते, तथा तथा लम्बननिर्धारणे यथार्थत्वमागच्छति । यतो भूव्यासो नक्षत्रदूरत्व-निर्णयविषयेऽत्यल्पः, ज्योतिर्गणकैः काचिद् बृहत्याधाररेखान्विष्टा, सा च सूर्यस्य प्रदक्षिणायां भूकक्षा-व्यासः । भूः सूर्यं परितो भ्रमति, यदि सा कक्षावृत्तस्याद्यास्मिन् भागे तिष्ठति, षण्मासानन्तरं सा कक्षावृत्तस्य द्वितीयकोटौ (पूर्वस्थानात् षड्भान्तरे) स्थास्यति; प्रथमद्वितीयस्थित्योरन्तरं भूकक्षा-



व्यासः । स च १८,५८,००,००० क्रोशार्धमितः । उपरि चित्रे मार्चमासे भूः क-र-चन्द्रमासे, च ख-स्थाने वर्तते । स्वाभाविकीयं कल्पना यन्नक्षत्राण्यन्योन्यमभिन्नस्थानं भजन्ते । एवं


२२२

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

नक्षत्राणि समीपतराणि तानि दूरवर्तिनक्षत्रापेक्षया किञ्चित् स्थानभ्रंशं लभन्ते । क इ ख-कोणः स्थानभ्रंशमानम्^१ ।

कोणोऽयमत्यल्पपरिमाणकः, अत एव भूमध्यगणितीयदूरत्वे सूर्यमध्यगणितीयदूरत्वे न कोऽपि विशेषो भेदः । अत एव गणना सदैव सूर्यमध्यगणनया क्रियते, अर्थाद् लम्बनं सूर्यमध्याद् गण्यते । सूर्यमध्याद् लम्बनं चित्रे क इ ख-कोणेन प्रदर्शितम् । लम्बनकोणमानं वेधेन निश्चीयते । लम्बनं ज्ञात्वा दूरत्वं ज्ञायते । अत्र निम्नसूत्रम्^२—

१. कोणोऽयमत्यल्पत्वात् समीपस्थनक्षत्रस्यैव मापनीयः । दूरवर्तिनक्षत्रेभ्य ईदृशी १८,५८,००,००० क्रोशार्धवितता आधाररेखापि दूरत्वापेक्षयाऽत्यल्पा ।
२. कोणानां वृत्तीयमाने प्रमापकं रेडियनमस्ति । रेडियनं केन्द्रवर्ती स कोणो यः त्रिज्यातुल्यचापेन रच्यते । रेडियने २०६२६५ विकलाः सन्ति । चित्रमत्रत्यं



चा चाधुना वि-
स्थाप्यते । प्रकाश-
रिव । अत एव
रेडिः कोटो-च-

दृष्टं ज्ञानं चित्रेण लम्बनदूरत्वसम्बन्धः स्पष्टीक्रियते ।

$$\text{लम्बनकोणः} = \frac{\text{रेडियनम्}}{\text{तत्समुखवर्तिचापः}} = \frac{\text{भूराश्रयान्तरः} \times \text{रेडियनम्}}{\text{दूरत्वम्}}$$

एकादशोऽध्यायः

२२६

$$\text{दूरत्वम्} = \frac{\text{भूकक्षाव्यासार्धः} \times \text{'रेडियन्ते' सेकिण्डानां संख्या}}{\text{लम्बनकोणमानं सेकिण्डेषु}}$$

$$\text{अर्थात्} = \frac{९,२९,००,००० \times २०६२६५}{\text{लम्बनं (सेकिण्डमाने)}} \text{ कोशार्धानि}$$

उदाहरणम्— $\propto$ किन्नरस्य (मित्रस्य) लम्बनं ७५६" मितम्, दूरत्वं गणय—

$$\text{मित्रस्य दूरत्वम्} = \frac{९,२९,००,००० \times २०६२६५}{७५६}$$

$$= २,५३,४६,००,००,००,०००$$

कोशार्धानि ।

११-३२ नक्षत्रलम्बननिर्धारणरीतयः

नक्षत्राण्यतिदूरवर्तीनीति निश्चिता मतिः पुराणानां ज्योतिर्विदाम्, परन्तु तेषां यथार्थदूरत्व-
निश्चयो न सम्भव आसीत् । दूरदर्शकयन्त्राविष्कारानन्तरमपि बहुकालपर्यन्तं नाक्षत्रदूरत्वनिर्धारणं
दुष्करमेवासीत् । ख्रिस्तीयोनिर्विशतितमशतकस्य प्रथमचरणे ज्योतिर्विद्भिः कतिपया दूरत्वनिर्धारणे
सिद्धान्ता निर्धारिताः । भास्वरत्वस्य चाक्षुषकोट्यधीनं दूरत्वमिति प्रथमः सिद्धान्तः (यथा यथा
नाक्षत्रदूरत्वमधिकं तथा तथा भास्वरत्वं धूमिलम्, अर्थाद् धूमिलनक्षत्रं भासुरनक्षत्रापेक्षया
दूरवर्ति) । समीपवर्तिनक्षत्राणां प्रकृता गतिर्महती, दूरवर्तिनां चाल्पेति द्वितीयः सिद्धान्तः । यदि
नक्षत्रं द्विकनक्षत्रमस्ति, तर्हि सहचारिनक्षत्रस्यान्योन्यदूरत्वाधिक्यं तस्य परिक्रमणकालस्यात्यतां
चापेक्षते द्विकनक्षत्रस्य दूरत्वम् ।

उपर्युक्तसिद्धान्तानां प्रतिपादनार्थं बृहती नक्षत्राणां सूची निर्मिता । प्रथमतः प्रथमकोटिक-
नक्षत्राणां द्वितीयकोटिकनक्षत्राणाञ्च सूची परिष्कृता । द्वितीयतो लुब्धक-प्रश्वाभिजिन्मित्राणां सूची
रचिता । एषां नक्षत्राणां प्रकृता गतिः पर्याप्ता महती । तृतीयतो मित्र-६१ हंसादिकनक्षत्राणा-
मध्ययनं कृतम् ।



सर्वप्रथमं लम्बननिर्धारणार्थं त्रिभिर्ज्योतिर्विद्भिः समकाल एव पण्यलाः कृताः । तेषां
प्रयुक्तानि दूरदर्शकयन्त्राणि विभिन्नानि, तेषामुररीकृतनक्षत्राणि विभि- तेषां निष्कर्षाः
पर्याप्तं यथार्था आसन् । 'वेसेल' महोदयेन ६१-हंसनामकस्य द्विकस्य सूर्यमापक-
यन्त्रेण नाक्षत्रलम्बनं ख्रिस्तीये १८३८-तमे अब्दे ०", ३१-मितं मि महोदयेन
महाप्रकृतिगतिकस्याभिजितो नाक्षत्रलम्बनमेकेनातिधूमिलनक्षत्रेण त मापकयुक्त-
विषुव-दूरदर्शकयन्त्रेण ख्रिस्तीये १८४०-तमाब्दे ०", २५-मितं निर्धारितम् न महोदयेन
ख्रिस्तीये १८३९-तमाब्दे मित्रस्योन्नतांशान् वर्षस्य विभिन्नर्तुषु विद्म लम्बनस्य मानं
१."०० मितं लब्धम् ।

अद्यत्वे तु नाक्षत्रलम्बनं फोटोचित्रैर्निर्धार्यते । फोटोविषयकपद्धत्या मि लम्बनं, यथार्थत्वं च सूक्ष्मतयायाति । धूमिलनक्षत्राणां भूमिकायामिष्टनक्षत्रस्य फोटोचित्रं गच्छति । पुनस्तस्यैव नक्षत्रस्य षण्मासानन्तरं (द्रष्टव्यमग्रे फोटोचित्रम्) वर्षानन्तरञ्च मि एवं

२२४

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

पञ्चषाणां फोटोचित्राणां सूक्ष्ममापकयन्त्रैरध्ययनं विश्लेषणञ्च क्रियेते । प्रथमद्वितीयफोटोचित्रयोर्यदन्तरं तस्य द्वौ हेतू-नाक्षत्रलम्बनविषयकः स्थानभ्रंशः, नाक्षत्रप्रकृता गतिः । प्रथमतृतीयफोटोचित्रयोर्यदन्तरं तस्यैको हेतुः-नाक्षत्रप्रकृतगतिः (वर्षान्ते भूः पूर्वस्थानमागच्छति, भूपरिभ्रमणकृतलम्बनविषयकान्तरं शून्यमितं भवति) । एवं नाक्षत्रप्रकृतिगतिजनितान्तरं विचार्य लम्बनविषयकान्तरं (अर्थान्नाक्षत्रलम्बनं) निर्णयते ।



आकाशघातान्तिशेषस्थितिः
अथानक्षत्रम्

उत्थेत प्रोक्तस्य चित्रम्
वर्षासान्तरे

नाक्षत्रलम्बनमिदानीदृश्यम्

परन्तु पद्धतिरियं न नितान्तं सफला । सूक्ष्ममापकयन्त्रेण ०".०१ मितं लम्बनं यथार्थतया ग्राह्यम्, तदधिकं त्वशुद्धं फलं ददाति । फोटोचित्रेण ०".००१ मितलम्बनस्य निर्धारणं सर्वथा सम्भवम् । परन्तु सन्ति बहूनि नक्षत्राणि यानि सुदूरवर्तीनि, तेषां लम्बनं चातिसूक्ष्मम् । तेषां दूरत्वनिर्धारणे परोक्षविधयः प्रयुज्यन्ते । एषां विधीनां विवरणं यथास्थानं दास्यते, अत्र तु ते संक्षेपेण दीयन्ते-

(१) चाधुना विज्ञातं लम्बनं प्रकाशयार्थचाक्षुषकोटि-सम्बन्धाद् दूरत्वं लम्बनं वा ज्ञायते निम्नसूत्रेण
रश्मिविस्तारः $\frac{1}{2}$ (यथार्थकोटिः—प्रतीयमानकोटिः—५) अत्र यथार्थकोटिश्च
कोटिः फोटोचित्रे (द्रष्टव्यः § ११.२३१) ।

(२) वर्षासान्तरे संचारिनक्षत्राणामुपस्थितेरपि दूरत्वं निश्चीयते । वर्षापूर्वविकारिनक्षत्राणामावृत्तिकालम्बनम् (द्रष्टव्यः § १२.५३२) ।

(३) सूर्यस्य दूरत्वं तेषां गत्यादिकेन निर्धार्यते (द्रष्टव्यः § १३.१२२) ।
नक्षत्राणां दूरत्वं संचारिनक्षत्रस्यान्योन्यदूरत्वं परिक्रमणकालं चापेक्षते
(द्रष्टव्यः § १४.१२२) ।


सूर्यं शास्त्रेणाप्यालेख्यचित्रादिसाहाय्येन दूरत्वनिर्णयः सम्भवः ।

एकादशोऽध्यायः

२२५

११.३३ वार्षिकलम्बनस्य प्रभावः

(१) यदि नक्षत्राणि कदम्बक्षेत्रे स्थितानि, तानि वृत्ताकार आकाशे दोलन्ते । (२) यदि क्रान्तिवृत्तसमतले सन्ति तर्हि तानि क्रान्तिवृत्ते रेखायां दोलनं कुर्वन्ति दृश्यन्ते । (३) यद्यन्यत्र



वार्षिकलम्बनस्य प्रभावः

सन्ति तर्हि दीर्घवृत्ताकारे भ्रमन्ति दृश्यन्ते । उपरि दत्तचित्रेण स्पष्टं क्रियते नक्षत्राणां वार्षिकलम्बनकृतं दोलनम् ।

११.३४ दूरत्वप्रमापकाणि

यदि कोऽपि नरः पुस्तकस्यायामं पृच्छेत्तर्हि पुस्तकं नव-इञ्चापरन्तु यदि कोऽपि वाराणसीतः प्रयागस्य दूरत्वं पृच्छेत्तर्हि 'इयन्मात्रक' प्राप्नुयात् । कथमत्र प्रमापकेषु परिवर्तनम् ? वाराणसीतः प्रयागस्य दूरत्वमेवैकं बृहत्तरप्रमापकं प्रयुज्यते । एवमेव ज्योतिर्विद्यायां सूर्यस्य दूरत्वन्तु क्रो-परन्तु नाक्षत्रदूरत्वप्रकटनार्थमेकमन्यत् प्रमापकमन्विष्यते यत् क्रोशार्धपेक्ष-ज्योतिर्विद्भिः स्वीक्रियन्ते कतिपयानि प्रमापकाणि यथा पारसेकः, प्रकाश-मित्यादीनि ।

पारसेकः—यदि किञ्चिन्नक्षत्रमेतावद्दूरत्वे स्थितं यत्तस्य वार्षिकलम्बनं (विकलैकमितम्) तर्हि तस्य दूरत्वमेकं पारसेकमुच्यते ।

२२६

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

यतो नाक्षत्रदूरत्ववृद्धौ लम्बनमानहानिः, अतो दूरत्वं लम्बनव्युत्क्रमानुपाति । अथाद्
 यदि लम्बनम् १".०० तर्हि दूरत्वम् एकं पारसेकम्,
 " " ०".१ " " दशपारसेकानि,
 " " ०".०१ " " पारसेकशतम् ।
 पारसेकञ्च २०६२६५ + ९,२. ९,००,००० क्रोशार्धमितम् ।

प्रकाशवर्षः

पारसेकप्रमाणं ज्योतिर्गणकेष्वेव प्रसिद्धम्, जनसाधारणे तु प्रकाशवर्षोऽधिकं प्रचलितः ।
 प्रकाशकिरणानां (विद्युत्किरणानां वा) सर्वेषु भौतिकवस्तुषु सर्वाधिको जवः । ते सेकिण्डैककाले
 १८६३२४ क्रोशार्धानि चलन्ति । अत एव ते बृहत्प्रमाणकार्यं पर्याप्तमुपयुक्ताः । प्रकाशकिरणा
 एकस्मिन् वर्षे १८६३२४ × ६० × ६० × २४ × ३६५ क्रोशार्धानि (आसन्नमाने ५८,५०,-
 ००,००,००,००० क्रोशार्धानि) गच्छन्ति । सूर्यकिरणाः प्रायः ८ $\frac{१}{३}$ मिनटकालेन भूतलं स्पृशन्ति ।

ज्योतिःप्रमाणकम्


ज्योतिर्गणकेष्वेकमन्यत्रप्रमाणकमपि प्रचलितम् । नक्षत्राणां लम्बनविधौ दृष्टं यत् सूर्य-भुवो-
 रन्तरं (भूक्षान्वासार्धः) पर्याप्ताधाररेखा । आधाररेखेयं प्रायेण सर्वदा प्रयुज्यते नाक्षत्रलम्बना-
 नयनप्रक्रियायाम्, अत एवाधाररेखाया दीर्घत्वमप्युचितं प्रमाणकं भवितुं योग्यम् । सूर्यभुवोरन्तरं
 ९,२९,००,००० क्रोशार्धमितम् ।

प्रमाणकाणां परस्परसम्बन्धः

एकं पारसेकम्	= ३.२६ प्रकाशवर्षाणि
	= २०६२६५ ज्योतिःप्रमाणकाणि
	= १,९२,००,००,००,००,००० क्रोशार्धानि
एकः प्रकाशवर्षः	= ३०७ पारसेकभागः
	= ६३२७१ ज्योतिःप्रमाणकभागः
	= ५,८,८०,००,००,००,००० क्रोशार्धानि ।
	= ३०६२६५ पारसेकम्
	= ००००१५८ प्रकाशवर्षभागः
	= ९,२९,००,००० क्रोशार्धानि ।
१	= १ पारसेकानि
लम्बनम्	
३.२६	= प्रकाशवर्षाः
लम्बनम्	
२०६२६५	= ज्योतिःप्रमाणकाणि
लम्बनम्	

११.४ नक्षत्राणां गतिः

नक्षत्राणि प्रत्यहं रात्रौ पूर्वतः पश्चिमदिशं गच्छन्ति दृश्यन्ते । सायंकाले यानि पूर्वक्षितिजे भ्रान्तिं ताव्येव प्रभाते पश्चिमक्षितिजेऽस्तं यान्ति । इयं तेषां प्रथमा गतिः, परन्तु गतिरियं केवलं प्रतीयमाना, भुवोऽक्षभ्रमणमेवात्र हेतुः । पुनश्च नक्षत्राणि सर्वाणि वर्षपर्यन्तं नावलोक्यन्ते, क्वचित्तेषां दर्शनं क्वचित्तेषामदर्शनम् । यद्यद्य रात्रौ दशमहोरायां याम्योत्तरवृत्तलग्नं किमपि



‘प्रौक्सिमा’-किन्नरनक्षत्रस्य प्रकृता गतिः

[हार्वर्ड-वेधशाला]

नक्षत्रम्, एकेन मासेन तद् अष्टमहोरायां याम्योत्तरोलङ्घनं करिष्यति, यद्यपि सर्वदा तेषां नक्षत्राणामन्योन्यदूरत्वसम्बन्धः सम एव । अर्थात् सर्वाणि नक्षत्राणि युगपत् पश्चिमदिशं गच्छन्ति । गतिरियमपि प्रतीयमानैव, अत्र भुवः सूर्यमभितः परिक्रमणमेव हेतुः । परन्त्वमे विहायास्त्येका तृतीया गतिर्या वास्तविकी । इयं तेषां प्रकृता गतिरुच्यते । नक्षत्राणां परस्परदूरत्वं शनैः शनैर्भिन्नतां याति, इयं भिन्नता त्वेतावत्यत्यल्पा यद् वेधेन तस्या मानलाभोऽतिदुष्करः, परन्तु बहुकालपृथक्कृतावसरेषु वेधेन प्रत्यक्षं स्थानच्युतिः स्फुटतया दृश्यते (अवलोकनीयमत्रोपरि दत्तं फोटोजित्रम्) । वस्तुतो नक्षत्राणि प्रायेण तीव्रगतिमन्ति, परन्तु सुदूरवर्तित्वात् तीव्रगतिजनितस्य प्रतीयते । अनेनैव कारणेन नक्षत्राण्यचलानि मन्यन्ते ।

११.४१ प्रकृता गतिः, केन्द्रीय गतिश्च


चित्रे किमपि नक्षत्रं क-स्थाने स्थितम्, वर्षान्ते तदेव निजखगत्या भविष्यति । तस्य वार्षिकखगतिः कख-मिता । अत्र खगतिर्द्विरूपेण विश्लेषणमर्हति, प्रथमं नक्षत्रं किमपि चलति, द्वितीयं दक्षसूत्रदिशायाम् । दक्षसूत्रदिशायां गतिर्वेधेन यत्नः यद् वस्तु दक्षसूत्र एव दूरमपसरति, उपसरति वा, तद् एकस्थाने तिष्ठति । यदि नक्षत्रं दक्षसूत्रलम्बनदिशायां चलति तर्हि तस्य स्थानभ्रंशप्रतीतिः ।

२२८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

भ्रंशात् कल्पितः कोणो वेधेन लभ्यः । अत्र प्रथमविश्लेषणे दृक्सूत्रलम्बदिशायां गतित्वात्

कोणीयगतित्वात्, द्वितीयविश्लेषणे दृक्सूत्रदिशागमने केन्द्रापसारित्वात् केन्द्रोपसारित्वाद् वा केन्द्रीय गतिः कथ्यते । कोणीय गतिः प्रकृता गतिरपि प्रोच्यते ।



११'४११ प्रकृता गतिः

अद्यत्वे तु प्रायेण सर्वेषां चाक्षुषनक्षत्राणां कतिपयानां दूरदर्शकीयनक्षत्राणामपि प्रकृता गतिः सूक्ष्मतया गणिता विद्यते । काले काले नक्षत्राणां स्थितिनिर्देशकानि मानचित्राणि वेधशालासु रच्यन्ते, तेषां तुलनात्मकाध्ययनाच्च प्रकृता गतिर्निश्चीयते ।

निर्धारणपद्धतिः

दृष्टनक्षत्रस्य विषुवांशाः क्रान्त्यंशाश्च सुदीर्घकालव्यवधानकेऽवसरद्वये सूक्ष्मतया विध्यन्ते ।

अयनजनितान्तरादीन् विचार्य लब्धान्तरेण नक्षत्रस्य प्रकृता गतिर्लभ्यते । तुलनेयं सरलं यद् एकस्मिन्नेव काले प्रायणादिजनितान्तराणि सर्वेषां नक्षत्राणां सममितान्येव ।

अत्र चाधुना वि. फोटोचित्रद्वयतुलना सूक्ष्मतया नेत्राभ्यां निरीक्षणेन सूक्ष्मदर्शकयन्त्रेण च सम्भवति स्थाप्यते । प्रकाशने नासीत् सूक्ष्मयथार्थत्वम् । अधुना निमेष-('ब्लिग') सूक्ष्मदर्शकयन्त्रेण वि. ए. ए. नेत्रसूक्ष्मदर्शकयन्त्रस्याधः फोटोद्वयं स्थाप्यते, यन्त्रविशेषसाहाय्येन क्षणं नेत्रयोरेकैः फोटोचित्रं, क्षणं द्वितीयचित्रम्, पुनः प्रथमं चित्रम्, ततो द्वितीयं चित्रम् । एवं पौनःपुनरुत्पन्नचित्रपरिवर्तनेन किञ्चिन्मात्रमपि परिवर्तनं चित्रद्वये निमेषदिव इश्यते, स्फुटतया च दृष्टिगोचरं भवति ।

गोघ्नप्रकृतं नक्षत्राणि

सितगतिकानां नक्षत्राणामग्रणि वर्तते एकं दूरदर्शकीयं 'बार्नाड' नक्षत्रनाम्ना प्रसिद्धं यत्तस्मात् समीपवर्तिनक्षत्रापेक्षया प्रतिवर्षं १०.२५ विकलमितं स्थानभ्रंशं लभते । त्रैषैश्चन्द्रव्यासमितं परिवर्तनं दृश्यते ।

एकादशोऽध्यायः

२२६

केवलं द्विशतसंख्याकानां भानां प्रकृता गतिः प्रतिवर्षं विकलैकमिताधिका । सर्वेषां चाक्षुष-
भानां सामान्यप्रकृतगतिः प्रतिवर्षं ०.१ विकलांशमितैव ।

अधो दीयते कतिपयानां प्रसिद्धानां शीघ्रप्रकृतगतिकानां नक्षत्राणां सारिणी ।

प्रमुखशीघ्रगतिकनक्षत्राणां

सारिणी

नाम	नाक्षत्रकोटिः	वर्णच्छत्रीयवर्गः	प्रकृता गतिः
म्यूनिक १५०४०	९.७	M _५	१०''.३
कोर्डोवा Vh-२४३	९.२	M _०	८.८
ग्रूमब्रिज १८३०	६.५	G _५	७.०
लेकिए ९.३५२	७.४	M _०	६.९
कोर्डोवा ३२४१६	८.३	M _३	६.१
६१-हंस	५.४	K _८	५.२
बुल्फ ३५९	१३.०	M _६	४.८
ललन्डे २११८५	७.६	M _२	४.८
६-सिन्धु	४.७	K _५	४.७
ललन्डे २१२५८	८.६	M _२	४.५
O _२ वैतरणी	४.५	G _५	४.१
बुल्फ ४८९	१३.०	—	३.९
प्रोक्सिमा-किन्नर	१०.५	M _१	३.८
Mशर्मिष्ठा	५.३	G _५	३.८
α किन्नर (मित्र)	{ ०.३ १.७	{ G _० K _५	३.७
वाशिगटन ५५८३	९.१	G _५	३.७
५५८४	८.९	G _०	३.७
कोर्डोवा २९१९१	६.७	M _६	३.५
६ वैतरणी	४.३	G _५	३.२

११.७१२ केन्द्रीया गतिः

नक्षत्राणां सूर्यकेन्द्रोपसारित्वं केन्द्रोपसारित्वमपि विद्यते । अचि-
सम्भवासीद्, यतो दृक्सूत्रे गच्छन्ति नक्षत्राणि न विदधति किमपि चाक्षु-
तु रश्मिविश्लेषकयन्त्रेण रश्मिविश्लेषणीयसिद्धान्तानामसाधारणप्रगत्या चे-
तैर्गणनाऽ-
म् । अधुना
क्या ।

निर्धारणपद्धतिः


नक्षत्रस्यापसरणेनोपसरणेन वा वर्णच्छत्रे विभिन्नानि परिवर्तनानि दृ-
नक्षत्रं दृक्सूत्रेऽस्माकं समीपमागच्छति (अर्थाद् उपसरति) तथा तथा व-
नील-

२३०


अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

लोहितोत्तरं प्रति विचलन्ति; यथा यथा च नक्षत्रं दृक्सूत्रेऽस्मद्दूरीभवति (अर्थाद् अपसरति)
तथा तथा रेखा उपरक्तं प्रति विचलन्ति । सिद्धान्तोऽयं 'डाप्लर'सिद्धान्तनाम्ना प्रसिद्धः ।

एकस्मिन्नेव फोटोफलक इष्टनक्षत्रस्य वर्णच्छत्रं प्रयोगशालीयधातुविशेषस्य वर्णच्छत्रञ्च



गृह्यते (प्रयोगशालीयधातुः प्रायेण 'सोडियम'धातुर्भवति) । पुनः कतिपयमासानन्तरं तस्यैव
नक्षत्रस्य वर्णच्छत्रं तेनैव प्रयोगशालीयधातुविशेषवर्णच्छत्रेण सह गृह्यते । सूक्ष्ममापकयन्त्रेण



चाधुना वि- K, वर्गीयनक्षत्रस्य वर्णच्छत्रम्
स्थाप्यते । प्रकाश-
तुलनां वि- अत एव, गण्यते । अस्मिन् फोटोचित्रे रेखा नीललोहितोत्तरं प्रति विचलन्त्यो
दृश्यन्ते, अतोऽस्मिन् फोटो- भागच्छदस्ति ।

केन्द्रीयगतिः

केन्द्र- निम्नलिखितेन सूत्रेण ज्ञायते—

$$\text{गतिः} = \frac{\text{तरङ्गदैर्घ्यविचलनम्}}{\text{तरङ्गदैर्घ्यम्}} + \text{प्रकाशवेगः}$$

एकादशोऽध्यायः

२३१

अर्थाद् यदि कस्या अपि रेखायाः ४००० 'ऐंस्ट्राम'मिततरङ्गदैर्घ्यम्, रेखा च नीललोहितोत्तरं प्रति ऐंस्ट्रामैकमितं विचलति, तर्हि केन्द्रीया गतिः




$$= \frac{1}{4000} \times 166300 = 41.6 \text{ क्रोशार्धानि प्रतिसेकिण्डम्।}$$

साधारणतया प्रतिसेकिण्डं केन्द्रीया गतिः २० क्रोशार्धात्पा, ६० क्रोशार्धाधिका गतिस्तु विरलानां नक्षत्राणाम्।

वार्षिकपरिवर्तनम्

भूः सूर्यं परितः परिक्रामति, अत एव षण्मासपर्यन्तं सा नक्षत्रस्य समीपं गच्छति, पुनः षण्मासपर्यन्तं नक्षत्राद् दूरीभवति। अत एव नक्षत्रस्य वर्णच्छत्रे रेखा दोलायन्ते। इदं दोलनं क्रान्तिवृत्तीयनक्षत्राणां वर्णच्छत्रे सर्वाधिकम्, कदम्बक्षेत्रीयनक्षत्राणां शून्यमितम्, अन्यत्र स्थानानुसारं न्यूनाधिकम्।

२



वार्षिक परिवर्तनम्

वर्णच्छत्रे वार्षिकदोलनं भुवः सूर्यप्रदक्षिणाया महत्त्वपूर्णं प्रमाणम्। जोन्स'महोदयेन वर्णच्छत्रेषु 'डाप्लर'सिद्धान्तप्रयोगेण भुवः प्रदक्षिणा गतिः १८३१ मतेन च भूसूर्ययोरन्तरं ९,२८,७०,००० क्रोशार्धमितं निर्धारितम्। अनेन

११.४२ खगतिः

नक्षत्राणां खगतिस्तेषां वास्तविकी गतिः। तस्या एव विश्लेषणं प्रकृता गतिः, केन्द्रीया गतिः, इति भेदौ द्वौ कृतौ। अत्र प्रकृतगत्या द्वितीयं रूपं प्रकृता गतिः स्थानभ्रंशजनितकोणेन मापितासीत्, लम्बगतिश्च केवलं स्थानभ्रंशमानेन।

$$१. \text{ लम्बगतिः } = \frac{३ \times \text{प्रकृता गतिः}}{\text{नाक्षत्रलम्बनम्}}$$

२३२

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

एवं

$$\text{खगतिः} = \sqrt{(\text{केन्द्रीयगतिः})^2 + (\text{लम्बगतिः})^2}$$


प्रायेण प्रतिसेकिण्डं खगतिः पञ्चक्रोशार्धेभ्योऽधिका, विंशतिक्रोशार्धेभ्यश्चात्पा ।
उज्ज्वलतमानां नक्षत्राणां मध्ये सर्वाधिका खगतिः स्वातीनक्षत्रस्य ८४ क्रोशार्धानि प्रतिसेकिण्डमस्ति ।

१२.४३ सूर्यस्य खगतिः

सूर्योऽप्येकं नक्षत्रम्, अत एव तस्यापि खगतिर्विद्यते, यद्यपि ग्रहाणां दृष्टिकोणेन सोऽ-
चल एव दृश्यते । सूर्यस्य खगतेर्गणना परममहत्त्वपूर्णा ज्योतिर्विद्यायाम्, यतोऽन्येषां नक्षत्राणां
खगतिः सूर्यपेक्षयैव गण्यते, सूर्यखगतिगणनाऽभावे तेषां वास्तविकगतिगणनाऽशक्या ।

सौरगत्युद्भवा नक्षत्राणां प्रतीयमाना गतिः

रेलयानारूढजनेन प्रायोऽनुभूयते यत् सम्मुखदिशायासुभयपार्श्वस्था वृक्षा यथा यथा
रेलयानं तत्समीपतरं भवति तथा तथा बृहत्कोणं रचयन्ति, पृष्ठपार्श्वस्थवृक्षा यथा यथा रेलयानं
तेभ्यो दूरं याति तथा तथा न्यूनकोणं रचयन्ति (दृष्टव्यमत्रत्यं चित्रम्) । चित्रे पू-स्थानं पूर्वावस्थां
पच परस्थानं द्योतयतः । उपसरता रेलयानेन $\angle वृ_1$, पू वृ_२, $\angle वृ_1$ प वृ_२ कोणौ रचितौ; $\angle वृ_1$
प वृ_२-कोणः $\angle वृ_1$ पू वृ_२-कोणापेक्षया महीयान् । अपसरता रेलयानेन रचितयोः कोणयोः $\angle$
वृ_३ प वृ_४-कोणः $\angle वृ_2$ पू वृ_४-कोणापेक्षया लघीयान् । अत एव पार्श्वस्थवृक्षा विभिन्नकोणान्
जनयन्तो रेलयानगतिं प्रमाणीकुर्वन्ति ।





सूर्यस्य सम्मुखे नक्षत्राणि यानि सूर्ये न्यूनकोणानि सूर्ये दूरं गच्छन्ति । यथा यथा सूर्यस्तेषां भानां समीपं गच्छति तथा तथा
सूर्ये दूरं गच्छति तथा तथा पृष्ठस्थानि नक्षत्राणि सूर्ये दूरं गच्छन्ति । यथा यथा सूर्यस्तेभ्यो दूरं गच्छति तथा तथा पृष्ठस्थानि

एकादशोऽध्यायः


२३३

अनेन विधिना त्विदं ज्ञायते यत् सूर्यो बृहदाकाश एकं बिन्दुविशेषं प्रति गच्छन्नस्ति, तं बिन्दुं प्रति सर्वेषां नक्षत्राणामुपसर्पणस्य परमवेगः । तद्बिन्दुविपरीतदिशायामेको द्वितीयः काल्पनिको



सूर्यगतेः नक्षत्राणामुन्मीलनं निमीलनम् च

बिन्दुः, यतः सर्वेषां नक्षत्राणामुपसर्पणस्य परमवेगः । प्रथमो बिन्दुरुपसर्प्यबिन्दुरुच्यते, द्वितीयोऽ-



भुवः अन्ताकाशे गतिः

हो

पसर्प्यबिन्दुः कथ्यते । उपसर्प्यबिन्दोर्विषुवांशः १८ ००' मिताः, ३०' मिताः । स

२३४

अर्वाचीन ज्योतिर्विज्ञानम्

शौरीनक्षत्रपुञ्जेऽभिजितो दक्षिणपश्चिमदिशायां दशांशमितकोणीयान्तरे स्थितः । सूर्यस्य गतिश्च १२०२ क्रोशार्धानि प्रतिसेकिण्डम् ।

सूर्यगतेर्निर्धारणम्, उपसर्प्यबिन्दोरपसर्प्यबिन्दोश्च निर्णयो 'डायलर'सिद्धान्तसाहाय्येन भवति । अभिजिप्तसमीपवर्तिनक्षत्राणि प्रायेण १२ क्रोशार्धानि प्रतिसेकिण्डं भूपृष्ठदर्शकं प्रत्युपगच्छन्तीव दृश्यन्ते, अपसर्प्यबिन्दुसमीपवर्तिनक्षत्राणि प्रायः १२ क्रोशार्धगत्या प्रतिसेकिण्डमपसरन्तीव दृश्यन्ते, बिन्दुद्वयलम्बवर्तिनक्षत्राणि च स्थिराणीव दृश्यन्ते । अत एव स्वाभाविकी विज्ञानसङ्गता चेयं कल्पना यत् सूर्य एव स्वपरिवारेण सहोपसर्प्यबिन्दुं प्रति गच्छन्नस्ति ।

भूः सूर्यं परितो भ्रमति, सूर्यश्चोपसर्प्यबिन्दुं प्रति गच्छन्नस्ति, अत एव महाकाशे भुवो वास्तविकगतिः २३३ पृष्ठस्यद्वितीयचित्रानुसारिणी भवति ।

११.५ परिमाणम्

ग्रहाणां परिमाणगणना नातिदुष्करी, यतस्तेषां बिम्बं वेधेन सुविधं ज्ञायते, दूरत्वञ्च गणनया लभ्यते । बिम्बदूरत्वमानाभ्यां परिमाणगणना (वास्तविकव्यासार्धमानं = दूरत्वं × बिम्बमानज्या) सरला । परं नक्षत्रपरिमाणनिर्धारणमतिदुष्करम्, नक्षत्रबिम्बमानस्यालब्धत्वात् । दीर्घतमं समीपतममपि नक्षत्रं बृहद्दूरदर्शकयन्त्रेणापि न दर्शयति स्वबिम्बम्, केवलं बिन्दुं प्रदर्शयति । तथापि ज्योतिर्गणकैरुपायान्तराण्यन्विष्टानि, यैः कतिपयानां नक्षत्राणां परिमाणानि लभ्यन्ते ।

(१) ग्रहणशीलद्विकनक्षत्रस्य प्रधाननक्षत्र-सहचारिनक्षत्रयोः परिमाणगणना सम्भवा । फोटोमीटरयन्त्रेण प्रकाशहानिं प्रमाप्य परिमाणं गण्यते ।

(२) यत्र यथार्थचाक्षुषकोटिर्वर्णच्छत्रीयवर्गश्च ज्ञातपूर्वो, तत्रापि परिमाणगणना सरला । यथार्थचाक्षुषकोटिमानेन पूर्णोज्ज्वल्यं माप्यते । वर्णच्छत्रीयवर्गेण तत्पृष्ठस्य तापक्रमश्च ज्ञायते । पूर्णोज्ज्वल्यञ्च प्रतिवर्गक्रोशार्धपृष्ठस्य तापक्रमानुपाति, अत एवं सम्पूर्णं पृष्ठं ज्ञायते । पृष्ठमानज्ञानेन व्यासो निश्चीयते । एवं निश्चितानां नक्षत्राणां व्यासा निम्नलिखितसारिण्यां दत्ताः—

(सारिणी त्वध्यायान्ते संलग्ना)

(३) 'इन्टरफेरोमीटर'नामयन्त्रेणापि परिमाणगणना शक्या । माउण्टविल्सन-वेधशालायां शत-इञ्चीयदूरदर्शकयन्त्रे संलग्नेन २० फुटमितदैर्घ्यवता इन्टरफेरोमीटरयन्त्रेण कतिपयानां नक्षत्राणां परिमाणानि मापितानि सन्ति । (अस्य यन्त्रस्य विवरणं दुर्बोधत्वाद्न न दीयते)

११.५१ परिमाणगणनायाः क्रमः

स्थायते । प्रकाशः ।
परिव । अत एव ।

(१) फोटो-मिटराणि, दैत्याकाराणि च

(२) सूर्यचन्द्र-नक्षत्राणि—सूर्यात् किञ्चिद्वर्षाणि

—सूर्यसमानि

—सूर्यात् किञ्चित्तुल्यानि

(३) ग्रह-वामनाकाराणि

०८० क्रोशार्धानि प्रतिदिनम् ।

एकादशोऽध्यायः

२३१

दैत्याकारकाणां नक्षत्राणां व्यासोऽतिदीर्घः । सर्वप्रथममेतेषां सर्वाधिकौज्ज्वल्यमवलोक्य 'दैत्याकाराण्येतानि' इति निश्चितं ज्योतिर्विद्भिः, अधुना परीक्षणैस्तेषां यथार्थतो दैत्याकारत्वं निश्चितमस्ति । ज्येष्ठानक्षत्रं रक्तवर्णकं विशालतममस्ति । यदि सूर्यो ज्येष्ठानक्षत्रमिव विशालो भवेत्तर्हि भौमभूयुक्बुधा ग्रहा सूर्यस्योदर एव भवेयुः । रक्तवर्णमार्द्रानक्षत्रमपि पर्याप्तं विशालम् । सूर्यो यदि तद्वद् भवेत्तर्हि वयं सर्वे पृथिवीवासिनस्तस्योदर एव भवेम ।

मुख्यश्रेणीकनक्षत्राणि प्रायः सूर्यसमानि परिमाणविषये । नीलवर्णकानि किञ्चित् सूर्याद् दीर्घतराणि, रक्तवर्णकानि च सूर्याल्लघुतराणि ।


लघुतमानि नक्षत्राणि 'वामनाकाराणि' इति नाम्ना प्रसिद्धानि । एतानि परिमाणे भूसमानि भौमसमानि वा ।

११.६ पिण्डमात्रा

कस्यचिदपि नक्षत्रस्य समीपतमवर्तिनक्षत्रस्योपरि गुरुत्वाकर्षणफलमेतावदल्पं यद् नक्षत्र-पिण्डमात्रानयनं प्रायेण दुर्लभमेव । तथाप्याधुनिकतमसिद्धान्तैर्ज्योतिर्विदः कतिपयानां नक्षत्राणां पिण्डमात्रां गणयन्ति ।

(१) द्विकनक्षत्रेषु प्रधाननक्षत्रस्य सहचारिनक्षत्रस्य पिण्डमात्रागणना सरला, यतः पिण्डद्वयस्य गतिनियमजनितविश्लेषणैः पिण्डमात्रा ज्ञातव्या भवति । (द्रष्टव्यः § १२.१८)

(२) यथार्थचाक्षुषकोटि-पिण्डमात्रा-सम्बन्धो निश्चितोऽस्ति । अतो यदि चाक्षुषकोटि-रूपायान्तरेण निर्णीतास्ति तर्हि पिण्डमात्रा ज्ञातव्या भवति । गणितज्ञैर्नैकनक्षत्राणां चाक्षुषकोटीः



१. अस्य नक्षत्रस्य भारतीयज्योतिर्विद्यायां नाम 'ज्येष्ठा' अस्ति । इदं दैत्याकारं परिमाणे ज्येष्ठम् । किमिदं केवलं संवादित्वम् ।

२३६

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

पिण्डमात्राश्च सुष्ठु विश्लेष्य नियम उपलब्ध एकः । पिण्डमात्रा-औज्ज्वल्य-रेखाचित्रे यथार्थ-
चाक्षुषकोटेः पिण्डमात्राया लघुगणकाङ्कः प्राप्यते ।

११.६१ घनत्वम्

पिण्डमात्रां परिमाणञ्च ज्ञात्वा मध्यमघनत्वमानस्यानयनमतिसरलम्, यतो मध्यमघनत्वं

$$= \frac{\text{पिण्डमात्रा}}{\text{पिण्डघनक्षेत्रम्}}$$
 । अत्रेदमवधारणीयं यन्नक्षत्रे घनत्वं सर्वत्र न समम्, केन्द्रसमीपवर्तिभागस्य
 घनत्वमधिकं केन्द्रदूरवर्तिभागस्य च घनत्वं विरलम् ।

नक्षत्राणि घनत्वविषयेऽत्यधिकं विषमाणि । ज्येष्ठानक्षत्रस्य घनत्वं न्यूनतममस्ति, तद्
 वायुघनत्वस्य ०००५ भागमितम् । श्वेतवामनाकाराणाञ्च घनत्वं सर्वाधिकमस्ति । (द्रष्टव्या
 सारिणीसंख्या ११०८) ।

११.६२ तापक्रमः

सुदूरवर्तिनां नक्षत्राणामपि तापक्रमनिर्धारणमाधुनिकविज्ञानस्याद्भुतं कर्म । सूक्ष्म-
 परीक्षणैरिदं ज्ञायते यन्नक्षत्राणां वर्णस्तापक्रमाधीनः, अत एव वर्णस्य ज्ञानेन तापक्रमनिर्धारणं
 सम्भवम् । वर्णस्य ज्ञानं वर्णसूचकेन (§ ११.२३१) भवति । अत एव ज्योतिर्गणकैर्वर्णसूचक-
 तापक्रमसम्बन्धो निर्धारितः । स अधो दीयते—

$$\text{तापक्रमः} = \frac{७२००}{\text{वर्णसूचकम्} + ०.६४}$$

उदाहरणम्—लुब्धकस्य वर्णसूचकं शून्यमितम्, अत एव तस्य तापक्रमः $= \frac{७२००}{०.६४} =$
 $११,२००^{\circ}\text{K}$

एवं शीतलतमानां नक्षत्राणां तापक्रमः १,८०० सेण्टीग्रेडमितः, उष्णतमानाञ्च ५०,०००
 सेण्टीग्रेडमितोऽस्ति ।

वर्णच्छत्र-तापक्रम-सम्बन्धेनापि तापक्रमो माप्यते । सम्बन्धोऽयं सर्वप्रथमं भारतीयज्योति-
 भौतिकशास्त्रिणा दिवङ्गतेन मेघनादशाहमहोदयेन ख्रिस्ताब्दे १९२१-तम उद्घोषितः ।

११.७ वर्णच्छत्रीयवर्गाः

११.७१ नक्षत्राणां वर्णच्छत्रम्

नक्षत्राणां वर्णच्छत्रमुपायद्वयेन फोटोफलके गृह्यते ।

(१) एकस्मिन्नेव फोटोफलके इष्टनक्षत्रस्य वर्णच्छत्रं प्रयोगशालीयधातुविशेषस्य च
 वर्णच्छत्रं गृह्यते (विवरणं § ११.४१२ तमे द्रष्टव्यम्) ।

(२) यदि बहूनां नक्षत्राणां वर्णच्छत्राणि परीक्षाणि तर्हि एकं महत्त्रिपाङ्गं व्यतीत्य
 नक्षत्राणां किरणा वर्णच्छत्राणि रचयन्ति ।

‘हेल्मिडेर’ महोदयेन ख्रिस्ताब्दे १९२४ तम एका वर्णच्छत्रसूची प्रकाशिता । अस्यां
 सूच्यां प्रा. २५,३००-नक्षत्राणां वर्णच्छत्रीयवर्गा दत्ताः सन्ति ।

११.७२ वर्णच्छत्रीयवर्गाः

वर्णच्छत्राणां विशेषाध्ययनं कृत्वा ज्योतिर्भौतिकशास्त्रिभिः सप्त वर्गा निश्चिताः, तेषां वर्गाणां चिह्नानि O, B, A, F, G, K, M, सन्ति । सूक्ष्ममेदोपलब्धये प्रत्येकं वर्गस्य दशांशाः क्रियन्ते । एवं g_0 वर्णच्छत्रं G. वर्णच्छत्र K. वर्णच्छत्रमध्ये K. वर्णच्छत्रस्य समीपे वर्तते ।

वर्णच्छत्रज्ञानमतिमहत्त्वपूर्णम् । नक्षत्रस्य रासायनिकसंरचना तापक्रमो भौतिकस्थितयो वर्णो विकासश्च वर्णच्छत्रविश्लेषणेनैव ज्ञायन्ते ।

वर्णच्छत्रीयवर्गाणां विवरणानि निम्नसारिण्यां दीयन्ते—

वर्णच्छत्रीयवर्गाः	प्रमुखनक्षत्राणि	वर्णाः	विवरणानि
O	—		अत्यधिकमुष्णानि । वर्णच्छत्रे आयणीकृतहेलियनम्, आक्सीजनं नाइट्रोजनं सूच्यन्ते
B	रीगेल चित्रा		'हेलीयमरेखाः सर्वाधिकाः B_2 ' वर्गीयेषु ।
A	लुब्धकः, अभिजित्	नीलः	सर्वाधिकाः । A. वर्गे हाइड्रोजनरेखाः
F	अगस्त्य-प्रोक्योनः—		H. K-रेखाः कैल्शियम-तत्त्वस्य वर्धन्ते ।
G	सूर्यः ब्रह्महृदयः पीतः		धातूनां रेखाः सर्वाधिकाः ।
K	स्वाती रोहिणी रक्तपीतः		
M. ^१	आर्द्रा, ज्येष्ठा रक्तः		

निम्नलिखितसारिण्यां वर्णच्छत्र-तापक्रमसम्बन्धादयो दीयन्ते—

वर्णच्छत्रीयवर्गाः	वर्ण-सूचकम्	ताप-क्रमः	वर्णच्छत्रीय-वर्गः	मुख्यश्रेणीकानाम् वर्णसूचकः	मुख्यश्रेणीकानाम् तापक्रमः	दैत्याकाराणाम् वर्णसूचकः	दैत्याकाराणाम् तापक्रमः
O _५		५०,०००°K	G _०	०.५७	५७६०°K	०.६७	५३००°K
B _०	-०.३३	२१.०००	G _५	०.६५	५,४००	०.९२	४,५००
B _५	-०.१८	१४.०००	K _०	०.७८	४,९००	२.१२	४,०००
A _०	०-००	१०,६००	K _५	०.९८	४,३००	१.५७	३,२००
A _५	०.२०	८,२००	M _०	१.४५	३,४००	१.७३	३,०००
F _०	०.३३	७,१००	M _२	...	२,८६०	—	२,८००
F _५	०.४७	६,३००	M _८	...		—	२,०००

१. अधुना W. R. N. S चिह्नप्रदर्शिताश्ववारो वर्णच्छत्रीयवर्गा अपि मलिता अत्र ।

२३८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

सारिणी संख्या ११.८

मुख्यनक्षत्राणां तापक्रमव्यासादीनां

सारिणी


नक्षत्राणि	वर्णच्छत्रीय- वर्गः	तापक्रमः (K)	व्यासः (सूर्यस्य = १)	पिण्डमात्रा, (सूर्यस्य = १)	घनत्वम् (सूर्यस्य = १)
दैत्याकारिणि	M _१				
ज्येष्ठा	M _१	३,००० K	३९०	१०	०.००००००२
रोहिणी	K _५	३,२००	७२	४	०.००००१
स्वाती	K _०	४,०००	३०	४	०.०००१
ब्रह्महृदय A	G _०	५,३००	१६	४	०.००१
मुख्यश्रेणीकानि					
B-किन्नरः	B _१	१९,०००	६	४	०.०२
अभिजित्	A _०	१०,६००	२.६	३	०.२
लुब्धकः A	A _०	१०,६००	१.९	२.४	०.३
श्रवण	A _५	८,२००	१.६	२	०.५
प्रोक्ष्योन	F _३	६,३००	२.३	१.१	०.१
L-किन्नर A	G _०	५,७५०	१.३	१.१	०.५
सूर्यः	G _०	५,७५०	१.०	१.०	१.०
७०-सर्पधरः A	K _०	४,९००	१.०	०.९	०.९
६१-हंस A	K _०	३,९००	०.७	०.५	१.४
क्रूगर-६० A	M _३	३,३००	०.३	०.३	९
रश्मिबामनानि					
लुब्धक-B	F	७,५००	०.०३४	०.९६	२५.०००
०२ चैतरणी B	A _०	११,०००	०.०१९	०.४४	६४.०००

द्वादशोऽध्यायः द्विकानि, विकारिनक्षत्राणि च

[नक्षत्रेष्वेकाकीन्यत्यल्पकानि, प्रायेण द्विकानि त्रिकाणि बहुकानि वा लभ्यन्ते । भास्वरत्वञ्च केषाञ्चिद् हीयते वर्धते । अत्र तानि द्रष्टव्यानि ।]

१२.१ द्विकनक्षत्राणि

खगोले प्रायेण दृष्टिगोचरतामायाते परस्परमतिसामौष्यं भजमाने द्वे नक्षत्रे । एते नक्षत्रे नक्षत्राणां द्वितयमुच्यते । एतेषां द्वितयानां मध्ये कतिपयानि द्वितयानि द्विक-नाम्ना प्रसिद्धानि । सर्वाणि द्वितयानि द्विकानि न । ये द्वे नक्षत्रे वस्तुतः परस्परमतिदूरत्वं भजमाने अप्येकस्मिन्नेव दृक्पथे तिष्ठती युगलरूपेण दृश्येते, ते केवलं नक्षत्रद्वितयम् । ये द्वे नक्षत्रे वास्तविकरूपेण भुवः समानवर्तिनी भौतिकसम्बन्धेन सम्बद्धे गुरुत्वाकर्षणशक्त्या परस्परं परितो भ्रमतः, ते नक्षत्र द्विकानि । निम्नचित्रेण नक्षत्राणां द्वितयत्वस्य द्विकत्वस्य भेदः स्पष्टीभविष्यति ।



१२.११ द्विकनक्षत्राणां भेदौ

द्विकनक्षत्राणि द्विविधानि—चाक्षुषद्विकानि, वर्णच्छत्रीयद्विकानि च । यानि द्विकनक्षत्राणि दूरदर्शकयन्त्रेण द्विकभावं प्रकटयन्ति तानि चाक्षुषद्विकानि कथ्यन्ते । यानि दूरदर्शकयन्त्रेणाप्येकमिव दृश्यन्ते, केवलञ्च वर्णच्छत्रे 'डब्लर'-सिद्धान्तेन रेखाविचलनेन द्विकभावं पिशुनयन्ति तानि वर्णच्छत्रीयाणि । वर्णच्छत्रीयद्विकानां मध्ये यदि नक्षत्रे एवं स्थिते यद् भूपृष्ठेन दृष्टे तयोः कक्षावृत्ते लम्बरेखायां स्थिते, तर्हि ते परस्परं परिक्रमणे अन्योन्यमाच्छादयतः । तानि द्विकानि ग्रहणशीलद्विकान्युच्यन्ते ।

१२-१२ द्विकभावनिर्धारणम्

द्वयोर्नक्षत्रयोर्मध्ये कियत्कोणीयान्तरं प्राप्ते द्विकभावशङ्का जायते, अत्र ज्योतिर्विदां सम्प्रति-
पत्या निर्णयो निम्नः ।

$$\text{लघुगणक (परस्परकोणीयदूरत्वं)} = २८ - \frac{\text{चाक्षुषकोटिः}}{५} \text{ द्विकभावं प्रकटयितुं दूरदर्श-}$$

कस्य विश्लेषिणी शक्तिः प्रयुज्यते, लघुदूरदर्शकयन्त्रे तु ते एकमिव दृश्येते । दूरदर्शकस्य विश्लेषिणी
शक्तिश्च मुखतालस्य व्यासाधीना (द्रष्टव्यः § ९-२४) । अधुना यन्त्रपरिष्कारेण फोटोचित्रकलया
च ०-१ विकलाभागादल्पतरं कोणीयान्तरमपि पृथक् क्रियते ।^१


१२-१३ द्विकानां परस्परपरिक्रमणम्

द्विकनक्षत्रस्य द्वे नक्षत्रे गुरुत्वाकर्षणशक्त्या परस्परसम्बद्धे वर्तते । यथा सौरमण्डले सूर्यो
दीर्घवृत्तस्यान्यतरनाभौ वर्तते, कक्षावृत्तानि च दीर्घवृत्ताकाराणि तथैवैकं नक्षत्रमन्यतरनाभौ वर्तते,
द्वितीयञ्च 'केप्लर'नियमानुसारं दीर्घवर्तुलकक्षायां भ्रमति । परिक्रमणमिदं सदैव वस्तुतो दीर्घवृत्ता-
कारं दृश्यते, तथापि दृक्सूत्रवैभिन्न्यात् प्रधाननक्षत्रं सदैव नाभौ न दृश्यते ।

द्विकनक्षत्रस्य द्वयोर्नक्षत्रयोर्मध्ये यदधिकभास्वरत्ववत् तत् प्रधाननक्षत्रं कथ्यते, द्वितीयञ्च
सहचारिनक्षत्रमुच्यते । द्वयोर्मध्य एकः केन्द्रो विद्यते, यमभितस्ते परिभ्रमतो यथा भूचन्द्रौ
(द्रष्टव्यः § ३३१)

१२-१४ द्विकानां परस्परसम्बन्धस्य द्व तत्त्वे

द्विकनक्षत्रस्य द्वयोर्नक्षत्रयोः परस्परसम्बन्धमवगन्तुं द्वयोस्तत्त्वयोरावश्यकता वर्तते—
स्थानिककोणः कोणीयदूरत्वञ्च । उभये 'माइक्रोमीटर'यन्त्रेण ससौविध्यं मीयेते ।



द्विकस्य परस्परस्थानिककोणदूरत्वे

१ एटकिन्समहोदयस्य 'न्यू जनरल केटालाग' पुस्तके उत्तरीयध्रुवस्य १२० अंशान्तर-
व्यापीनि प्रायः १७१८० द्विकनक्षत्राणि गणितानि ।


द्वादशोऽध्यायः

२४१

स्थानिककोणः ध्रुवप्रधाननक्षत्रप्रोतरेखया प्रधाननक्षत्रसहचारिनक्षत्रप्रोतरेखायोगात्कल्पितः
कोण उच्यते । प्रधाननक्षत्रस्य सहचारिनक्षत्राद् दूरत्वं कोणीयान्तरं (अथवा दूरत्वम्) उच्यते ।


१२.१५ माइक्रोमीटरयन्त्रम्

फिलरमाइक्रोमीटरयन्त्रमेकं वृत्ताकारपटलं यस्य परिधौ कोणांशा भचक्रमिता अङ्किताः ।



माइक्रोमीटरम्

तस्य मध्यकेन्द्रे प्रधाननक्षत्रस्य विम्बं क्रियते । अ आ इ ई द्वे लतासूत्रे समानान्तरे चले च । ते



माइक्रोमीटरस्य वृत्ताकारपटलम्

चालयित्वा नक्षत्रयोः समानान्तरे क्रियते । अनेन स्थानिककोणः (अ आ-कृतकोण इ ई-कृत-
कोणो वा) निर्णीयते ।

२४२

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

पुनः क-ख एकं स्थिरसूत्रं प्रधाननक्षत्रत्रिम्बप्रोतम्, द्वितीयं गघ-चलं सूत्रम् । तद् गघ-सूत्रमेवं चाल्यते यद् गघ-रेखायां सहचारिनक्षत्रस्य प्रतिविम्बं लभ्यते । अनेन दूरत्वं (क ख-गघयोरन्तरं) विकलात्मकं कोणीयान्तरं वा प्राप्यते ।

१२.१६ परिक्रमणमार्गनिर्णयः

विभिन्नकालेषु द्विकानां फोटोचित्राणि गृह्यन्ते । सहचारिनक्षत्रस्य विभिन्नाः स्थानिककोणाः,




१९०८

१९१५

१९२०

‘क्रूर’ ६० द्विकनक्षत्रस्य प्रधान-सहचारिनक्षत्रयोः परिक्रमणम्

[यरकिज-वेधशाला]



विभिन्नकोणीयान्तराण्यङ्कयित्वा तस्य परिक्रमणमार्गः सुस्पष्टं निश्चीयते । यथा उपरि दत्तैस्त्रिभिश्चित्रैः ‘क्रूर’-६०-नक्षत्रस्य सहचारिनक्षत्रस्य च परिक्रमणमार्गो निश्चितोऽत्र चतुर्युचित्रे ।

१२.१७ द्विकानां कक्षातत्त्वानि

ग्रहाणां कक्षातत्त्वानीव द्विकानां कक्षायाः सप्त तत्त्वानि । मध्यमकर्णः, परिक्रमणकालः, कक्षाणमनम्, उत्केन्द्रिता, परिक्रमणतलसंपातयोः स्थानिककोणौ, भनीचसंपातयोः कोणीयान्तरम्, ध्रुवकभोगांशाश्च सप्त तत्त्वानि । वेधत्रयेण कक्षातत्त्वनिर्धारणं सम्भवं यद्यपि यथार्थफलोपलब्धये बहवो वेधाः क्रियन्ते ।

प्रायः शताधिकद्विकानां कक्षा निर्धारिताः सन्ति । लघुतमः परिक्रमणकालः ४.५६ वर्षाणि । उत्केन्द्रिताधिकृतया पर्याप्ता लभ्यते । उत्केन्द्रिता-मध्यम-मानं प्रायः ०.५ मितम् ।

१२.१८ द्विकानां पिण्डमात्रा

द्विकानां पिण्डमात्रानिर्धारणं न दुष्करम्, यतः ‘केप्लर’नियमेन गुरुत्वाकर्षणगुणाङ्कं प्राप्य पिण्डमात्रानिर्धारणं सुकरम् ।

$$\text{द्विकस्य द्वयोर्नक्षत्रयोः सम्मिलितपिण्डमात्रा} = \frac{(\text{मध्यमकर्णः})^3}{(\text{नाक्षत्रपरिक्रमणकालः})^2 \times (\text{लम्बनम्})^3}$$

द्वादशोऽध्यायः

२४३

१२.१६ उदाहरणानि

मित्रम्—समीपतमं नक्षत्रमिदं सर्वप्रथमं द्विकभावं प्रादर्शयत् । सहचारिनक्षत्रस्य प्रधाननक्षत्रादल्पतमदूरत्वं सूर्यशनिदूरत्वसमम् । क्यास्टर-नक्षत्रमेकं परिचितं द्विकनक्षत्रम्, अस्य परिक्रमणकालः ३८० वर्षाणि । लुब्धकस्यापि सहचारिनक्षत्रं वर्तत इति वेधात् पूर्वं गणितेनैव 'वेसेल'-महोदयेन १८३४-तमे ख्रिस्ताब्दे विज्ञापितम् । प्रश्वानक्षत्रस्यापि सहचारिनक्षत्रं तेनैव महोदयेन सर्वप्रथमं गणितपद्धत्या ह्याविष्कृतम् । अधुना तु प्रधाननक्षत्रगतिविकारमुपलभ्य नैकसहचारिनक्षत्राणामुपस्थितिर्गणितेन सूचिता, यद्यपि तान्यदृश्यान्वेव वर्तन्ते ।

१२.१६१ कक्षातत्त्वानि प्रमुखद्विकानाम्


निम्नसारिण्यां प्रमुखद्विकानां कक्षातत्त्वानि दीयन्ते—

नाम	चाक्षुषकोटिः		परिक्रमण- कालः (वर्षाणि)	मध्यम- कर्णः	उत्केन्द्रिता	लम्बनम्	सम्मिलित- पिण्डमात्रा (सूर्य १)
BD-८° ४३५२	९.९	१०.०	१.७	०''.१८	—	०''.१४८	०.७
८ अश्वकः	५.३	५.४	५.७	०.२७	०.३९	०''.०६६	२.१
४२ केशः	५.२	५.२	२५.९	०.६६	०.५२	०''.०५८	२.२
प्रश्वा	०.५	१३.५	४०.२	४.२६	०.३१	०''.२९४	१.९
'क्रू' ६०	९.३	१०.८	४४.५	२.३६	०.४१	०''.२५७	०.४
लुब्धकम्	-१.६	८.४	४९.९	७.६२	०.५९	०''.३७८	३.३
मित्रम्	०.३	१.७	८०.१	१७.६६	०.५२	०''.७४८	२.१
'क्यास्टर'	२.०	२.८	३८०.	५.८४	०.३७	०''.०७४	३.४

१२.२ वर्णच्छत्रीयद्विकानि

२५००० चाक्षुषद्विकेभ्यो व्यतिरिक्तानि सन्ति बहूनि द्विकानि यानि दूरदर्शकयन्त्रेणापि गोचरत्वातीतानि । ईदृशानां द्विकानां द्विकभावस्तेषां वर्णच्छत्रेणावगम्यते, ग्रहणशीलद्विकानाञ्च ग्रहणशीलत्वेन सूच्यते । (ग्रहणशीलद्विकानि विकारिनक्षत्राणां मध्ये कीर्तितानि, द्रष्टव्यः § १२.५५) ।

यदि द्वे नक्षत्रे चाक्षुषद्वितयं तर्हि तयोर्वर्णच्छत्रं सममेव । प्रथमनक्षत्रस्य वर्णच्छत्रीयरेखा




वसिष्ठस्य वर्णच्छत्रम्

[यरकज-वेधशाला]

द्वितीयनक्षत्रस्य वर्णच्छत्रीयरेखासु सन्निपत्यैकमेव (एकस्य नक्षत्रस्येव) वर्णच्छत्रं जनयन्ति । परन्तु यदि ते द्वे नक्षत्रे द्विकं तर्हि तयोरेकं द्वितीयमभितो भ्रमति, भ्रमणगतित्वात्तयोर्वर्णच्छत्रीय-रेखा त्वीषद् विचलिता दृश्यन्ते । भुवं प्रत्यागच्छतो नक्षत्रस्य वर्णच्छत्रीयरेखा नीललोहितोत्तरं प्रति विचलन्ति; भुवो दूरं गच्छतो रेखा उपरक्तं प्रति विचलन्ति । एवं प्रत्यक्षरूपेणैकस्य नक्षत्रस्य वर्णच्छत्रे जनितानि रेखाविचलनानि द्विकभावं प्रकटयन्ति । अधो वसिष्ठनक्षत्रस्य वर्णच्छत्रं दीयते । वसिष्ठस्य सहचारिनक्षत्रमरुन्धतीनाम्ना संस्कृतशास्त्रेषु प्रसिद्धम् । परन्तु वसिष्ठ-द्विकनक्षत्रस्य प्रधाननक्षत्रं स्वयमेकं वर्णच्छत्रीयद्विकम् । अत्र प्रधाननक्षत्रस्य वर्णच्छत्रं दीयते । वर्णच्छत्रे रेखाणां विचलनेन वर्णच्छत्रीयद्विकत्वं सूच्यते ।

१२-२१ वेगरेखाचित्रम्

डाप्लर-सिद्धान्तेन नक्षत्रस्य केन्द्रीयगतिवेगो निश्चीयते । केन्द्रीयवेगमानानि रेखाचित्रे




द्वादशोऽध्यायः

२४५

यद्यालिख्यन्ते तर्हि परिक्रमणमार्गानुसारं विभिन्नानि रेखाचित्राणि प्राप्यन्ते । एवं वेगरेखाचित्र-
परिक्रमणमार्गसम्बन्धं विज्ञाय वेगरेखाचित्रेण परिक्रमणमार्गो निश्चीयते । द्विकानां वेगरेखाचित्रं
सरलतया वर्णच्छत्रीयरेखाविचलनेभ्यो ज्ञायते, अत एव तेषां परिक्रमणमार्गा अपि सरलतया
निर्धार्यन्ते । २४४ पृष्ठे दत्तानि चत्वारि वेगरेखाचित्राणि सपरिक्रमणमार्गाणि ।

निम्नचित्रे चित्रानक्षत्रस्य प्रधाननक्षत्रस्य सहचारिनक्षत्रस्य च वर्णच्छत्रोपलब्धकेन्द्रीय-
वेगरेखाचित्रं दत्तम् । अनेन तयोः परिक्रमणमार्गौ प्रायो वर्तुलाकारावुपलभ्येते (वर्तुलाकारत्वम्
उपरि दत्तप्रथमचित्रेण तुलनां विधाय लभ्यते) ।



चित्रः नक्षत्रस्य सहचारिनक्षत्रस्य ।

१२.२२ उदाहरणानि

द्विकनक्षत्रेषु सर्वप्रथमं वसिष्ठ एव ज्ञात आसीद् । अनन्तरञ्च तस्य वर्णच्छत्रीयद्विकभावोऽपि
सर्वप्रथमं ज्ञातः, ब्रह्महृदयाख्यनक्षत्रं चित्रा-क्यास्टरादिनक्षत्राण्यपि वर्णच्छत्रीयद्विकानि सन्ति ।

१२.२३ द्विकानामुत्पत्तिः

विवादग्रस्तमिदं मतं यक्षभ्रमणस्यातिजवात् सहचारिनक्षत्रं प्रधाननक्षत्राद् निस्सरति ।
तथापि वर्णनीयमिदम्, बहुभिर्विद्वद्भिर्रुरीकृतत्वात् । किमपि नक्षत्रं यस्य घनत्वं विरलमक्षभ्रमणञ्च
मन्दं गुरुत्वाकर्षणेन स्वकेन्द्रं प्रति संपीड्यते । सम्पीडनादक्षभ्रमणे शैथिल्यमागच्छति, अक्षभ्रमण-
शैथिल्येण विषुवभागा बहिर्लम्बिनो भवन्ति । यथा यथाक्षभ्रमणमतिशैथिल्यं भजते तथा तथा विषुव-
भागा अधिकाधिकं स्फीता बहिर्लम्बिनो भवन्ति । अन्ततो मध्यभागा मुख्याङ्गात् प्रच्युत्य सह-
चारिनक्षत्ररूपं धारयन्ति ।

अधुना तु नक्षत्राणां विश्वरजोजनिततावादो द्विकानामुत्पत्तिमन्यथा व्याख्याति ।

१२.३ त्रिकाणि

द्विकानां नक्षत्राणां कतिपयानि वस्तुतस्त्रिकाणि । तत्र त्रीणि नक्षत्राणि भौतिकरूपेण सम्बद्धानि सन्ति । 'क्यास्टर'नक्षत्रं चानुषद्विकम् । तस्य द्वयोर्नक्षत्रयोरन्तरं ६-विकलमितम्, परन्तु तस्मात् ७३ विकल-दूरत्वे विद्यते, एकं नवमकोटिकं नक्षत्रं यस्य प्रकृता गतिः 'क्यास्टर'-गतिसमा । अस्य परिक्रमणकालः १०,००० वर्षाणि । इदमपि 'क्यास्टर'नक्षत्रेण भौतिकसम्बन्धेन सम्बद्धमित्यनुमीयते । एवमत्र त्रिकं प्राप्यते । ध्रुवनक्षत्रमपि त्रिकमस्ति । केन्द्रीयगतिविकारात् प्रथमं तस्य रेखाच्छत्रीयसहचारिनक्षत्रं प्राप्तम्, तस्य परिक्रमणकालश्च ४-दिनमितः । तथापि तस्य ध्रुवस्य केन्द्रीयगतौ विक्षेपो दृश्यते, अत एवानुमीयते तृतीयस्य नक्षत्रस्यादृश्यरूपस्योपस्थितिर्येन स्थानच्युतिरियं क्रियते ।

१२.४ बहुकानि

यथा त्रिकेषु त्रीणि नक्षत्राणि भौतिकरूपेण सम्बद्धानि लभ्यन्ते तथैव बहुकानि दृश्यन्ते, यत्र बहूनि नक्षत्राणि भौतिकसम्बन्धेन सम्बद्धानि । वर्णच्छत्रपरीक्षणेनानेकानि नक्षत्राणि वर्णच्छत्रीय-द्विकानि सिद्धानि यानि पूर्वमेकाकीनि मतानि । उपरि कथितं यत् क्यास्टरनक्षत्रमेकं त्रिकमस्ति, परन्तु सर्वाणि त्रीणि वर्णच्छत्रीयाणि द्विकानि (तृतीयमतिधूमिलनक्षत्रमपि वर्णच्छत्रीयद्विकम् !) एवं नेत्राभ्यामेकाकि क्यास्टरनक्षत्रं बहुकं यत्र षट् नक्षत्राणि परस्परगुरुत्वाकर्षणसम्बन्धेन सम्बद्धानि लभ्यन्ते ।

वस्तुतोऽनन्ताकाशे चैकाकिनक्षत्रस्य (सूर्यस्येव) उपलब्धिः प्रायो दुर्लभा । अधिकतरन्तु नक्षत्राणि द्विकानि त्रिकाणि बहुकानि वा लभ्यन्ते ।

१२.५ विकारिनक्षत्राणि

सूर्यस्य गुणैरेवान्येषां नक्षत्राणां गुणाः प्रायोऽनुमीयन्ते, यतः सूर्योऽस्माकं सर्वाधिकपरिचितं नक्षत्रम्, परन्तु नुमानमिदं न सर्वथा सत्यम् । दृश्यन्ते यदा कदाप्यत्रापवादाः । एकोऽपवादः सूर्यस्य प्रकाशस्यैकरूपत्वे लभ्यते । सूर्यः सदैवैकरूपेण (सर्वदा सममात्रयैव) प्रकाशं तापञ्च विकिरतीति सार्वकालिकोऽनुभवोऽस्माकम् । परन्तु विद्यन्ते नैकानि नक्षत्राणि येषां प्रकाशताप-विकिरणविषये वर्तते विकारिभावः । कस्मिंश्चिदिने चातिधूमिलानि, कस्मिंश्चिदिने तान्यति-भासुराणि दृश्यन्ते । कतिपयानान्तु सर्वाधिकौज्ज्वल्यकाले सर्वालपौज्ज्वल्यकालापेक्षया बहुगुणित-भास्वरत्वम् । एतादृशानि प्रकाशविकारित्वाद् विकारिनक्षत्राणि प्रोच्यन्ते ।

१२.५१ विकारिनक्षत्राणां भेदाः

विकारिनक्षत्राणां विकारहेतुमूलकास्त्रयो भेदाः—

(१) स्फुरणशीलानि—अत्र स्फुरणात्तेषां भास्वरत्वे विकारो जायते ।


(२) विस्फोटशीलानि—एतेषु प्रायेण विस्फोटा भवन्ति, विस्फोटेन तेषां भास्वरत्वं विकारं लभते ।

(३) ग्रहणशीलानि—द्विकनक्षत्रे यदि नक्षत्रयोः परिक्रमणतलमस्माकं दृक्सूत्रस्य लम्बरूपेण विद्यते, तर्हि काले काल एकं नक्षत्रमपरस्य सम्मुखमायाति, आच्छाद्यनक्षत्रस्य भास्वरत्वं

क्षीणतां भजते यथा सूर्यग्रहणे सूर्यस्य भास्वरत्वम्, चन्द्रस्य सम्मुखगतत्वात् । एतानि द्विकानि ग्रहणशीलानि कथ्यन्ते ।

१२.५२ प्रकाश-रेखाचित्रम्

विकारिनक्षत्राणां भास्वरत्वं हीयते वर्धते च, अत एवाध्ययनसौकर्यायैषां प्रकाशरेखा-चित्राण्यालिख्यन्ते । प्रकाशरेखाचित्रस्यैकस्मिन्नक्षेत्रे दिनान्यङ्कयन्ते, द्वितीयेऽक्षेत्रे च नक्षत्रकोट्यां जातानि परिवर्तनान्यङ्कयन्ते । निम्नतमाद् बिन्दोः पुनर्निम्नतमत्रिन्दुपर्यन्तं कालावधिः (द्वयोर्निम्नतम-



भास्वरत्वकालयोर्मध्यवर्ती कालः) इष्टनक्षत्रस्यावृत्तिकाल उच्यते । उपरि दत्ते प्रकाशरेखाचित्र आवृत्तिकालः सप्तदिनमितः ।^१

१२.५३ स्फुरणशीलविकारिनक्षत्राणि

१२.५३१ भेदाः

स्फुरणशीलविकारिनक्षत्राणां चत्वारो भेदा दृश्यन्ते—

- (अ) वार्षपर्वविकारिनक्षत्राणि ।
- (आ) अर्धनियमितविकारिनक्षत्राणि ।
- (इ) दीर्घकालिक-विकारिनक्षत्राणि ।
- (ई) अनियतकालिक-विकारिनक्षत्राणि ।


१. विकारिनक्षत्राणां प्रकाशमात्रा फोटोविद्युद्यन्त्रेण माप्यते । इदं 'फोटोमीटर' नामकं यन्त्रमीदृशं सूक्ष्मग्राहि यत् शतक्रोशार्धदूरत्वे स्थिताया एकस्या दीपशिखायाः प्रकाशमात्राप्यनेन यथार्थतया मीयते । एकेनान्येन च यन्त्रेण (वायुशून्यसूक्ष्मघर्म-मातृयन्त्रेण) नक्षत्रस्य तापविकारो गण्यते ।

१२.५३२ वार्षपर्वविकारिनक्षत्राणि

येषां विकारिनक्षत्राणामावृत्तिकालः ४५-दिवसेभ्योऽल्पः, तानि वार्षपर्वनक्षत्राणि प्रोच्यन्ते । ४-वृषपर्वनक्षत्रमस्य भेदस्य प्रमुखमुदाहरणम् । अत एव तस्य व्यपदेशेनैतानि निर्दिश्यन्ते । अत्र दृश्येते द्वौ भेदौ—आकाशगङ्गाविषयकवार्षपर्वाणि, गोलस्तवकीयवार्षपर्वाणि च ।

आकाशगङ्गाविषयकवार्षपर्वाणि—सामान्यवार्षपर्वनाम्नापि प्रसिद्धानि । एतानि प्रायेणाकाशगङ्गायाः सामीप्यं भजन्ते, आवृत्तिकालश्चैषां प्रायः पञ्चदिनमितः । अल्पतमभास्वरत्वकाले नक्षत्राणोपद्रववर्णकानि । उपरि §१२.५२ तमे दत्तं प्रकाशरेखाचित्रमेकस्याकाशगङ्गाविषयकवार्षपर्वस्यास्ति । एतानि महाकाशे विरलानि, प्रायो द्वादशसंख्याकान्येव चक्षुर्ग्राह्याणि सन्ति । अस्माकं ध्रुवनक्षत्रमपीदं प्रकारकमेकं नक्षत्रम् ।


गोलस्तवकीयवार्षपर्वाणि सर्वप्रथमं गोलस्तवकेष्वदृश्यन्त । एषामावृत्तिकालश्च प्रायोऽर्धदिनमितः । अल्पतम आवृत्तिकाल एका होरा, दीर्घतम आवृत्तिकालश्चैकं दिनम् । एषां भास्वरत्वविकारः किञ्चिदस्थिरः । महत्तमभास्वरत्वकाले द्रुतगत्या, अल्पतमभास्वरत्वकाले च मन्दगत्या विकारो भवति । एतानि सर्वाण्यतिधूमिलानि नक्षत्राणि, केवलं दूरदर्शकयन्त्रेण प्रेक्षणीयतां भजन्ते । प्रायः सर्वाणि वर्णच्छत्रीये A-वर्गे समाविशन्ति । अध एकस्य गोलस्तवकीयवार्षपर्वस्य प्रकाशरेखाचित्रं दत्तम् । तत्रावृत्तिकालः प्रायः ३५ घटिकामितः ।



गोलस्तवकीयवार्षपर्वस्य प्रकाशरेखाचित्रम् ।

वर्णच्छत्रम्—वर्णच्छत्रीयवर्गेऽपि भास्वरत्वविकारेण सह विकारो दृश्यते । तापक्रमो महत्तमभास्वरत्वकाले महत्तमः, अल्पतमभास्वरत्वकाले चाल्पतमः । वर्णच्छत्रे रेखा दोलयन्ते ।

महत्त्वम्-दूरत्व-
निर्धारणे वर्षापूर्वनक्षत्राणि
महत्त्वपूर्णानि । सर्वप्रथमं
'शेपली' महोदयेन १९१७
तमे ख्रिस्ताब्दे आवृत्तिकाल-
यथार्थभास्वरत्व-सम्बन्धो
निर्धारितः । आवृत्ति-
काल-यथार्थभास्वरत्व-रेखा-
चित्रेण आवृत्तिकालेन
यथार्थभास्वरत्वकोटिरनुमी-
यते (रेखाचित्रमत्रत्यं
द्रष्टव्यम्) । यथार्थभास्वर-
त्वकोटिं प्राप्य फोटोविष-
यकप्रतीयमानकोटिवैधेन
लभ्यते । ततो निम्नसूत्रेण पारसेकमानेन दूरत्वं गण्यते




आवृत्ति-सत्यं यथा रसभास्वरत्व-रेखाचित्रम्

$$\text{लघुगणक (दूरत्व)} = \frac{\text{प्रतीयमानकोटिः} - \text{यथार्थकोटिः} + ५}{५}$$

एवं वर्षापूर्वाणामुपस्थितिः सुदूरवर्तिनक्षत्रसमूहस्य दूरत्वं लम्बनगणनां विना प्रकटयति ।

१२.५३३ अर्धनियमितविकारिनक्षत्राणि

सन्ति प्रायः २५-संख्याकनक्षत्राणि यानि वर्षापूर्वदीर्घकालिकरक्तनक्षत्रयोर्मध्यवर्तिनि ।



RV-वृत्त-नक्षत्रस्य प्रकाशान्तराचित्रम्


RV-वृत्तनक्षत्रमेकमस्य भेदस्योदाहरणम् (तस्य रेखाचित्रमुपरि दत्तम्) एतानि वर्षापूर्वनक्षत्र-
वदल्पतमभास्वरत्वकाले किञ्चिद् रक्तवर्णकानि भवन्ति । एषां वर्णञ्छत्रीयवर्गः 'K' अस्ति ।

२५०

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

१२.५३४ दीर्घकालिकविकारिनक्षत्राणि

प्रायेण रक्तदैत्याकाराणि महादैत्याकाराणि च नक्षत्राणि दीर्घकालिकविकारिनक्षत्राणि । एषामावृत्तिकालः कतिपयमासेभ्यो वर्षद्वयपर्यन्तं दृश्यते । प्रायेणावृत्तिकालः २७५-दिनमितो लभ्यते । भास्वरत्वपरिवर्तनं पर्याप्तम्, कदाचिद् दशकोट्यन्तरमपि दृश्यते, अर्थादेकस्मिन्नावृत्तिकाले यदि महत्तमभास्वरत्वकोटिः षट् तर्हि अल्पतमभास्वरत्वकोटिः षोडश भवति ।



X-हंसनक्षत्रस्य प्रकाशरेखाचित्रम्

उपरि X-हंसनक्षत्रस्य प्रकाश-रेखाचित्रं दत्तम् । 'माइरा' नामकं नक्षत्रमपि भेदस्यास्य प्रसिद्धमुदाहरणम् । अस्य प्रकाशपरिवर्तनं गतत्रिशतकेभ्यो गणितमासीद् ज्योतिर्विद्भिः । महत्तम-भास्वरत्वकाले नक्षत्रमिदं द्वितीयकोटिकं ध्रुवसदृशं चाक्षुषनक्षत्रं भवति, परन्तु मन्दतमभास्वरत्व-काले दशमकोटिकं (केवलं दूरदर्शकेन ग्राह्यं) नक्षत्रं भवति । अस्यावृत्तिकालश्च ३३० दिनमितः । महत्तमभास्वरत्वकाले वर्णच्छत्रीयो वर्गः M_4 तापक्रमश्च २६०० सेण्टीग्रेडमितः, अल्पतमभास्वरत्व-काले च वर्णच्छत्रीयो वर्गः M_5 तापक्रमश्च १९०० सेण्टीग्रेडमितो भवति ।

१२.५३५ अनियतकालिकविकारिनक्षत्राणि

सन्ति कतिपयानि नक्षत्राणि येषां विकारोऽनियतकालिकः । एषां भास्वरत्वपरिवर्तनमत्यन्तं न्यूनं सूक्ष्मयन्त्रैरेव मापनीयम्, अन्यथा तानि विकारशून्यानीव दृश्यन्ते । आर्द्रानक्षत्रमस्य भेदस्यो-दाहरणम् । अस्य महत्तमभास्वरत्वकालीनकोटिरल्पतमभास्वरत्वकालीनकोटेः १.२ मित्ताधिकैव ।


१२.५३६ स्फुरणस्य कारणम्

अत्र 'शेपली' महोदयस्य मतं प्रायः सर्वसम्मतं वर्तते । तस्य मतेन स्फुरणशीलानि नक्षत्राणि त्राण्पमयाण्येव । तेषु हृदयस्फुरणमिव स्फुरणं भवति । स्फुरणात्तेषां परिमाणं दशप्रतिशतं पञ्चदशप्रतिशतं वा वर्धते हीयते च । तथ्यमिदं वर्णच्छत्रविश्लेषणेनापि समर्थ्यते । यथा यथा नक्षत्रस्य परिमाणं वर्धते तथा तथा तस्य भास्वरत्वं वर्धते, वर्णच्छत्रे रेखाश्चोपसरन्त्यो दृश्यन्ते । यथा यथा च परिमाणं हीयते, तथा तथा तस्य भास्वरत्वं हीयते, वर्धते, वर्णच्छत्रे च रेखा अपसरन्त्यो दृश्यन्ते । 'एडिङ्गटन' महोदयेन गणितेन साधितं यत् परिमाणवृद्धेः परिमाणहानेश्च दोलकवत् प्रक्रिया जायते, अनेन प्रकाशरेखाचित्रे त्वावृत्तिकालः प्रायः स्थिरो भवति ।

१२.५४ विस्फोटशीलविकारिनक्षत्राणि

विद्यन्ते कानिचन नक्षत्राणि यानि वस्तुतोऽतिधूमिलानि, परन्त्वकस्मादेवातितीव्रभास्वरत्वं काले काले भजन्ते, ततश्च शनैः शनैर्मन्दभास्वरत्वमधिगम्य स्थायिधूमिलत्वं गच्छन्ति । तानि

आंग्लभाषायां 'नोवा'नक्षत्राणि कथ्यन्ते । अत्र च 'नव्य'नाम्नोच्यन्ते । एतेषां वैभवमौज्ज्वल्यञ्च क्षणिके एव ।



१९०५

१९१८

नव्य-गरुड-नक्षत्रस्य भास्वरत्वम्

['यर्किज'-वेधशाला]

१२.५४१ नामकरणम्

प्रथमं 'नोवा'शब्दो लिख्यते, तत्पश्चात्तस्य नक्षत्रमण्डलस्य नाम स्थाप्यते यत्र स्थितं तद् दृष्टम्, तत्पश्चात्तस्य विस्फोटवर्षं दीयते । यथा 'नोवा'-हंस-१९४२नक्षत्रं सर्वप्रथमं हंस-नक्षत्रमण्डले १०४२-तमे ख्रिस्ताब्दे उपलब्धमासीत् ।

१२.५४२ ऐतिहासिकनव्यनक्षत्राणि

'टाइखो ब्रेही'महोदयेन १५७२-तमे ख्रिस्ताब्दे एकं नव्यनक्षत्रं दृष्टं यद् दिवाऽपि दृष्टिगोचरत्वमभजत । परन्तु तत् किञ्चित् कालानन्तरं पुनर्धूमिलमभवत् । 'केलर'महोदयश्च १६०४-तमे ख्रिस्ताब्दे भुजङ्गनक्षत्रमण्डले नक्षत्रमेकं दृष्टवान् यद् गुरुवद् औज्ज्वल्यं १८-मासान् अभजत । अधुना तु प्रायः शतसंख्याकान्याकाशगङ्गायां नव्यनक्षत्राणि प्राप्ताणि, एषां मध्ये सप्त नक्षत्राणि प्रथमकोटिकानि सन्ति ।

विंशतितमे ख्रिस्तीयशतक उपलब्धानि नव्यानि निम्नानि—


नाम	कोटिः
नव्य-ययातिः-१९०१	+ ०.१ ब्रह्महृदयवत्
नव्य-गरुडः-१९१८	- १.४ लुब्धकवत्
नव्य-हंसः-१९२०	+ १.८ ध्रुववत्
नव्य-शिलीन्ध्रः-१९२५	+ १.२ चित्रावत्
नव्य-शौरी-१९३४	+ १.५ 'डेनेत्र'वत्
नव्य-नौपुष्टम्-१९४२	+ ०.३५ 'रीगेल'वत्

२६२

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

१२.५४३ प्रकाशपरिवर्तनम्


विस्फोटकालस्याचिरात्पूर्वं नक्षत्रमतिधूमिलं वर्तते, परन्तु विस्फोटकाले शटित्यतितीव्रभास्वरत्वं प्राप्नोति । ततः शनैः शनैर्भास्वरत्वमल्पीभवति, अन्ततश्च नक्षत्रं पूर्ववत् स्थायिधूमिलत्वं याति । निम्नचित्रेणेदं स्पष्टीभविष्यति ।



['नव्य-गरुड-१९१८, नव्य-ययाति-१९०१, नव्य-मिथुन १९१२' इत्याख्यानां नक्षत्राणां प्रकाशरेखाचित्राणि]

१२.५४४ विस्फोटकारणम्

विस्फोटशीलविकारिनक्षत्रं मुख्यश्रेणिनक्षत्रापेक्षया लघुतरम्, घनतरञ्च श्वेतनक्षत्रम् । नक्षत्रमध्यवर्तिशक्तिरक्स्माद् मुच्यते, नक्षत्रस्य प्रकाशमण्डलं वर्धते, अन्तःशक्तिश्च बहिर्निस्सरति । अस्यां प्रक्रियायां भास्वरत्वमत्यधिकं वर्धते । शक्तिविकिरणातिरेकाद् विस्फोटो भवति, विस्फोटानन्तरं नक्षत्रपरिमाणं हीयते, परन्तु बहिर्गतानि बाष्पाणि शीघ्रं मण्डलाकारं प्राप्य नक्षत्रं परिवेष्टन्ते ।



जुलाई २०, १९२२

नव्यगरुड १९१८-स्य परिवेष्टनम्

सितम्बर ३, १९२६,

['विलसन'-वेधशाला]

बाष्पपरिवेष्टनमिदमन्ततो विरलत्वं भजमानं महाकाशे विलीयते । नक्षत्रञ्च न केवलं पुनः श्वेत-
नक्षत्रं भवति, किञ्चिद् विस्तारहानिमपि लभते । कदाचिदिदं परिवेष्टनं शनैः शनैर्विस्तीर्णं भवति,
दूरदर्शकयन्त्रेण च दर्शनीयतां भजते । नव्य-गरुड-१९१८नक्षत्रस्य परिवेष्टनं गोलाकारमासीत् ।
इदं विस्फोटकालात् चतुर्मासानन्तरं सर्वप्रथमं दृश्यमभवत्, ततः प्रतिवर्षं तस्य व्यासार्धो
विकलैकमितां वृद्धिमलभत (द्रष्टव्यं २५२ पृष्ठस्थं फोटोचित्रम्), १९४० तमे ख्रिस्ताब्दे च
नक्षत्रस्य व्यासो दशसहस्रज्योतिःप्रमापकमितोऽभवत् ।


१२.५४५ वर्णच्छत्रम्

विस्फोट एवात्र विकारस्य प्रमुखकारणमिति 'डॉप्लर'-सिद्धान्तगणितैर्वर्णच्छत्रीयरेखा-
विचलनैरपि सिध्यति । यदा नक्षत्रं वर्धते तद्बाष्पाण्यस्मान् प्रत्युपसर्पन्ति, रेखाश्च नीललोहितो-
त्तरं प्रति विचलन्त्यो दृश्यन्ते । बाष्पाणि प्रतिहोरं शतसहस्रक्रोशार्धगत्याऽपि वर्धन्ते । अस्यां
बाष्पवृद्धिप्रक्रियायां कदाचित् सन्ति नैकाः कोषा ये चैकैकशो भिद्यन्ते । नव्य-हंस-१९२०नक्षत्रे
पञ्च कोषा आसन्, ते सर्वे ५००-क्रोशार्धानि प्रतिसेकिण्डं विस्फुटिताः ।

१२.५४६ नव्याभासनक्षत्राणि प्रत्यावर्तिनव्यानि च

नव्यनक्षत्राणां विस्फोट एकदैव भवति, परन्तु सन्ति कतिपयानि नक्षत्राणि येषां चत्वारः
पञ्च वा विस्फोटा दृष्टाः सन्ति । एषामावृत्तयो कालक्रमेण विरलविरलतरा भवन्ति । प-वृश्चिक-
नक्षत्रस्य १८६३-तमे, १९०६-तमे, १९३६-तमे च ख्रिस्ताब्दे विस्फोटा अभवन् । एतानि
प्रत्यावर्तिनव्यानि प्रोच्यन्ते । एतानि धूमिलत्वमपि क्षिप्रं लभन्ते, अत एव नव्यनक्षत्रेभ्यो
भिन्नानि मन्यन्ते ।

कोटिः



नाक्षत्रे SS हंस नक्षत्र प्रकाशरेखाचित्रम्

कतिपयानां नक्षत्राणां विस्फोटा बहुशो भवन्ति । विस्फोटानामावृत्तिकालोऽनियमितः,
अर्थात् कदाचिदल्पः कदाचिदीर्घः, तथापि दशवर्षेषु प्रत्येकं नक्षत्रस्यावृत्तीनां संख्या समैव ।
एतानि नव्याभासनक्षत्राणि कथ्यन्ते । SS-हं. नक्षत्रमस्यैकमुदाहरणम् । अस्य नाक्षत्रकोटिः
सामान्यतया १२-मितास्ति, परन्तु विस्फोटकाले त्वयं नव-मिता भवति । नव्याभासनक्षत्राणि
प्रत्यावर्तिनव्यानि च समगुणकान्येव ।


१२.५५ ग्रहणशीलविकारिनक्षत्राणि

द्विकानामेव ग्रहणं सम्भवम् । यदि किमपि वर्णच्छत्रीयद्विकमेवं यद् द्वयोर्नक्षत्रयोः
परिक्रमणतलमस्माकं दृक्सूत्रस्य लम्बरूपेण वर्तते, तर्हि तयोरेकं द्वितीयस्य सम्मुखं काले काल आगत्य

२५४

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

पश्चवर्तिनः प्रकाशमवरुणद्धि । प्रकाशावरोधनाद् भास्वरत्वहानिर्जायते । यतो द्विकत्वमिदं वर्णच्छत्रीयम्, एते द्वे नक्षत्रे तीक्ष्णदूरदर्शकेनाप्येकं नक्षत्रमिवाभातः, ग्रहणजनितप्रकाशहानिः प्रतीयमानस्यैकस्य नक्षत्रस्य भास्वरत्वहानिः कथ्यते, द्विकनक्षत्रस्य च विकारिनक्षत्रमध्ये गणना क्रियते ।



S-रथी-नक्षत्रस्य ग्रहणशीलविकारित्वम्
['हार्वर्ड'-वेधशाला]


१२.५५१ उदाहरणम्

'अलगूल'^१नक्षत्रं ग्रहणशीलनक्षत्रस्य प्रसिद्धमुदाहरणम् । अस्य ग्रहणशीलत्वं सर्वप्रथमं १७८३-तमे ख्रिस्ताब्दे उद्घोषितं ज्योतिर्विद्भिः । अस्य द्विकनक्षत्रस्य प्रधाननक्षत्रस्य व्यासः सूर्यव्यासत्रिगुणितोऽस्ति । सहचारिनक्षत्रं प्रधाननक्षत्रापेक्षया त्रिकोट्यन्तरेण धूमिलम्, परन्तु परिमाणे विशालतरम् । तयोः केन्द्राद् दूरत्वं १.३ कोटिक्रोशार्धमितम् । प्रत्येकस्मिन् परिक्रमणे सहचारिनक्षत्रं प्रधाननक्षत्रभूकेन्द्रमध्य आपतति, ग्रासश्च दशहोरापर्यन्तं वर्तते । परिक्रमण-कालश्च ६८ होरामितः, अतः ६८ होरानन्तरं पुनर्ग्रासो भवति ।

सहस्राधिकानीदृशानि नक्षत्राणि लभ्यन्ते । एषां परिक्रमणकालः सामान्यतया त्रीणि दिनान्यस्ति । अल्पतमः परिक्रमणकालः पञ्चहोरामितो दीर्घतमश्च परिक्रमणकालः प्रायः सप्तविंशतिवर्षमितः ।

१. 'अलगूल'शब्दः अरबीभाषायाः शब्दः, व्युत्पत्त्यर्थश्चास्य 'राक्षसः' इति ।

कोटिः



अल्पतमभास्वरत्वं प्रकाशरेखाचित्र, परिक्रमणमि गीश्व

१२.५५२ प्रकाशपरिवर्तनानि

प्रकाशरेखाचित्रेण स्पष्टं भवति यद् द्विकस्य भास्वरत्वं विभिन्नकाले विभिन्ननाक्षत्रकोटिं भजते । परिक्रमणे द्विवारं रेखाचित्रे निम्नता दृश्यते—तयोरेका गौणी निम्नता द्वितीया च मुख्या निम्नता कथ्यते । गौणी निम्नता प्रधाननक्षत्रेण सहचारिनक्षत्रस्याच्छादनकाले, मुख्या निम्नता च सहचारिनक्षत्रेण प्रधाननक्षत्रस्याच्छादनकाले भवति ।

ग्रहणानि त्रिविधानि दृश्यन्ते । कदाचित् पूर्णग्रहणं कदाचित् खण्डग्रहणं कदाचिच्च वलयाकारग्रहणम् । ग्रहणकाले रेखाचित्रे निम्नतावलोक्यते । रेखाचित्रेण ग्रहणकालावधिग्रहण-भेदादयश्च निश्चीयन्ते ।

१२.५५३ प्रकाशमानग्रहणशीलद्विकानि

कतिपयानां ग्रहणशीलनक्षत्राणां भास्वरत्वविकारो दूरदर्शकयन्त्रेण विनापि दृश्यतां भजते । एतानि प्रकाशमानग्रहणशीलद्विकानि प्रोच्यन्ते । अधो दीयन्ते षट्प्रकाशमानग्रहणशीलद्विकानां नामानि, क्रमिकमुख्यनिम्नताद्वयमध्यवर्तिकालादयश्च—

नाम	मुख्यनिम्नताया आवृत्तिकालः			कोटिः	
	दिनम्	होरा	मिनटम्	महत्तमभास्वरत्वकाले	अल्पतमभास्वरत्वकाले
β ययातिः	२	२०	४९	२.२	३.५
Δ वृषः	३	२२	५२	३.८	४.२
V नौष्ट्रम्	१	१०	५५	४.१	४.८
S तुला	२	७	५१	४.८	५.९
u शौरी	२	१	१४	४.८	५.३
β वीणा	१२	२१	४८	३.४	४.३

१०३

त्रयोदशोऽध्यायः नक्षत्रस्तवकाः, नीहारिकाश्च

[आकाशे नैकस्थलेषु नक्षत्राणि सञ्चितानि दृश्यन्ते । कुत्रचिच्च धूमिलचिह्नानि निरीक्ष्यन्ते, तेषां भेदस्वरूपादिकमत्र विवेचनाया विषयः ।]

१३.१ नक्षत्रस्तवकाः

नक्षत्राणि प्रायो द्विकरूपेण त्रिकरूपेण बहुकरूपेण अथवा स्तवकरूपेण विद्यन्ते महाकाशे । यथा द्विकानि त्रिकाणि बहुकानि वा एकस्मादेव नक्षत्राज्जायन्ते, तथैव नक्षत्रस्तवका नीहारिकायाः सहस्राधिकानि नक्षत्राणि जायन्ते, परन्तु वेकोद्गमत्वात् समगतिकान्येव वर्तन्ते । अत एव समगति-कत्वात्तेषां नक्षत्रस्तवकत्वं ज्ञातुं सुकरम् ।

१३.१२ नक्षत्रस्तवकभेदाः

सन्ति त्रयः प्रमुखा भेदा नक्षत्रस्तवकानाम् । प्रथमं नक्षत्रकुलमस्ति । नक्षत्रकुले कतिपयानामेव नक्षत्राणां समूहो वर्तते । कुलस्य सर्वाणि नक्षत्राणि परस्परं भौतिकसम्बन्धेन बद्धानि सन्ति, तानि प्रायः शताल्पसंख्याकानि लभ्यन्ते । द्वितीयस्तावद्वन्नक्षत्रस्तवकोऽस्ति । अत्र नक्षत्राणि शताधिकानि पर्याप्तं घनतया परस्परं बद्धानि, परन्तु तेषां सीमा त्वनियताकारैव । तृतीयो गोलीयनक्षत्रस्तवकोऽस्ति । गोलीयनक्षत्रस्तवके सहस्राधिकानि नक्षत्राणि तिष्ठन्ति, तेषां सीमा च गोलाकारा । केन्द्रे नक्षत्राणि निविडतया स्थितानि, उपसीमान्तं विरलतया । दृढसंहतिरेवात्र वैलक्षण्यम् ।


एको दृष्टान्तोऽत्र स्पष्टकारी । कल्प्यते यत् कोऽपि जनो वायुयानेन यात्रां करोति । तेन कुत्रापि ग्रामेषु गृहकुलं दृश्यते, कुत्रापि नगरेषु गृहपुञ्जानि, कुत्रापि च प्रधाननगरेषु राजधान्यादिषु वा सहस्रशो गृहकुलानि । ग्रामो नक्षत्रकुलवत्, नगरमवद्वन्नक्षत्रस्तवकवत्, महानगरञ्च गोलीयनक्षत्रस्तवकवत् सन्ति ।

१३.१२ चलं नक्षत्रकुलम्

दृश्यन्ते नभसि नक्षत्रकुलानि, येषां नक्षत्राणि किञ्चिद् भौतिकसम्बन्धेन सम्बद्धानि सन्ति खे समानगतिकानि । चञ्चलं नक्षत्रकुलमवद्वन्नक्षत्रस्तवकापेक्षया भुवः समीपतरम् । साधारणतया तेषां प्रकृतगतयः समानान्तराः, तथापि यदि तानि महाकाशस्य भूयसि भागे विस्तृतानि, तेषां प्रकृता गतयो महावृत्तस्थाः सन्ति ।

१३.१२१ उदाहरणम्

सर्वप्रसिद्धमुदाहरणमत्र सप्तर्षिमण्डलम् । सप्तर्षिमण्डलस्य द्वे कोटिस्थनक्षत्रे परिवर्ज्य नक्षत्राण्येकस्यैव कुलस्याङ्गानि । अस्मिन् कुले पर्याप्तदूरवर्तिलुब्धकनक्षत्रमपि सम्मिलितमस्ति । सर्वेषां समाना प्रकृता गतिः, समाना केन्द्रीया गतिश्च ।



वृषभनक्षत्रमण्डल एकमपरं नक्षत्रकुलं दृश्यते । अस्मिन् प्रायः ८०-संख्याकानि नक्षत्राणि वर्तन्ते । तेषां मध्ये कानिचित् चतुर्थकोटिकानि, कानिचिच्च दशमकोटिकानि सन्ति । सर्वाणि कुलकेन्द्रात् पञ्चपारसेकाल्पदूरत्वे तिष्ठन्ति । कुलं प्रायः ४०-पारसेकदूरत्वे स्थितमस्ति । तेषां सर्वेषामार्द्रायाः किञ्चित्पूर्वेण स्थितं बिन्दुं प्रति गमनमस्ति ।

अन्यत्कुलं ययातिनक्षत्रमण्डलेऽवलोक्यते, अन्यानि च वृश्चिककिन्नरनक्षत्रमण्डलयोर्दृश्यन्ते ।

१३.१२२ दूरत्वनिर्धारणम्

नक्षत्रकुले यदि केन्द्रीया गतिः कस्यचिदपि नक्षत्रस्य निश्चिता भवति, तर्हि नक्षत्रकुलस्य दूरत्वं सुसरलं ज्ञायते । प्रथमं नक्षत्रकुलस्य वेगो निम्नलिखितसूत्रेण गण्यते—

$$\text{नक्षत्रकुलस्य वेगः} = \frac{\text{लम्बा केन्द्रीया गतिः}}{\text{कोज्या}\theta}$$

[अत्र θ निश्चितकेन्द्रीयगतिकस्य नक्षत्रस्य संसार्यबिन्दोः कोणीयान्तरमस्ति]

ततो लम्बनं निम्नसूत्रेण गण्यते—

$$\text{लम्बनम्} = ४.७४ \times \frac{\text{प्रकृता गतिः}}{(\text{नक्षत्रकुलवेगः}) \times (\text{ज्या}\theta)}$$

लम्बनेन दूरत्वनिर्णयः सरल एव ।

१३.१३ अबद्धनक्षत्रस्तवकाः

अबद्धनक्षत्रस्तवके शताधिकानि नक्षत्राणि भवन्ति । तानि पर्याप्तं घनत्वेन सम्बद्धानि, परन्तु सीमा तु तेषामनियताकारा । अत्र सर्वप्रसिद्धोदाहरणं बहुलानक्षत्रमस्ति ।

बहुलानक्षत्रं^१ वृषराशौ विद्यते । तत्र सप्त नव वा नक्षत्राणि नेत्राभ्यां दृश्यन्ते, साधारण-दूरदर्शकेन शताधिकानि, परन्तु तीक्ष्णदूरदर्शकेन वस्तुतस्तत्र २३०० संख्यकनक्षत्राण्यवलोक्यन्ते । तानि सर्वाणि समवर्णच्छत्रीयवर्गीयाणि, महाकाशे च समप्रकृतगत्या त्वेकामेव दिशं प्रति विचरन्ति, तेषां दूरत्वञ्च प्रायः ५०० प्रकाशवर्षमितम् ।

रोहिणीनक्षत्रस्य समीपं वर्तते एक V-आकारको नक्षत्रस्तवकः । तस्य नाम 'हाईऐडिज' अस्ति । रोहिणीनक्षत्रं स्वयमस्मादबद्धनक्षत्रस्तवकाद् बहिरेव वर्तते । अयं नक्षत्रस्तवकोऽस्माकं समीपतमः, अस्य दूरत्वञ्च केवलं १२० प्रकाशवर्षमितम् ।



ययातिनक्षत्रमण्डले द्वावबद्धनक्षत्रस्तवकौ विद्येते । प्रत्येकस्मिन् नक्षत्रस्तवके शताधिकानि नक्षत्राणि वर्तन्ते ।

अस्माकं भुवः सर्वाधिकदूरत्ववर्तीदृशो नक्षत्र-स्तवको नौतलनक्षत्रमण्डलेऽस्ति, तस्य दूरत्वञ्च २०,००० प्रकाशवर्षाणि ।

ययातिनक्षत्रमण्डले द्वावबद्धनक्षत्रस्तवकौ ।

['यर्किज' वेधशाला]

१३.१३१ दूरत्वनिर्णयः

नक्षत्रस्तवकस्य दूरत्वमप्रत्यक्षविधिना निश्चीयते । ज्योतिर्विद्भिर्नुभूतं यच्चाक्षुषयथार्थ-कोटि-वर्णच्छत्रीयवर्गयोरन्योन्यान्वयसन्बन्धो वर्तते । अत एव वर्णच्छत्रीयवर्गोपलब्धनन्तरं चाक्षुषयथार्थकोटिर्लभ्यते, प्रतीयमानचाक्षुषकोटिश्च वेधेन सुलभा । एवं चाक्षुषयथार्थकोटि-प्रतीयमानचाक्षुषकोटी ज्ञात्वा परिचितसूत्रेण दूरत्वं निर्णीयते—

५ लघुगणक (पारसेकमाने दूरत्वम्) = प्रतीयमानकोटिः—यथार्थकोटिः + ५

१३.१३२ स्थितिचिभागः

उपलब्धा ४०० संख्याका अबद्धनक्षत्रस्तवकाः प्रायेणाकाशगङ्गायाः समीपमेव स्थिताः । ते विभिन्नेष्वाकाशगङ्गायरेखांशेषु प्रायेण समसंख्यायां लभ्यन्ते^२ । सर्वे सूर्यात् ६०० पारसेका-

१. तेन च कर्णावतंसीकृतां कृत्तिकातारास्तवकानुकारिणीममृतबिन्दुनिःस्यन्दिनीं कुसुममञ्जरीमद्राक्षम् । (कादम्बरी)

२. गोलीयस्तवकाः खगोलार्धभाग एव दृश्यन्ते ।

धिकदूरत्वे न विद्यन्ते । आकाशगङ्गाया अतिसामीप्यात्तेषां पृथक्करणमत्यधिकं दुष्करम्, तथापि प्रकृतिगतिकेन्द्रीयगति-वर्णच्छत्रादीनां विश्लेषणेन गणनया च संभाव्यते ज्योतिर्विद्भिः ।

१३.१३३ जीवनकालः


अब्रह्मनक्षत्रस्तवकस्य नक्षत्राणामेक एवोद्गमः, अत एव प्रारम्भे तान्यन्यैर्नक्षत्रै-
रप्रभावितानि समानान्तरगत्या भ्रमन्ति, परन्तु शनैः शनैस्तेषां सम्बन्धः शिथिलीभवति, तान्यन्यै-
र्नक्षत्रैः प्रभावितानि सन्ति, अन्ततः स्वतन्त्राणि नक्षत्राणि भवन्ति ।

१३.१४ गोलीयनक्षत्रस्तवकाः

गोलीयनक्षत्रस्तवका अब्रह्मनक्षत्रस्तवकेभ्यो नितान्तं भिन्नाः । तेऽत्यन्तं विस्तृताः, अत्यन्तं
पिण्डीभूता अत्यन्तञ्च दूरवर्तिनः सन्ति । गोलीयनक्षत्रस्तवके सहस्राधिकानि नक्षत्राणि गोलाकारे
पिण्डतानि तिष्ठन्ति । गोलाकारपिण्डेऽतिधूमिलानि बहुसहस्रसंख्याकानि नक्षत्राणि; तेषां गणना
चातिदुष्करा । नक्षत्राणि केन्द्रे निबिडतया सम्बद्धानि, उपसीमान्तं विरलतया; अत एव यदि
दीर्घकालीनं प्रकाशदर्शनं प्रदाय फोटोचित्रं गृह्यते, तर्हि सीमान्तवर्तिनक्षत्राणि तु लभ्यन्ते, परन्तु
केन्द्रवर्तिनक्षत्राणि स्फुटतया परस्परभिन्नानि न दृश्यन्ते, केवलमेकः सम्मिलितपिण्ड इव दृश्यते ।
यद्यल्पकालीनप्रकाशदर्शनं दत्त्वा फोटोचित्रं गृह्यते तर्हि केन्द्रवर्तिनक्षत्राणि स्पष्टतां भजन्ते, परन्तु
सीमान्तनक्षत्राणि फोटोफले नायान्ति ।

१३.१४१ उदाहरणानि

धनुर्नक्षत्रपुञ्जे मेसिये-२२नक्षत्रस्तवकः शौरिनक्षत्रमण्डले मेसिये-१३-नक्षत्रस्तवकः,
W-किन्नरस्तवकः, कारण्डव ४७-नक्षत्रस्तवकश्च प्रमुखोदाहरणानि सन्ति ।



शौरि-नक्षत्रमण्डले गोलीयनक्षत्रस्तवकः

['विक्टोरिया'-वेधशाला]

२६०

अर्वाचीन ज्योतिर्विज्ञानम्

शौरिनक्षत्रमण्डलवर्ति-मेसिये १३-नक्षत्रस्तवको ग्रीष्मर्तौ सायङ्काले खस्वस्तिके दृश्यते ।
अत्र ५०,००० संख्याकानि नक्षत्राणि गणितानि । अस्य दूरत्वं ३४,००० प्रकाशवर्षमितमस्ति ।

W-किन्नरनक्षत्रस्तवकः २२,००० प्रकाशवर्षदूरत्वं एकश्चतुर्थकोटिकनक्षत्रवद् धूमिलो
दृश्यते (द्रष्टव्यं २५९ पृष्ठस्थमन्त्रं च फोटोचित्रम्) ।

१३-१४२ दूरत्वनिर्धारणं स्थितिविभागश्च

एषां सर्वाधिकदूरत्वं २२५,००० प्रकाशवर्षमितमस्ति । दूरत्वनिर्धारणमप्रत्यक्षविधिर्नैव
भवति । नैकगोलीयस्तवकेषु वार्षपर्वविकारिनक्षत्राणामुपस्थितिर्दूरत्वस्य निश्चयं करोति, यतस्तेषा-
मावृत्तिकालं ज्ञात्वा दूरत्वगणना सरलैव (द्रष्टव्यः § १२-५३२) ।



W-किन्नरनक्षत्रमण्डले गोलीयनक्षत्रस्तवकः

['हार्वर्ड'-वेधशाला]

९९ संख्याका गोलीयनक्षत्रस्तवका अद्यपर्यन्तं लब्धाः । ते चावद्धनक्षत्रस्तवकवत् समरूपेण
न विद्यन्ते, आकाशे प्रत्युत केवलमाकाशगङ्गीय-२३५ अंशात् पञ्चमितरेखांशपर्यन्तं विस्तृताः ।

१३-१४३ तेषामस्मत्तारासंस्थानस्याङ्गत्वम्

९९ संख्याकगोलीयनक्षत्रस्तवकेषु ३३ संख्याकानि नक्षत्राणि धनूराशिस्थ-तारकमेघस्य
समीपे दृश्यन्ते, आकाशगङ्गाया यद् विवरमस्ति, तस्योभयपार्श्वयोस्तानि तिष्ठन्ति । अनन्ताकाशे च
शेषाणां स्थितिर्निश्चिता । एषां केन्द्रं महत्तारकमेघानां केन्द्रम्, आकाशगङ्गायाश्च केन्द्रम्, एक एव
बिन्दुः, अत एवैते गोलीयनक्षत्रस्तवका अस्मत्तारासंस्थान एव तिष्ठन्ति ।

१३.२ नीहारिका

यदा कदा चाकाशस्यावलोकनं कुर्वद्भिर्ज्योतिर्विद्भिः साधारणदूरदर्शकयन्त्रेणापि दृश्यन्ते कानिचिद् धूमिलस्थलान्यनन्ताकाशे । तानि नीहारिकानाम्ना प्रसिद्धानि । आंगलभाषायां मेघवद् दृश्यमानत्वात्तेषां नाम Nebula अस्ति । धूमकेतोरपि दर्शनं नीहारिकावत्, परन्तु धूमकेतवश्चञ्चलगतिकाः सन्ति, नीहारिकाः केवलं स्थिरप्रदेशाः ।

नीहारिका-नक्षत्रस्तत्रकयोरन्तरमतिसूक्ष्मं दुर्ग्राह्यञ्च । यूरोपीयदेशेषु मध्ययुगे यानि स्थलानि नीहारिका-नाम्ना प्रसिद्धान्यासन्, तत्रैव कालान्तरे परिष्कृतदूरदर्शकयन्त्रैर्नक्षत्रस्तत्रका अदृश्यन्त । अत एव सर्वा नीहारिका वस्तुतो नक्षत्रस्तत्रका एवेति धारणा शनैः शनैर्ज्योतिर्विदा-मभवत् । परन्तु १८६४-तमे ख्रिस्ताब्दे रश्मिविश्लेषणशास्त्रेणास्या धारणाया अयथार्थत्वं प्रदर्शितम् । वर्णच्छत्रेण कतिपयधूमिलस्थानेषु विरलबाष्पीयपदार्थाः सूच्यन्ते; इतरधूमिलस्थानेषु च नक्षत्रस्तत्रकानामुपस्थितिः सूच्यते । अत एव ततः प्रारभ्य नीहारिकाणां पुनर्बोधाय नूतनाः प्रयत्नाः कृताः । अधुना च महादूरदर्शकयन्त्रेणातिसूक्ष्मग्राहिकोटोफलकैरन्यैश्च यन्त्रैरासां बाह्य-स्वरूपं प्रतिदिनं स्पष्टतया प्रत्यक्षीक्रियते । रश्मिविश्लेषकयन्त्रैश्च तेषामान्तरिकस्वरूपं निश्चीयते । आसां रहस्योद्घाटनाद् विश्वरचनाया मूलं प्राप्स्यत इति तज्ज्ञानमहत्ता ।


१३.२१ भेदाः

अधुना त्वष्टसहस्राधिका नीहारिका लब्धाः, तासां गणना च वस्तुतोऽसंख्या । तासां त्रयो भेदाः—प्रसृता नीहारिका, ग्रहीयनीहारिका, श्यामा नीहारिका च ।

१३.२२ प्रसृता नीहारिका

प्रसृता नीहारिकाः पर्याप्तसंख्याकाः सन्ति । सर्वाधिकभासुरा मृगनक्षत्रमण्डले एम्-४२-नाम्ना प्रसिद्धास्ति । साधारणदूरदर्शकयन्त्रेणैवं धूमिला, परन्तु तीक्ष्णदूरदर्शकयन्त्रेण क्षौमदुक्कलवत् प्रतिभाति । वर्णच्छत्रविश्लेषणेन ज्ञायते यदत्र हाईड्रोजन-हेलियम-आक्सीजन-नाइट्रोजन-बाष्पाणि वर्तन्ते ।

हंसपुञ्जेऽपरा नीहारिका दृश्यते । अत्र बाष्पकणाः पर्याप्तप्रकाशवन्तः । बृहद् 'मैगेलानिक'-मेघे असिमीन-नक्षत्रमण्डले चान्या नीहारिका लभ्यते । अत्र नीहारिका कर्करूपा । बहुलानक्षत्रेषु मुख्यनक्षत्राणि नीहारिकावृतान्येव (द्रष्टव्यं २६२ पृष्ठस्थंफोटोचित्रम्), तत्र 'मैरोप'नक्षत्रं तु



‘मृग’-नक्षत्रमण्डले प्रसृता नीहारिका

[‘माउण्ट-विलसन’-वेधशाला]

निविडतया नीहारिकाच्छन्नम् । तस्य नक्षत्रस्य
नीहारिकायाश्च वर्णच्छत्रे समे एवेति ज्योति-
भौतिकशास्त्रिभिः प्राप्तम् । सौरपरिवारे च दृष्टं यत्
चन्द्रकिरणानां ग्रहकिरणानां वा वर्णच्छत्रं सूर्यवर्ण-
च्छत्रसमम् । अत्र ग्रहाश्चन्द्रश्च सूर्यकिरणानेव
परावर्तयन्ति, अत एव वर्णच्छत्राणां समत्वं विद्यते ।
एवमेव ज्योतिर्विद्भिर्निश्चीयते यदत्र नीहारिका
वस्तुतः प्रकाशहीना, पश्चवर्तिनक्षत्रालोकेन भाति ।

परन्तु मृगनक्षत्रमण्डले या नीहारिका तस्या
वर्णच्छत्रं पश्चवर्तिनक्षत्रस्य वर्णच्छत्राद् भिन्नम् ।
किमत्र कारणम् ? अस्य रहस्यस्योद्घाटनमनेक-
प्रयोगैर्ज्यौतिषाचार्यैः कृतम् । यदि पश्चवर्तिनक्षत्राण्य-
त्युष्णतापक्रमकाणि, अर्थाद् यदि तेषां तापक्रमः



बहुलायां नीहारिकात्वम्

[माउण्ट-विलसन-वेधशाला]

२१,०० सेण्टीग्रेडाधिकस्तर्हि नीहारिकाया वर्णच्छत्रं नक्षत्रस्य वर्णच्छत्राद् भिन्नं दृश्यते, यदि

त्रयोदशोऽध्यायः


२६३

नक्षत्राणां तापक्रमो न्यूनः, तर्हि नीहारिकावर्णच्छत्रं नक्षत्रवर्णच्छत्रसमम् । एवं भिन्नता नक्षत्रतापक्रमाधीना ।

१३.२३ ग्रहीयनीहारिका

दूरदर्शकयन्त्रेण भौमशुक्रादयः प्रकाशचक्रात्मका दृश्यन्ते, यद्यपि नक्षत्राणि सदैव प्रकाश-
बिन्दुरूपेण लभ्यन्ते । १७८३-तमे ख्रिस्ताब्दे 'हर्शल' महोदयेन महाकाशे किञ्चिद्गोलाकारा
लघुधूमिलपदार्था दृष्टाः । ते पूर्णतया स्थिरा आसन् । ते चाधुना ग्रहीयनीहारिका उच्यन्ते ।


अधुना ३००-संख्याका ग्रहीयनीहारिका लब्धाः । ताः सर्वा दूरदर्शकयन्त्रेणैव दृश्यन्ते ।



द्वे ग्रहीय-नीहारिके

['माउण्ट-विलसन' वेधशाला]

१३.२३१ वीणानक्षत्रमण्डले वलयाकारनीहारिका



वीणा-नक्षत्रमण्डले वलयाकारनीहारिका

['माउण्ट-विलसन' वेधशाला]

२६४

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्

४ वीणा-५ वीणामध्ये स्थिता ग्रहीयनीहारिका वलयाकारनीहारिकानाम्ना चिरप्रसिद्धा । तस्या मध्ये तिष्ठत्येकमतिधूमिलं नक्षत्रम् (द्रष्टव्यं २६३ पृष्ठे द्वितीयं फोटोचित्रम्) । नीहारिका चेदृशी बृहदाकारा यत् सम्पूर्णः सौरपरिवारस्तस्या मध्ये ससौविध्यं प्रविशेत् । मध्यवर्तिनक्षत्रस्य ताप-क्रमः ५०,०००-सेण्टीग्रेडाधिकः ।

१३.२४ श्यामा नीहारिका

आकाशगङ्गायां यत्र तत्रानियताकाराणि श्यामलस्थलानि श्यामविवराणि वा दृश्यन्ते ।



किन्नरस्वस्तिकामध्य आकाशगङ्गा


['हार्वर्ड'-वेधशाला]

त्रयोदशोऽध्यायः

२६५

तानि च ज्योतिर्विदामाश्चर्यविषया आसन् पुरातनकालात् (चित्रे अङ्गारप्रसेवकाख्या नीहारिका द्रष्टव्या) । अचिरात्पूर्वमिदं मतमासीद् यदेतानि श्यामलस्थलानि महाकाशस्य नक्षत्रहीनानि स्थलान्येव, परन्तु नेदं स्वीक्रियत आधुनिकज्योतिर्विद्भिः । नक्षत्राणि सदैवेतस्ततो भ्रमन्ति । यदि पुरा तत्रैकमपि नक्षत्रं नाविद्यत, अधुना क्रमिकस्थानच्युतिं कुर्वत् किञ्चन नक्षत्रमवश्यं तत्रागतं भवेत् । अतस्तत्र न पदार्थाभावः, प्रत्युत पदार्थविशेषो वर्तत एव । आधुनिकपरिष्कृतयन्त्रैर्निश्चीयते यत् श्यामचिह्नानि श्याम-रजोमयमेघरूपपदार्थाः । यानि कानि च दृश्यन्ते श्यामचिह्नमध्ये नक्षत्राणि, तानि वस्तुतस्तद् मेघ-भू-मध्यवर्तीनि ।

आकाशगङ्गायां सन्ति नैकाः श्यामा नीहारिकाः, याः शृङ्खलारूपेण तिष्ठन्ति हंसवृश्चिक-नक्षत्रमण्डलयोर्मध्ये । (द्रष्टव्यं २६४ पृष्ठस्थमन्त्र्यं च फोटोचित्रम्) ।



आकाशगङ्गायां महाविवरम्

ॐ०३

चतुर्दशोऽध्यायः

[साहित्ये प्राय आकाशगङ्गाया उल्लेखो दृश्यते । सात्र वर्णविषयः ।]

१४. आकाशगङ्गासंस्थानम्

कस्याञ्चित्तमिस्रायां स्वच्छवायुमण्डलावृताकाश एका तारकनदीव दृश्यते । सा मेखलेव व्योममण्डलं द्विधा विभाजितं करोति । सा 'मन्दाकिनी-सुरसरित्-आकाशगङ्गा' प्रभृतिनाम्ना भारतीयशास्त्रेषु प्रसिद्धा । यूरोपीयदेशेष्वियं 'दुग्धपथः' इति कथ्यते । इयमाकाशगङ्गा श्वेताभा आकाशस्यैकस्याः कोट्येद्वितीयकोटिपर्यन्तं विततास्ति । दूरदर्शकयन्त्रैरत्र सहस्रशः परमलघुप्रकाश-चिन्द्वौ दृश्यन्ते । नेत्राभ्यामेव ते परस्परमभिन्ना अवलोक्यन्ते । तेषां सम्मिलितौज्ज्वल्येना-काशगङ्गा दुग्धधवलता दृश्यते । एतानि नक्षत्राणि सर्वत्र समसंख्यायां न वर्तन्ते । श्यामाम्बरे विक्रीर्णा रजतकणा इव तानि श्यामाम्बरे क्वचिद् विरलतया क्वचिच्च निबिडतया लभ्यन्ते ।

§ १४.१ आकाशगङ्गाया भगोले स्थितिः

आकाशगङ्गा तूत्तरखगोलार्धे उत्तरध्रुवस्थानात् ३० अंशान्तरात् प्रारभ्य शर्मिष्ठा-ययाति-रथि-नक्षत्रमण्डलान्यतिक्रम्य वृषस्य शृङ्गे स्पृशन्ती क्रान्तिवृत्तमयनस्थाने ६० अंशमितकोणेनो-त्क्ष्वयति । ततः सा मृग-मिथुन-एकशृङ्गनक्षत्रमण्डलान्यतीत्य स्वस्तिकनक्षत्रमण्डलं स्पृशन्ती किन्नरनक्षत्रमण्डलस्य समीपं गच्छति । तत्रास्या द्वे शाखे भवतः । भासुरतरा शाखा वेदी-नक्षत्रमण्डलमतिक्रम्य वृश्चिक-धनुः-गरुडनक्षत्रमण्डलान्यतीत्य हंसनक्षत्रमण्डलस्य समीपं द्वितीयया शाखया संयुक्ता भवति । एवं सा मेखलारूपेण खगोले वर्तते ।

अस्याः पृथुत्वं स्थाने स्थाने भिन्नं भिन्नम् । सर्वाधिकपृथुत्वं ४५°-मितं श्वा-मृग-नक्षत्र-मण्डलयोर्वर्तते । क्वचिदिदं केवलं ३०° मितम् । अग्रिमपृष्ठेषु दीयन्त आकाशगङ्गाया विभिन्न-स्थानीयानि चित्राणि—

चतुर्दशोऽध्यायः

२६७



‘धनुः’-नक्षत्रमण्डल आकाशगङ्गा

[‘हार्वर्ड’-वेधशाला]

२६८

अर्वाचीनं ज्योतिर्विज्ञानम्



चर्म-वृश्चिक-मध्य आकाशगङ्गा

['माउण्ट-विलसन'-वेधशाला]

चतुर्दशोऽध्यायः

२६६



हंसनक्षत्रमण्डल आकाशगङ्गा

['यर्किज'-वेधशाला]



वृश्चिक-नक्षत्र-मण्डल आकाशगङ्गायां स्यामा नीहारिका
['यर्किज'-वेधशाला]

१४.२ आकाशगङ्गीयनियामकाः

आकाशगङ्गासंस्थानस्य वर्णने कदाचिदापतति विशेषनियामकानामावश्यकता । नियामक-पद्धतिरियमत्र संक्षेपेण दीयते ।

आकाशगङ्गाया मध्यरेखायाः सुदूरवर्तिविन्दू आकाशगङ्गीयध्रुवौ स्तः । उत्तरीयाकाश-गङ्गीयध्रुवस्य विषुवांशः १९०° क्रान्त्यंशाच्च २८° सन्ति । दक्षिणाकाशगङ्गीयध्रुवस्य विषुवांशः १०° , क्रान्त्यंशाच्च २८° सन्ति ।

आकाशगङ्गीयविषुवरेखा चाकाशगङ्गीयध्रुवाद् नवत्यंशत्रिल्यया कल्पितं महद् वृत्तमस्ति । इयमाकाशगङ्गाया मध्यभागाद् गच्छति । इयं गरुड-मृग-नक्षत्रमण्डलयोर्नाडीवृत्तं ६२° अंशमितकोणेनोल्लङ्घयति । इयम् उत्तरध्रुवस्थानस्य समीपतमा दक्षिणस्वस्तिक-नक्षत्र-मण्डले भवति ।

आकाशगङ्गीयरेखांशानां प्रवृत्तिराकाशगङ्गीयविषुववृत्तमनु २८०° विषुवांशस्थानाद् भवति । आकाशगङ्गीयाक्षांशाच्च आकाशगङ्गीयविषुववृत्तसमकोणिकवृत्ते माप्यन्ते ।

8693

सिवज्ञानम्